

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

**Методические материалы для председателей и членов
предметных комиссий субъектов Российской Федерации
по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ 2025 года**

МАТЕМАТИКА

Москва
2025

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов, используемых при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по математике, И.В. Яценко, в.н.с. Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений».

Авторы: И.В. Яценко, А.В. Семенов, А.С. Трепалин, М.А. Черняева.

Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2025 г. по математике подготовлены в соответствии с Тематическим планом работ федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений». Пособие предназначено для подготовки экспертов по оцениванию выполнения заданий с развёрнутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных материалов (КИМ) для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике профильного уровня.

В методических материалах характеризуются типы заданий с развёрнутым ответом, используемые в КИМ ЕГЭ по математике, и критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, приводятся примеры оценивания выполнения заданий и даются комментарии, объясняющие выставленную оценку.

В пособии использованы работы участников ЕГЭ 2018–2024 гг.

Авторы будут благодарны за замечания и предложения по совершенствованию пособия.

© Федеральный институт педагогических измерений, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. Критерии проверки и оценка решений задания 13	5
2. Критерии проверки и оценка решений задания 14	36
3. Критерии проверки и оценка решений задания 15	73
4. Критерии проверки и оценка решений задания 16	101
5. Критерии проверки и оценка решений задания 17	130
6. Критерии проверки и оценка решений задания 18	156
7. Критерии проверки и оценка решений заданий 19.....	189
Приложение	
Правила заполнения протоколов проверки развернутых ответов участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий по математике в 2025 году	217

ВВЕДЕНИЕ

Общие позиции и характер оценивания выполнения заданий в целом повторяют прошлогодние. Небольшие видоизменения и корректировки формулировок в содержании критериев оценивания для конкретного задания могут иметь место в тех случаях, когда необходимость подобного рода уточнений диктуется содержанием и структурой самого задания.

Более подробное описание заданий с развёрнутым ответом и критериев оценивания их выполнения представлены ниже, в начале каждого из параграфов 1–7.

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552, зарегистрирован Минюстом России 15.05.2023 № 73314)

«81. Проверка экзаменационных работ включает в себя:

1) проверку и оценивание предметными комиссиями ответов на задания КИМ для проведения ЕГЭ с развёрнутым ответом <...>, в том числе устных ответов, в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету, разработка которых организуется Рособрнадзором¹ <...>

По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга выставляют первичные баллы за каждый ответ на задания КИМ для проведения ЕГЭ с развёрнутым ответом <...>

В случае существенного расхождения в первичных баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в первичных баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету, разработка которых организуется Рособрнадзором.

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о первичных баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу».

Существенными считаются следующие расхождения.

1. Расхождение между баллами, выставленными двумя экспертами за выполнение любого из заданий 13–19, составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт проверяет только те ответы на задания, которые были оценены со столь существенным расхождением.

2. Расхождение между суммами баллов, выставленных двумя экспертами за выполнение заданий 13–19, составляет 3 или более балла. В этом случае третий эксперт проверяет ответы на все задания работы.

3. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа на одно из заданий 13–19 заключается в том, что один эксперт указал на отсутствие ответа на задание, а другой выставил за выполнение этого задания ненулевой балл. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы на задания, которые были оценены со столь существенным расхождением. Ситуации, в которых один эксперт указал на отсутствие ответа в экзаменационной работе, а второй эксперт выставил нулевой балл за выполнение этого задания, не являются ситуациями существенного расхождения в оценивании.

¹ Часть 14 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1. Критерии проверки и оценка решений задания 13

Задание № 13 — тригонометрическое, логарифмическое или показательное уравнение.

Выделение решения уравнения в отдельный пункт a прямо указывает участникам экзамена на необходимость полного решения предложенного уравнения: при отсутствии в тексте конкретной работы ответа на вопрос пункта a задание № 13 оценивается 0 баллов.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте a ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта a и пункта b	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Комментарий.

Ответ в задании с развёрнутым ответом — это решение и вывод (называемый ответом).

Задача 13 (демонстрационный вариант ЕГЭ 2025 г.)

а) Решите уравнение

$$2\sin^3 x = \sqrt{2}\cos^2 x + 2\sin x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$2\sin x \cdot (1 - \cos^2 x) - \sqrt{2}\cos^2 x - 2\sin x = 0;$$

$$2\sin x - 2\sin x \cdot \cos^2 x - \sqrt{2}\cos^2 x - 2\sin x = 0;$$

$$2\sin x \cdot \cos^2 x + \sqrt{2}\cos^2 x = 0; \cos^2 x \cdot (2\sin x + \sqrt{2}) = 0.$$

Значит, $\cos x = 0$, откуда $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, откуда $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$,

$n \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.


б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $-\frac{7\pi}{2}$; $-\frac{11\pi}{4}$; $-\frac{5\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$$-\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$$

б) $-\frac{7\pi}{2}$; $-\frac{11\pi}{4}$; $-\frac{5\pi}{2}$.



Комментарий.

Множество корней может быть записано по-другому.

Отбор корней может быть произведён любым другим способом: с помощью графика, решения двойных неравенств и т.п.

При отборе корней с помощью числовой (тригонометрической) окружности на числовой окружности должно быть: отмечены и обозначены концы числового отрезка, выделена дуга, отмечены и обозначены корни, принадлежащие данному отрезку. На окружности могут быть отмечены вспомогательные числа, принадлежащие числовому отрезку.

Задание 13.1

а) Решите уравнение

$$\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Решение.


а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$\begin{aligned} 1 - 2\sin^2 x - \sqrt{2}(-\sin x) - 1 &= 0; & -2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin x &= 0; \\ -\sin x \cdot (2\sin x - \sqrt{2}) &= 0. \end{aligned}$$

Значит, $\sin x = 0$, откуда $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, откуда $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$,
или $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Получим числа: $-\frac{13\pi}{4}$; -3π ; -2π .



Ответ: а) πk , $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$$\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$$

б) $-\frac{13\pi}{4}$; -3π ; -2π .

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта <i>a</i> и пункта <i>б</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 13.2

а) Решите уравнение

$$\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$2\sin x \cdot \cos^2 x - \sin x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0; \quad 2\sin x \cdot \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 0;$$

$$\cos^2 x \cdot (2\sin x + \sqrt{2}) = 0.$$

Значит, $\cos x = 0$, откуда $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, откуда $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.


б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Получим числа: $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$$-\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z};$$

б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.



Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта <i>a</i> и пункта <i>б</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 13.3

а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$2\sin x \cdot \cos x - 2\sin x + \cos x - 1 = 0; (\cos x - 1)(2\sin x + 1) = 0.$$


Значит, $\cos x = 1$, откуда $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = -\frac{1}{2}$, откуда $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n$,

$n \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни,

принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.



Ответ: а) $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi m$,

$m \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта <i>a</i> и пункта <i>б</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 13.4

а) Решите уравнение $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:


$$1 - 2\sin^2 x + \sqrt{3} \sin x + 2 = 0; \quad (2\sin x + \sqrt{3})(\sin x - \sqrt{3}) = 0.$$

Значит, $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, откуда $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

Уравнение $\sin x = \sqrt{3}$ корней не имеет.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $-\frac{8\pi}{3}$; $-\frac{7\pi}{3}$.



Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{8\pi}{3}$; $-\frac{7\pi}{3}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта <i>a</i> и пункта <i>б</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 13.5

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi \right]$.

Решение.

а) Пусть $t = 9^{\cos x}$, тогда уравнение запишется в виде $9t^2 - 28t + 3 = 0$, откуда $t = \frac{1}{9}$ или $t = 3$.


При $t = \frac{1}{9}$ получим: $9^{\cos x} = \frac{1}{9}$; $\cos x = -1$, откуда $x = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

При $t = 3$ получим: $9^{\cos x} = 3$; $\cos x = \frac{1}{2}$, откуда $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$, или

$x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi \right]$.

Получим числа: 3π ; $\frac{11\pi}{3}$.



Ответ: а) $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) 3π ; $\frac{11\pi}{3}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта <i>a</i> и пункта <i>б</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 13.6

а) Решите уравнение $2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Решение.

а) Пусть $t = \log_4(4\sin x)$, тогда исходное уравнение запишется в виде $2t^2 - 5t + 2 = 0$, откуда $t = 2$ или $t = \frac{1}{2}$.


При $t = 2$ получим: $\log_4(4\sin x) = 2$, значит, $\sin x = 4$, что невозможно.

При $t = \frac{1}{2}$ получим: $\log_4(4\sin x) = \frac{1}{2}$, значит, $\sin x = \frac{1}{2}$, откуда $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$,

или $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Получим число $-\frac{7\pi}{6}$.



Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{7\pi}{6}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов – пункта <i>a</i> и пункта <i>б</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Примеры оценивания решений задания 13

Пример 13.1.1

а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.


Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi$.

Задача 13

$$\begin{aligned} \text{а) } \cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) &= 1 \\ \cos 2x - \sqrt{2} (-\sin x) &= 1 \\ \cos 2x + \sqrt{2} \sin x - 1 &= 0 \\ 1 - 2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin x - 1 &= 0 \\ 2\sin^2 x - \sqrt{2} \sin x &= 0 \\ \sin x (2\sin x - \sqrt{2}) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \sin x = 0 \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

б) Определим корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$, с помощью тригонометрической окружности



$$x_1 = \frac{3}{4}\pi - 4\pi = \frac{3 - 16}{4}\pi = \frac{-13}{4}\pi \rightarrow \#$$

$$x_2 = \pi(-3) = -3\pi$$

$$x_3 = \pi(-2) = -2\pi$$

x_4 - серия $\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ не подходит

Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z},$
 $\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 $\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-3\pi; -2\pi; -\frac{13}{4}\pi$

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.1.2

а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi$.

№13

а) $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$

З-у, зто $\sin(x + \pi) = -\sin(x)$, тогда ур-нение будет:

$$\cos 2x - \sqrt{2}(-\sin(x)) - 1 = 0$$

$$\cos 2x + \sqrt{2} \sin(x) - 1 = 0$$

З-у, зто $\cos 2x = \cancel{\cos^2 x - \sin^2 x} 1 - 2\sin^2 x$, тогда

$$1 - 2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin(x) - 1 = 0$$

$$\sqrt{2} \sin(x) - 2\sin^2 x = 0$$

$$\sin(x) (\sqrt{2} - 2\sin(x)) = 0$$

$$\begin{cases} \sin(x) = 0 & \textcircled{1} \\ \sqrt{2} = 2\sin(x) & \textcircled{2} \end{cases}$$

① $\sin(x) = 0$

$$x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

② $\sqrt{2} = 2\sin(x)$

$$\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2, k_2 \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3, k_3 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Ответ $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$ I

$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2, k_2 \in \mathbb{Z}$ II

$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3, k_3 \in \mathbb{Z}$ III

д) Буду решать с помощью др-ного нер-ва. т.е.
если $x_0 \in [-\frac{7\pi}{2}; -2\pi] \Rightarrow -\frac{7\pi}{2} \leq x_0 \leq -2\pi$.

из п.а есть 3 серии решений:

I $x = \pi k_1, k_1 \in \mathbb{Z}$

II $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2, k_2 \in \mathbb{Z}$

III $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3, k_3 \in \mathbb{Z}$

Ⓘ $x = \pi k_1, k_1 \in \mathbb{Z}$

$-\frac{7\pi}{2} \leq \pi k_1 \leq -2\pi \quad | \cdot \frac{1}{\pi} ; 3-2y, \text{ т.о. } \frac{2}{\pi} > 0 \Rightarrow \text{знак нер-ва не изменяется}$
 $-7 \leq 2k_1 \leq -9 \quad | : 2$

$-3 \leq k_1 \leq -2 \quad 3-2y, \text{ т.о. } k_1 \in \mathbb{Z} \Rightarrow k_1 \in \{-2; -3\} \Rightarrow$

$\begin{cases} x = -2\pi \\ x = -3\pi \end{cases}$

Ⓜ $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2, k_2 \in \mathbb{Z}$

$-\frac{7\pi}{2} \leq \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2 \leq -2\pi \quad | \cdot \frac{4}{\pi} ; 3-2y, \text{ т.о. } \frac{4}{\pi} > 0 \Rightarrow \text{знак нер-ва не измен.}$

~~$-\frac{7\pi}{2}$~~

$-14 \leq 1 + 8k_2 \leq -8 \quad | -1$

$-15 \leq 8k_2 \leq -9 \quad | : 8$

$-\frac{15}{8} \leq k_2 \leq -\frac{9}{8} \quad 3-2y, \text{ т.о. } k_2 \in \mathbb{Z} \text{ и } -1 > -\frac{9}{8}, \text{ а } -2 < -\frac{15}{8} \Rightarrow$

таких k_2 не существует

Ⓝ $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3$

$-\frac{7\pi}{2} \leq \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3 \leq -2\pi \quad | \cdot \frac{4}{\pi}$

$-14 \leq 3 + 8k_3 \leq -8$

$-17 \leq 8k_3 \leq -11 \quad | : 8$

$-\frac{17}{8} \leq k_3 \leq -\frac{11}{8} \quad \text{т.к. } k_3 \in \mathbb{Z} \Rightarrow k_3 = -3 \rightarrow x = \frac{3\pi}{4} - 6\pi = -\frac{21\pi}{4}$

Ответ. $x = -2\pi,$
 $x = -3\pi,$
 $x = -\frac{21\pi}{4}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а. При нахождении целого значения k_3 , удовлетворяющего неравенствам $-\frac{17}{8} \leq k_3 \leq -\frac{11}{8}$, допущена ошибка: $k_3 = -3$, что привело к неверному ответу в пункте б.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.1.3

а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi$.

$$\sqrt{13.} \text{ а) } \cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$$

$$1 - 2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin x - 1 = 0$$

$$-2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin x = 0$$

$$2\sin^2 x - \sqrt{2} \sin x = 0$$

$$\sin x (2\sin x - \sqrt{2}) = 0$$

$$\text{I. } \sin x = 0$$


$$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{II} \quad 2\sin x - \sqrt{2} = 0$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k; k \in \mathbb{Z} \quad x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z}$$

б) Выберите корни с помощью единичной окружности на отрезке $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$



$$x_1 = -\frac{7\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = -\frac{13\pi}{4}$$

$$x_2 = -\pi$$

$$x_3 = -2\pi$$

Ответ а) $x = \pi n; n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z}$

$$\text{б) } x = -\frac{13\pi}{4} \quad x = -\pi \quad x = -2\pi$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а. Отбор корней с помощью тригонометрической окружности неверный, так как на отмеченной дуге обозначен корень x_2 , не принадлежащий числовому отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$, в ответе неверно записан корень x_1 .

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.1.4


а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi$.

13 а) $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$ б)

$$1 - 2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin x - 1 = 0$$
$$2\sin^2 x - \sqrt{2} \sin x = 0$$
$$\sin x (2\sin x - \sqrt{2}) = 0$$
$$\begin{cases} \sin x = 0 \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \begin{cases} x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$



Ответ: а) $x \in \left\{ \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \right\}; k \in \mathbb{Z}$

б) $x \in \left\{ -\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi \right\}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а. Отбор корней с помощью числовой (тригонометрической) окружности не должен приниматься, так как на рисунке дуга никак не выделена. При отборе корней тригонометрического уравнения с помощью числовой (тригонометрической) окружности на рисунке должны быть отмечены (подписаны) начало и конец дуги, выделена рассматриваемая дуга, отмечены (подписаны) корни, принадлежащие этой дуге, при этом на дуге могут быть отмечены дополнительные точки, принадлежащие данной дуге.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.2.1

а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.


б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

№13.

$$\begin{aligned} \text{а) } \sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x &= 0 \\ \sin x \cdot (\cos^2 x - \sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) + \sin x &= 0 \\ \sin x (1 - \sin^2 x - \sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) + \sin x &= 0 \\ \sin x (1 - 2\sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) + \sin x &= 0 \\ \sin x + \sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) &= 0 \\ 2\sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) &= 0 \\ 2\sin x (1 - \sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) &= 0 \\ (1 - \sin^2 x) (2\sin x + \sqrt{2}) &= 0 \\ 1 - \sin^2 x = 0 &\quad \text{или} \quad 2\sin x + \sqrt{2} = 0 \\ \cos^2 x = 0 &\quad 2\sin x = -\sqrt{2} \\ x = \pm \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. &\quad \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases} \end{aligned}$$

б) $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$ Уберём корни уравнения при помощи окружности:



$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{3\pi}{2} \\ x_2 &= \frac{7\pi}{4} \\ x_3 &= \frac{5\pi}{2} \end{aligned}$$

Ответ: а) $\pm \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$
 $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$
 $-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.2.2


а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}
 & \text{а) } \sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0 \\
 & \sin x (2 \cos^2 x - 1) + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0 \\
 & 2 \sin x \cos^2 x - \sin x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0 \\
 & 2 \sin x \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 0 \\
 & \cos^2 x (2 \sin x + \sqrt{2}) = 0 \\
 & \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \cos^2 x = 0 \\
 & \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases} \qquad \begin{cases} \cos x = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}
 \end{aligned}$$

б) $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$



$$2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{8\pi - \pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

Ответ: а) $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 $\text{или } \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.2.3

а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi \right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

w13

$$\begin{aligned} \sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x &= 0 \\ \sin x (1 - 2\sin^2 x) + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x &= 0 \\ \sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x &= 0 \\ 2\sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} \cos^2 x &= 0 \\ 2\sin x (1 - \sin^2 x) + \sqrt{2} \cos^2 x &= 0 \\ 2\sin x \cdot \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x &= 0 \\ \cos^2 x (2\sin x + \sqrt{2}) &= 0 \end{aligned}$$


$$\begin{cases} \cos^2 x = 0 \\ 2\sin x = -\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Окр-ра, кот в $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi \right]$

б) отберем корни с помощью
 $t_1 = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{8\pi - \pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$
 \Rightarrow найм перх. $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$

Ответ: а) $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
 $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}, x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$



Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а. Отбор корней с помощью тригонометрической окружности неверный, так как на отмеченной дуге обозначен корень, не принадлежащий числовому отрезку.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.2.4

а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

а) $\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cdot \cos^2 x + \sin x = 0$ *N 18.*
 $\sin x \cdot (\cos^2 x - \sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) + \sin x = 0$
 $\sin x (1 - 2\sin^2 x) + \sqrt{2} - \sqrt{2} \sin^2 x + \sin x = 0$
 $\sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} - \sqrt{2} \sin^2 x + \sin x = 0$
 $-2\sin^3 x + 2\sin x - \sqrt{2} \sin^2 x + \sqrt{2} = 0$
 $2\sin x (1 - \sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) = 0$
 $(2\sin x + \sqrt{2})(1 - \sin^2 x) = 0$

$$\begin{array}{l} 2\sin x + \sqrt{2} = 0 \\ 2\sin x = -\sqrt{2} \\ \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{array} \quad \begin{array}{l} 1 - \sin^2 x = 0 \\ -\sin^2 x = -1 \\ \sin^2 x = 1 \\ \sin x = \pm 1 \end{array}$$

$$x = -\frac{5\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$$

Ответ: $x \in \left\{ -\frac{5\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \right\}$

б) $\frac{3\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{4} + 2\pi k \leq 3\pi$ $\frac{3\pi}{2} \leq -\frac{5\pi}{4} + 2\pi k \leq 3\pi$
 $\frac{6\pi + \pi}{4} \leq 2\pi k \leq \frac{12\pi + 9\pi}{4}$ $\frac{6\pi + 5\pi}{4} \leq 2\pi k \leq \frac{12\pi + 9\pi}{4}$
 $\frac{7\pi}{4 \cdot 2\pi} \leq k \leq \frac{13\pi}{4 \cdot 2\pi}$ $\frac{11\pi}{4 \cdot 2\pi} \leq k \leq \frac{17\pi}{4 \cdot 2\pi}$
 $\frac{7}{8} \leq k \leq \frac{13}{8}$ $\frac{11}{8} \leq k \leq \frac{17}{8}$

$$k=1; x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$$

$$\frac{3\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq 3\pi$$

$$\frac{5\pi - \pi}{2} \leq 2\pi n \leq \frac{6\pi - \pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2} \leq n \leq \frac{5\pi}{2 \cdot 2\pi}$$

$$\frac{1}{2} \leq n \leq \frac{5}{4}$$

$$n=1; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{5\pi}{2}$$

$$k=2; x = -\frac{5\pi}{4} + 4\pi = \frac{11\pi}{4}$$

$$\frac{3\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{2} + 2\pi m \leq 3\pi$$

$$\frac{3\pi + \pi}{2} \leq 2\pi m \leq \frac{6\pi + \pi}{2}$$

$$\frac{2\pi}{2} \leq m \leq \frac{7\pi}{2 \cdot 2\pi}$$

$$1 \leq m \leq \frac{7}{4}$$

$$m=1; x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

$$\text{Ответ: } x \in \left\{ \frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}; \frac{11\pi}{4} \right\}$$

Комментарий.

Неверно решено тригонометрическое уравнение $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 13.3.1

а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

а) $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$
 $\sin 2x - 2\sin x + \cos x - 1 = 0$
 $2\sin x \cos x - 2\sin x + \cos x - 1 = 0$
 $2\sin x(\cos x - 1) + 1(\cos x - 1) = 0$
 $(\cos x - 1)(2\sin x + 1) = 0$
 $\cos x = 1$ или $2\sin x + 1 = 0$
 $x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ $\sin x = -\frac{1}{2}$

$$\begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

б) Выберем корни на промежутке $\left[2\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$
с помощью двойного неравенства:

1) $2\pi \leq 2\pi n \leq \frac{9\pi}{2} \quad | : 2\pi$
 $1 \leq n \leq \frac{9}{4}$
 $1 \leq n \leq 1\frac{3}{4} \Rightarrow n = 1 \Rightarrow$ корень: 2π

2) $2\pi \leq -\frac{\pi}{6} + 2\pi k \leq \frac{9\pi}{2} \quad | \cdot \frac{6}{\pi}$
 $12 \leq -1 + 12k \leq 21 \quad | + 1$
 $13 \leq 12k \leq 22 \quad | : 12$
 $1\frac{1}{12} \leq k \leq 1\frac{10}{12} \Rightarrow$ нет целых $k \Rightarrow -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \notin \left[2\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$

3) $2\pi \leq -\frac{5\pi}{6} + 2\pi l \leq \frac{9\pi}{2} \quad | \cdot \frac{6}{\pi}$
 $\frac{12}{5} \leq -1 + \frac{12}{5}l \leq \frac{42}{5} \quad | + 1$
 $\frac{17}{5} \leq \frac{12}{5}l \leq \frac{52}{5} \quad | \cdot \frac{5}{12}$
 $\frac{17}{12} \leq l \leq \frac{52}{24}$
 $1\frac{5}{12} \leq l \leq 2\frac{4}{24} \Rightarrow l = 2 \Rightarrow$ корень: $-\frac{5\pi}{6} + 4\pi = \frac{24\pi}{6} - \frac{5\pi}{6} = \frac{19\pi}{6}$

Ответ: а) $2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z}$
б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.3.2

а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

$$N13a) \sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$$

$$2\sin x \cos x - 2\sin x + \cos x - 1 = 0$$

$$2\sin x (\cos x - 1) + \cos x - 1 = 0$$

$$(\cos x - 1)(2\sin x + 1) = 0 ; \begin{cases} \cos x = 1 \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases} \begin{cases} x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Ответ: $x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$

$$б) \left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$$

$$1) 2\pi \leq 2\pi k \leq \frac{7\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$1 \leq k \leq \frac{7}{4}, k \in \mathbb{Z}$$

$$k = 1 \Rightarrow x = 2\pi$$

$$2) 2\pi \leq -\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq \frac{7\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{13\pi}{6} \leq 2\pi n \leq \frac{22\pi}{6}, n \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{13}{12} \leq n \leq \frac{11}{6}, n \in \mathbb{Z}$$

$$n \in \emptyset$$

$$3) 2\pi \leq -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m \leq \frac{7\pi}{2}, m \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{17\pi}{6} \leq 2\pi m \leq \frac{26\pi}{6}, m \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{17}{12} \leq m \leq \frac{13}{6}, m \in \mathbb{Z}$$

$$m = 2 \Rightarrow x = 4\pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{19\pi}{6}$$

$$\text{Ответ: } x = 2\pi; \frac{19\pi}{6}$$

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.3.3


а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

а) $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$
 $2\sin x \cdot \cos x - 2\sin x + \cos x - 1 = 0$
 $2\sin x(\cos x - 1) + (\cos x - 1) = 0$
 $(\cos x - 1)(2\sin x + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ 2\sin x = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$

б) 

$\sqrt{2\pi - \frac{5\pi}{6}} = \frac{12\pi - 5\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$

Ответ: а) $\{2\pi n; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k\}$
 $n, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\{2\pi; \frac{7\pi}{6}\}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а. Отбор корней с помощью тригонометрической окружности неверный, так как на отмеченной дуге указан корень, не принадлежащий числовому отрезку.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.3.4

а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

$$\begin{aligned} \sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 &= 0 \\ 2\sin x \cdot \cos x - 2\sin x + \cos x - 1 &= 0 \\ 2\sin x(\cos x - 1) + \cos x - 1 &= 0 \\ (\cos x - 1)(2\sin x + 1) &= 0 \end{aligned}$$

дальше выражение = 0, если хотя бы одна из скобок = 0

рассмотрим скобку ①: | рассмотрим скобку ②:

$$\cos x - 1 = 0$$

$$\cos x = 1$$

$$x_1 = 2\pi k$$

$$2\sin x + 1 = 0$$

$$\sin x = -\frac{1}{2}$$


$$x_2 = -\frac{\pi}{6} + 2\pi m$$

$$x_3 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$$

при $k, m, n \in \mathbb{Z}$

б.)

на тригонометрической окружности отметим найденные корни и определим те, которые входят в промежуток $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$



$$x_1 = 2\pi \rightarrow \text{лежит в } [2\pi; \frac{7\pi}{2}]$$

$$x_2 = 3\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{19\pi}{6} \rightarrow \text{лежит в } [2\pi; \frac{7\pi}{2}]$$

$$x_3 = 4\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{23\pi}{6} \rightarrow \text{не лежит в } [2\pi; \frac{7\pi}{2}]$$

Ответ: а) $x_1 = 2\pi k; x_2 = -\frac{\pi}{6} + 2\pi m; x_3 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$ (к, м, n ∈ ℤ)
б.) $x_1 = 2\pi; x_2 = \frac{19\pi}{6}$

Комментарий.

Неверно решено тригонометрическое уравнение $\sin x = -\frac{1}{2}$.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 13.4.1

а) Решите уравнение $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{7\pi}{3}$.

13) а) $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$

$$1 - 2\sin^2 x + 2 = -\sqrt{3} \sin x$$

$$-2\sin^2 x + \sqrt{3} \sin x + 3 = 0$$

Пусть $\sin x = t$, тогда

$$-2t^2 + \sqrt{3}t + 3 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = (\sqrt{3})^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 3 = 3 + 24 = 27$$

$$t = \frac{-\sqrt{3} \pm 3\sqrt{3}}{-4} \quad t_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$t_2 = \sqrt{3}$$

Значит, $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ или $\sin x = \sqrt{3}$

1) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$x_1 = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$x_2 = \frac{4\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

2) $\sin x = \sqrt{3}$ - нет решений, т.к. $-1 \leq \sin x \leq 1$, а $|\sqrt{3}| > 1$

б) Найдем корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$

1) $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$

$$-3\pi \leq -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq -\frac{3\pi}{2}$$

$$-3 \leq -\frac{1}{3} + 2k \leq -\frac{3}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$-3 + \frac{1}{3} \leq 2k \leq -\frac{3}{2} + \frac{1}{3}$$

$$-\frac{8}{3} \leq 2k \leq -\frac{11}{6}$$

$$-\frac{16}{6} \leq k \leq -\frac{11}{12}$$

$$-\frac{16}{12} \leq k \leq -\frac{11}{12}$$

$$-1\frac{1}{3} \leq k \leq -\frac{11}{12}, \text{ т.к. } k \in \mathbb{Z}, \text{ то } k = -1$$

Если $k = -1$, то $x = -\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{3} = -\frac{4\pi}{3}$

2) $-3\pi \leq \frac{4\pi}{3} + 2\pi n \leq -\frac{3\pi}{2}$

$$-3\pi - \frac{4\pi}{3} \leq 2\pi n \leq -\frac{3\pi}{2} - \frac{4\pi}{3}$$

$$-\frac{13\pi}{3} \leq 2\pi n \leq -\frac{17\pi}{6}$$

$$-\frac{13}{6} \leq n \leq -\frac{17}{12}$$

$$-\frac{16}{12} \leq n \leq -\frac{17}{12}$$

$$-2\frac{1}{6} \leq n \leq -1\frac{5}{12}, n \in \mathbb{Z}$$

$$n = -2$$

Если $n = -2$, то $x = \frac{4\pi}{3} - 4\pi = -\frac{8\pi}{3}$

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi k; \frac{4\pi}{3} + 2\pi n; k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{4\pi}{3}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а. При решении двойных неравенств допущена ошибка: $-\frac{3}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{7}{6}$. Отбор корней нельзя считать обоснованным.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.4.2

а) Решите уравнение $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{7\pi}{3}$.

13.) а) $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$
 $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cdot (-\sin x)$
 $1 - 2\sin^2 x + 2 = -\sqrt{3} \sin x$
 $-2\sin^2 x + 3 + \sqrt{3} \sin x = 0$
 Пусть $\sin x = y$
 Тогда
 $-2y^2 + 3 + \sqrt{3}y = 0$
 $D = \sqrt{3 - 4 \cdot 3 \cdot (-2)} = \sqrt{27} > 0$ 2 корня
 $y_1 = \frac{-\sqrt{3} + \sqrt{27}}{-4} = \frac{-\sqrt{3} + 3\sqrt{3}}{-4} = \frac{2\sqrt{3}}{-4} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
 $y_2 = \frac{-\sqrt{3} - \sqrt{27}}{-4} = \frac{-4\sqrt{3}}{-4} = \sqrt{3}$
 Обратно $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\sin x = \sqrt{3}$
 $x = (-1)^n \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ нет решений
 $\sin x \in [-1; 1]$
 б)
 При $n=0$
 $x = -\frac{\pi}{3} \notin \left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$
 При $n=-1$
 $x = \frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3} \notin \left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$
 При $n=-2$
 $x = -\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{7\pi}{3} \in \left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$
 При $n=-3$
 $x = \frac{\pi}{3} - 3\pi = -\frac{8\pi}{3} \in \left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$
 Ответ: а) $x = (-1)^n \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{7\pi}{3}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а. При решении квадратного уравнения есть неточность в записи дискриминанта – объединение записей дискриминанта и корня из него. Отбор корней нельзя считать обоснованным, так как перебор остановлен на корне, принадлежащем отрезку.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.4.3

а) Решите уравнение $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{7\pi}{3}$.

13 а) $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$

$\cos^2 x - \sin^2 x + 2 = \sqrt{3} \cdot \sin x$

$1 - \sin^2 x - \sin^2 x - \sqrt{3} \sin x + 2 = 0$

$-2 \sin^2 x - \sqrt{3} \sin x + 3 = 0$

$2 \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x - 3 = 0$

замени $\sin x = t, t \in [-1; 1]$

$2t^2 + \sqrt{3}t - 3 = 0$


$D = 3 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 3 + 24 = 27 = (3\sqrt{3})^2$

$t_1 = \frac{-\sqrt{3} + 3\sqrt{3}}{4} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}; t_2 = \frac{-\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{4} = \frac{-4\sqrt{3}}{4} = -\sqrt{3}$

$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin x = -\sqrt{3}; -\sqrt{3} \notin [-1; 1]$

$x = (-1)^k \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.



$[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}]$

Ответ: а) $(-1)^k \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$
б) $-\frac{5\pi}{3}$.

Комментарий.

Тригонометрическое уравнение решено неверно. Во второй строчке в правой части отсутствует знак минус – ошибка в формуле приведения. Пункт а не выполнен (не из-за вычислительной ошибки).

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 13.5.1

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) 3π ; $\frac{11\pi}{3}$.

$$\begin{aligned} 9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 &= 0 \\ 9 \cdot (9^{\cos x})^2 - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 &= 0 \\ 9^{\cos x} &= t, \text{ тогда} \\ 9t^2 - 28t + 3 &= 0 \\ D &= 784 - 108 = 676 \\ t &= \frac{28 \pm 26}{18} \quad t_1 = \frac{1}{9} \quad t_2 = 3 \\ 9^{\cos x} &= \frac{1}{9} & 9^{\cos x} &= 3 \\ 9^{\cos x} &= 9^{-1} & 3^{2\cos x} &= 3^1 \\ \cos x &= -1 & 2\cos x &= 1 & \cos x &= \frac{1}{2} \\ x_1 &= \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} & x_2 &= \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, \text{ объединяя} \\ x_1 \text{ и } x_2 & \text{ получаем } x &= \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ \delta) & \frac{11\pi}{3}; 3\pi; 4\pi \in \left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right] \\ \text{Ответ: а) } & \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z}, \delta) 3\pi, \frac{11\pi}{3}, 4\pi. \end{aligned}$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а. При отборе корней отсутствует решение и ошибочно указано число, которое не является корнем тригонометрического уравнения.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.5.2

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{3} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $3\pi; \frac{11\pi}{3}$.

$$а) 9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

$$9 \cdot 9^{2\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

Положим $9^{\cos x} = t, t > 0$ $9 \cdot t^2 - 28 \cdot t + 3 = 0$

$$D = 784 - 4 \cdot 9 \cdot 3 = 676$$

$$t_1 = \frac{28 - 26}{18} = \frac{1}{9}$$

$$t_2 = \frac{28 + 26}{18} = 3$$

$$9^{2\cos x} = \frac{1}{9}$$

$$9^{\cos x} = 3^{-2}$$


$$\cos x = -1$$

$$x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$9^{\cos x} = 9^1$$

$$\cos x = \frac{1}{3}$$

$$x = \pm \arccos \frac{1}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$



б) $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \text{ не подходит.}$$

1. $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

$$2,5\pi < -\frac{\pi}{3} + 2\pi k < 4\pi \quad | : \pi$$

$$2,5 < -\frac{1}{3} + 2k < 4$$

$$2\frac{5}{6} + \frac{2}{6} < 2k < 4\frac{1}{3} \quad | : 2$$

$$1\frac{5}{6} < k < 2\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow k = 2 \quad x = -\frac{\pi}{3} + 4\pi = \frac{11\pi}{3}$$

2. $x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

$$2,5\pi < \pi + 2\pi k < 4\pi \quad | : \pi - 1$$

$$2,5 - 1 < 2k < 4 - 1 \quad | : 2$$

$$0,75 < k < 1,5$$

$$\Rightarrow k = 1$$

$$x = \pi + 2\pi = 3\pi$$

3. $x = \pi + 2\pi k$

$$2,5\pi < \pi + 2\pi k < 4\pi \quad | : \pi$$

$$1,5 < k < 2,5$$

$$\Rightarrow k = 2$$

$$x = \pi + 4\pi = 5\pi$$

Ответ: $x = 3\pi, x = \frac{11\pi}{3}$

Комментарий.

В записи корней первого тригонометрического уравнения содержится дублирующая запись корней, но ошибки в этом нет. Получен верный ответ в пункте а. При отборе корней допущены ошибки при делении $2\frac{5}{6}$ и $4\frac{1}{3}$ на 2.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.5.3

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{3} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $3\pi; \frac{11\pi}{3}$.

$$а) 9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

$$9 \cdot (9^2)^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

Пусть $9^{\cos x} = t$, тогда:

$$9t^2 - 28t + 3 = 0$$

$$D = (-28)^2 - 4 \cdot 9 \cdot 3 = 784 - 108 = 676$$

$$t_1 = \frac{28 - 26}{2 \cdot 9} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}; \quad t_2 = \frac{28 + 26}{2 \cdot 9} = \frac{54}{18} = 3$$

Вернемся к замене: $9^{\cos x} = \frac{1}{9}$

$$\cos x = -1 \\ x = \pi + \pi d, d \in \mathbb{Z}$$

$$\text{или } 9^{\cos x} = 3$$

$$\left(\frac{3}{3}\right)^{\cos x} = 3^1$$

$$2 \cos x = 1,$$

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

б) $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$

$$\frac{5\pi}{2} \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq 4\pi; \quad \frac{5\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq 4\pi$$

$$\frac{5}{2} \leq \frac{1}{3} + 2n \leq 4, n \in \mathbb{Z}; \quad \frac{5}{2} \leq -\frac{1}{3} + 2k \leq 4, k \in \mathbb{Z}$$

$$2\frac{1}{6} \leq 2n \leq 3\frac{2}{3}, n \in \mathbb{Z}; \quad 2\frac{5}{6} \leq 2k \leq 4\frac{1}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

$$1\frac{1}{12} \leq n \leq 1\frac{5}{6}, n \in \mathbb{Z}; \quad 1\frac{5}{12} \leq k \leq 2\frac{1}{6}, k \in \mathbb{Z}$$

n - нет чисел

$$k = 2$$

$$x_1 = -\frac{\pi}{3} + 2 \cdot 2\pi = \frac{11\pi}{3}$$

$$\frac{5\pi}{2} \leq \pi + \pi d \leq 4\pi$$

$$\frac{5}{2} \leq 1 + d \leq 4, d \in \mathbb{Z}$$

$$1\frac{1}{2} \leq d \leq 3, d \in \mathbb{Z}$$

$$d = 2, 3$$

$$x_2 = \pi + 2\pi = 3\pi$$

$$x_3 = \pi + 4\pi = 5\pi$$

Ответ: а) $x = \pi + \pi d, d \in \mathbb{Z}; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$

$$б) x_1 = \frac{11\pi}{3}; x_2 = 3\pi; x_3 = 5\pi$$

Комментарий.

Неверно решено тригонометрическое уравнение $\cos x = -1$.

Оценка эксперта: 0 баллов.


Пример 13.6.1

а) Решите уравнение $2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{6}$.

а) $2 \log_4^2(4\sin x) - 5 \log_4(4\sin x) + 2 = 0, \log_4(4\sin x) = t,$
 $2t^2 - 5t + 2 = 0; D = 25 - 16 = 9 = 3^2, t_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}; t_2 = \frac{5+3}{4} = 1;$
 $\log_4(4\sin x) = t_1 = \frac{1}{2}; \log_4(4\sin x) = \log_4 2, 4\sin x = 2; \sin x = \frac{1}{2};$
 $x \in \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$
 $\log_4(4\sin x) = t_2 = 1; \log_4(4\sin x) = \log_4 4; 4\sin x = 4; \sin x = 1;$
 $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ *Ответ:* $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

**Комментарий.**

Получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки при вычислении t_2 , но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.6.2

а) Решите уравнение $2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{6}$.

а) ОДЗ: $4\sin x > 0$
 $\sin x > 0$

Для любых x решим методом замены переменных
 Пусть $\log_4(4\sin x) = t; t > 0$

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

$$D = 25 - 4 \cdot 2 \cdot 2$$

$$D = 25 - 16$$

$$D = 9$$

$$t_1 = \frac{5+3}{2} \quad t_1 = 4$$

$$t_2 = \frac{5-3}{2} \quad t_2 = 1$$

Обратная замена

$$\log_4(4\sin x) = 1 \quad \text{или} \quad \log_4(4\sin x) = 4$$

$$4\sin x = 4$$

$$\sin x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$4\sin x = 256$$

$$\sin x = 64$$

Нет решений.

б) Произведем отбор на единичной окружности



$$-\frac{3\pi}{2}$$

$$\text{Ответ: а) } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; n \in \mathbb{Z} \text{ б) } -\frac{3\pi}{2}$$

Комментарий.

Получены неверные ответы не из-за вычислительной ошибки при нахождении корней квадратного уравнения.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 13.6.3

а) Решите уравнение $2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{6}$.

$2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$ $\log_4(4\sin x) = 4\sin x \neq 0$ $\log_4(4\sin x) = t$ ОДЗ
 $2t^2 - 5t + 2 = 0$ $D = 25 - 16 = 9$ $\sin x \neq 0$ $x \neq \pi k$ $k \in \mathbb{Z}$

$\log_4(4\sin x) = 2$ $8 = 4\sin x$ $\sin x = 2$
 $\log_4(4\sin x) = \frac{1}{2}$ $2 = 4\sin x$ $\sin x = \frac{1}{2}$

$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$ $n \in \mathbb{Z}$
 $[-\frac{3\pi}{2}; 0]$

Ответ: а) $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$
 б) $x = -\frac{7\pi}{6}$ $n \in \mathbb{Z}$

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n;$ б) $-\frac{7\pi}{6}$.

Комментарий.

При решении простейшего логарифмического уравнения допущена ошибка, которая не является вычислительной, кроме того при нахождении «ОДЗ» допущена ошибка, которая никак не может быть отнесена к вычислительным. Любая из этих ошибок уже не позволяет выставить положительный балл. Типичный пример выставления 0 баллов.

Оценка эксперта: 0 баллов.

2. Критерии проверки и оценка решений задания 14

Задание 14 — стереометрическая задача, она разделена на пункты a и b . В пункте a нужно **доказать** геометрический факт, в пункте b найти (вычислить) геометрическую величину.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта a и обоснованно получен верный ответ в пункте b	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте b ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта a и при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , ИЛИ при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте b с использованием утверждения пункта a , при этом пункт a не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	3

Задача 14 (демонстрационный вариант ЕГЭ 2025 г.)

В правильном тетраэдре $ABCD$ точки M и N — середины рёбер AB и CD соответственно. Плоскость α перпендикулярна прямой MN и пересекает ребро BC в точке K .

а) Докажите, что прямая MN перпендикулярна рёбрам AB и CD .

б) Найдите площадь сечения тетраэдра $ABCD$ плоскостью α , если известно, что $BK = 1$, $KC = 3$.

Решение.

а) В треугольнике ANB имеем: $AN = BN = \frac{\sqrt{3}}{2} CD$.

Следовательно, он равнобедренный с основанием AB , а его медиана NM перпендикулярна ребру AB .

Аналогично прямая MN перпендикулярна ребру CD .


б) Плоскость α , перпендикулярная прямой MN , параллельна прямым AB и CD , поскольку эти прямые перпендикулярны прямой MN .

Обозначим точки пересечения рёбер AC , AD и BD с

плоскостью α через L , P и Q соответственно. Тогда четырёхугольник $KLPQ$ является прямоугольником, поскольку его стороны KL и PQ параллельны ребру AB , стороны KQ и LP параллельны ребру CD , а прямые AB и CD перпендикулярны.

Треугольники KCL и KBQ равносторонние. Следовательно, $KL = KC = 3$, $KQ = BK = 1$, а площадь прямоугольника $KLPQ$ равна $KL \cdot KQ = 3$.

Ответ: б) 3.



Задание 14.1

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ с основанием $ABCD$ точка O — центр основания пирамиды, точка M — середина ребра SC , точка K делит ребро BC в отношении $BK : KC = 3 : 1$, а $AB = 2$ и $SO = \sqrt{14}$.

а) Докажите, что плоскость OMK параллельна прямой SA .


б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMK пересекает грань SAD .

Решение.

а) В треугольнике SAC отрезок OM является средней линией, а значит, прямые SA и OM параллельны.

Следовательно, плоскость OMK , содержащая прямую OM , параллельна прямой SA (точка K не лежит в плоскости SAC).

б) Пусть прямая OK пересекает ребро AD в точке L . Тогда треугольники AOL и COK равны, поскольку $\angle LAO = \angle KCO$, $\angle AOL = \angle COK$ и $AO = CO$. Следовательно: $AL = CK$; $AL : LD = CK : KB = 1 : 3$.



Боковое ребро $SA = \sqrt{SO^2 + OA^2} = \sqrt{SO^2 + \frac{AB^2}{2}} = 4$.

Обозначим точку пересечения плоскости OMK и прямой SD через N . Прямые SA и NL , содержащиеся в плоскости SAD , параллельны, поскольку плоскость OMK , содержащая прямую NL , параллельна прямой SA . Следовательно, треугольники SDA и

NDL подобны с коэффициентом подобия $\frac{LD}{AD} = \frac{3}{4}$. Значит, $NL = \frac{3}{4}SA = 3$.

Ответ: б) 3.

Задание 14.2

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 3$ и $BC = 2$. Точка M делит ребро A_1D_1 в отношении $A_1M : MD_1 = 1 : 2$, а точка K — середина ребра DD_1 .

- а) Докажите, что плоскость MKC делит отрезок BB_1 пополам.
 б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью MKC , если $\angle MKC = 90^\circ$, $\angle ADC = 60^\circ$.

Решение.

а) Боковая грань BCC_1B_1 призмы параллельна грани ADD_1A_1 , поскольку составляющие их рёбра соответственно параллельны. Проведём через вершину C прямую, параллельную KM . Пусть эта прямая пересекает ребро BB_1 в точке N , а продолжение ребра B_1C_1 в точке E , а прямая EM пересекает ребро A_1B_1 в точке L (рис. 1).




Рис. 1

Прямоугольные треугольники CBN и MD_1K равны, поскольку равны их катеты BC и MD_1 , а также острые углы, ввиду параллельности соответствующих сторон. Следовательно,

$$BN = D_1K = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}BB_1,$$

а значит, точка N — середина ребра BB_1 .

б) Пусть высота призмы равна $2x$. Тогда $B_1N = BN = DK = x$.

В равнобедренной трапеции с основаниями 3 и 2 и углом 60° боковые стороны равны 1, то есть $A_1B_1 = CD = 1$.

Прямоугольные треугольники EB_1N и CBN равны по катету и углу при вершине N . Значит,

$$EN^2 = NC^2 = BN^2 + BC^2 = x^2 + 4.$$

Из прямоугольных треугольников CDK и NCK имеем:

$$CK^2 = CD^2 + DK^2 = x^2 + 1; \quad NK^2 = NC^2 + CK^2 = x^2 + 4 + x^2 + 1 = 2x^2 + 5.$$

Для треугольника B_1CD имеем:

$$BD^2 = BC^2 + CD^2 - 2BC \cdot CD \cdot \cos 120^\circ = 7.$$

Поскольку $NK = BD$, получаем: $2x^2 + 5 = 7$, откуда $x = 1$.

Следовательно, $CK = \sqrt{2}$, $EN = NC = MK = \sqrt{5}$.

Площадь прямоугольной трапеции $MKCE$ равна

$$\frac{1}{2} \cdot CK \cdot (MK + EC) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot (\sqrt{5} + 2\sqrt{5}) = \frac{3\sqrt{10}}{2}.$$

Треугольники A_1ML и B_1EL подобны, значит, $EL : LM = EB_1 : MA_1 = 2 : 1$, а площади треугольников ELN и EMN относятся как $2 : 3$ (рис. 2). Тогда площадь треугольника ELN равна

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \frac{\sqrt{10}}{3}.$$

Площадь сечения $MKCNL$ равна разности площадей трапеции $MKCE$ и треугольника ELN :

$$\frac{3\sqrt{10}}{2} - \frac{\sqrt{10}}{3} = \frac{7\sqrt{10}}{6}.$$

Ответ: б) $\frac{7\sqrt{10}}{6}$.




Рис. 2

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта a и обоснованно получен верный ответ в пункте b	3
Получен обоснованный ответ в пункте b ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта a и при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , ИЛИ при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте b с использованием утверждения пункта a , при этом пункт a не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
<i>Максимальный балл</i>	<i>3</i>

Задание 14.3

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точки M и N — середины рёбер AB и AD соответственно.

а) Докажите, что прямые $B_1 N$ и CM перпендикулярны.


б) Плоскость α проходит через точки N и B_1 параллельно прямой CM . Найдите расстояние от точки C до плоскости α , если $B_1 N = 6$.

Решение.

а) Пусть отрезки NB и MC пересекаются в точке E . Прямоугольные треугольники NAB и MBC равны по двум катетам, значит,

$$\begin{aligned} \angle MEB &= 180^\circ - (\angle EMB + \angle EBM) = \\ &= 180^\circ - (\angle EMB + \angle MCB) = 90^\circ. \end{aligned}$$

Отрезок BN — проекция отрезка NB_1 на плоскость ABC . Следовательно, по теореме о трёх перпендикулярах прямые $B_1 N$ и CM перпендикулярны.



б) Пусть плоскость α пересекает ребро CD в точке L . Прямые NL и CM , лежащие в плоскости ABC , параллельны, поскольку прямая NL лежит в плоскости α , параллельной прямой CM . Следовательно, $\angle DLN = \angle DCM = \angle BMC$, а значит, прямоугольные треугольники DLN и BMC подобны по острому углу. Получаем:

$$DL = BM \cdot \frac{DN}{BC} = \frac{AB}{2} \cdot \frac{AD}{2BC} = \frac{CD}{4}.$$

Заметим, что $\angle LNB_1 = 90^\circ$, поскольку прямая $B_1 N$ перпендикулярна прямой NL , параллельной прямой CM . Пусть ребро куба равно a . Получаем:

$$36 = B_1 N^2 = AN^2 + AB^2 + BB_1^2 = \frac{9a^2}{4},$$

откуда

$$a = 4; \quad BB_1 = a = 4, \quad DN = 2, \quad CL = 3, \quad LN = \frac{a\sqrt{5}}{4} = \sqrt{5}.$$

Объём пирамиды $CNLB_1$ равен $\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} CL \cdot DN \right) \cdot BB_1 = 4$.

С другой стороны, объём этой пирамиды равен $\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} NB_1 \cdot LN \right) \cdot x = x\sqrt{5}$,

где x — расстояние от точки C до плоскости α . Из равенства $x\sqrt{5} = 4$ получаем

$$x = \frac{4\sqrt{5}}{5}.$$

Ответ: б) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

Задание 14.4

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона AB основания равна 6, а боковое ребро AA_1 равно 3. На рёбрах AB и B_1C_1 отмечены точки K и L соответственно, причём $AK = B_1L = 2$. Точка M – середина ребра A_1C_1 . Плоскость γ параллельна прямой AC и содержит точки K и L .

а) Докажите, что прямая BM перпендикулярна плоскости γ .

б) Найдите объём пирамиды, вершина которой – точка M , а основание – сечение данной призмы плоскостью γ .

Решение.

а) Проведём через точки K и L прямые, параллельные AC . Пусть эти прямые пересекают рёбра BC и A_1B_1 в точках K_1 и L_1 соответственно (рис. 1). Тогда трапеция KL_1LK_1 является сечением исходной призмы плоскостью γ . Рассмотрим плоскость BB_1M . Пусть эта плоскость пересекает прямые AC , KK_1 и LL_1 в точках N , E и F соответственно. Четырёхугольник BB_1MN – прямоугольник, причём $BB_1 = 3$,




Рис. 1

$$B_1M = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot A_1B_1 = 3\sqrt{3}.$$

Кроме того, $NE : EB = AK : KB = 1 : 2$, $B_1F : FM = B_1L : LC_1 = 1 : 2$, откуда $MF = 2\sqrt{3}$, $NE = \sqrt{3}$. Пусть EH – высота трапеции $EFMN$ (рис. 2), тогда

$$FH = MF - NE = \sqrt{3}.$$

$$\text{Поскольку } \operatorname{tg} \angle MFE = \frac{EH}{FH} = \sqrt{3} = \frac{MB_1}{BB_1} = \operatorname{tg} \angle MBB_1,$$

$$\angle MFE = \angle MBB_1 = 90^\circ - \angle BMF,$$

то есть прямые EF и BM перпендикулярны.




Рис. 2

Прямая KK_1 параллельна прямой AC , которая перпендикулярна плоскости BB_1M . Значит, прямые KK_1 и EF перпендикулярны прямой BM , поэтому прямая BM перпендикулярна плоскости γ .

б) Расстояние от точки M до плоскости γ равно $MF \cdot \sin \angle MFE$, а площадь трапеции KL_1LK_1 равна

$$\frac{KK_1 + LL_1}{2} \cdot EF = \frac{\frac{2}{3}AC + \frac{1}{3}A_1C_1}{2} \cdot \frac{EH}{\sin \angle MFE} = \frac{9}{\sin \angle MFE}.$$

$$\text{Значит, искомый объём равен } \frac{1}{3} \cdot MF \cdot \sin \angle MFE \cdot \frac{9}{\sin \angle MFE} = 6\sqrt{3}.$$

Ответ: б) $6\sqrt{3}$.

Задание 14.5

Основанием четырёхугольной пирамиды $PABCD$ является трапеция $ABCD$, причём $\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ$. Плоскости PAB и PCD перпендикулярны плоскости основания, K – точка пересечения прямых AB и CD .

- а) Докажите, что плоскости PAB и PCD перпендикулярны.
 б) Найдите объём пирамиды $KBCP$, если $AB = BC = CD = 4$, а высота пирамиды $PABCD$ равна 9.

Решение.

а) Заметим, что $\angle AKD = 90^\circ$. Плоскости PAB и PCD перпендикулярны плоскости основания, поэтому они пересекаются по прямой, содержащей высоту пирамиды. Значит, PK – высота пирамиды. Таким образом, угол $\angle AKD$ является линейным углом двугранного угла между плоскостями PAB и PCD . Значит, они перпендикулярны.

б) Поскольку $AB = CD$, трапеция $ABCD$ является равнобедренной. Значит,

$$\angle BAD = \angle ADC = \angle KBC = \angle KCB = 45^\circ;$$


$$BK = CK = \frac{\sqrt{2}}{2} BC = 2\sqrt{2}.$$

Таким образом, площадь треугольника KBC равна

$$S_{KBC} = \frac{BK \cdot CK}{2} = 4,$$

а объём пирамиды $KBCP$ равен $\frac{PK \cdot S_{KBC}}{3} = 12$.

Ответ: б) 12.



Задание 14.6

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно 7. На рёбрах CD и SC отмечены точки N и K соответственно, причём $DN:NC = SK:KC = 1:5$. Плоскость α содержит прямую KN и параллельна прямой SA .

- а) Докажите, что плоскость α параллельна прямой BC .
 б) Найдите расстояние от точки C до плоскости α .

Решение.

а) По условию $DN:NC = SK:KC$, значит, прямые SD и KN параллельны. Следовательно, плоскости SAD и α параллельны (рис. 1).

Поскольку отрезки BC и AD параллельны, а плоскость α параллельна плоскости SAD , прямая BC параллельна плоскости α .

б) Поскольку плоскость α параллельна прямой BC , расстояние от точки C до плоскости α равно расстоянию от прямой BC до плоскости α . Пусть точки E и F – середины рёбер AD и BC соответственно. Тогда прямые SF и EF перпендикулярны прямой BC . Таким образом, плоскость SEF перпендикулярна прямой BC и параллельной ей плоскости α . Пусть плоскость α пересекает прямые SF и EF в точках Q и R соответственно (рис. 2). Тогда искомое расстояние равно расстоянию h от точки F до прямой QR . Высота SO пирамиды $SABCD$ лежит в плоскости SEF , откуда

$$EF = 6, SE = \sqrt{SA^2 - \frac{AD^2}{4}} = 2\sqrt{10};$$

$$\cos \angle SEO = \frac{EF}{2SE} = \frac{3}{2\sqrt{10}}.$$

Плоскости SAD и α параллельны, поэтому $\angle QRF = \angle SEO$, откуда

$$h = RF \sin \angle QRF = \frac{5EF}{6} \cdot \sqrt{1 - \frac{9}{40}} = \frac{\sqrt{310}}{4}.$$

Ответ: б) $\frac{\sqrt{310}}{4}$.




Рис. 1




Рис. 2

Примеры оценивания выполнения задания 14

Пример 14.1.1


В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ с основанием $ABCD$ точка O — центр основания пирамиды, точка M — середина ребра SC , точка K делит ребро BC в отношении $BK:KC = 3:1$, а $AB = 2$ и $SO = \sqrt{14}$.

- Докажите, что плоскость OMK параллельна прямой SA .
- Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMK пересекает грань SAD .

Ответ: б) 3.


✓ 14
 Дано:
 Правильная четырёхугольная пирамида;
 M — середина SC ;
 $BK:KC = 3:1$;
 $AB = 2$
 $SO = \sqrt{14}$

Доказать: $OMK \parallel SA$.



а) 1) $AO = OC$
 по свойству квадрата;
 2) MO — сред. линия;
 т.к. S — верш. и $AO = OC$
 и $AO = OC$
 3) $MO \parallel AC$
 $MO \parallel AS$
 $MOK \parallel AS$
 по свойству параллельности
 с плоскостью и принадлеж-
 ности.

- а) проведём KO до пересечения с прямой AD ;
 1) OK пересечёт AD в точке F .
 2). т.к. $OMK \parallel AS$; то плоскость пересечёт
 плоскость ASD по прямой которая $\parallel AS$;
 проведём прямую параллельную AS из точки F .
 3) Эта прямая пересечёт SD в точке P .
 соединим FP ;
 4) $FPMK$ — сечение.
 5) $\triangle AFO = \triangle OKC$
 по свойству угла и отрезка; $\angle FAO = \angle OKC$ (противоположные)
 $\angle FOA = \angle COK$ (вертикальные)
 $AO = OK$.
 $\therefore AF = KC = x$
 и $FD = BK = 3x$.



7) $FP \parallel SA \Rightarrow \triangle ASP \sim \triangle FPD$.

\Downarrow
 $FP = SA \cdot k = SA \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4} SA$

8) По Т. Пифагора:

$PB^2 = 4 + 4 \Rightarrow PB = 2\sqrt{2}$;

$DD = \frac{1}{2} PB = \sqrt{2}$

9) По Т. Пифагора: $SD = \sqrt{2 + 4} = 4$;

10)

$AS = SD = 4$ тк AD — медиана равнобедренного треугольника

\Downarrow
 $FP = \frac{3}{4} SA = \frac{3}{4} \cdot 4 = 3$

Ответ: 3.

Комментарий.

Верное доказательство утверждения пункта а и обоснованный верный ответ в пункте б.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 14.1.2

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ с основанием $ABCD$ точка O — центр основания пирамиды, точка M — середина ребра SC , точка K делит ребро BC в отношении $BK:KC=3:1$, а $AB=2$ и $SO=\sqrt{14}$.

а) Докажите, что плоскость OMK параллельна прямой SA .

б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMK пересекает грань SAD .

Ответ: б) 3.

№14.

а) L - точка пересечения плоскости OMK с ребром SD
 N - точка пересечения плоскости OMK с ребром AD
 $LN \in (SAD)$ и $SA \in (SAD) \Rightarrow$
 если $LN \parallel SA$, то $SA \parallel (OMK)$

Рассмотрим $\triangle RFO$ и $\triangle RTO$
 TF - прямая проходящая через O
 $TF \parallel AD$) $TO = TF$, так O - центр квадрата
 $\angle OFR = \angle OTR = 90^\circ$, как вертикальные

$\triangle RFO = \triangle RTO$ по катету и острому углу
 $\angle OFR = \angle OTR = 90^\circ$

$AF = TC$ $AN \parallel CK \Rightarrow AN \parallel CK \parallel TF \Rightarrow AN = CK$ (так как $FA \parallel NO$ - равные прямоугольные треугольники)
 так $AN = CK$ $\frac{AN}{ND} = \frac{CK}{KC} = \frac{1}{3}$

Рассмотрим $\triangle CKR \sim \triangle DNK$ ($DN \parallel CK \Rightarrow \angle KCN = \angle KDN = 90^\circ$
 $\angle KND = \angle KCK$, как соответ. \Rightarrow треугольники подобны по 2 углам)
 $\frac{RC}{KD} = \frac{CK}{ND} = \frac{CK}{BK} = \frac{1}{3}$
 $KD = KC + DC = KC + 2$

$\frac{RC}{KC+2} = \frac{1}{3}$ $3RC = KC + 2$ $2RC = 2 - KC = 1$ $RC = \frac{1}{2}$


$\triangle ESM = \triangle RCM$, $SM = MC$ по ус.
 $\angle SME = \angle CMR$, как верт.
 $\angle SEM = \angle MRC$, как соответ. углы $\Rightarrow \angle ESM = \angle MCR$
 \Rightarrow треугольники подобны по двум сторонам и прилежащим к ним углам \Rightarrow

$\Rightarrow ES = CR = \frac{1}{2}$
 $\triangle ESL \sim \triangle RLD$ по двум углам $\angle SEL = \angle RLD$, как соответ. углы
 $\angle SLE = \angle RLK$, как верт.
 $\frac{ES}{LD} = \frac{SL}{LK}$ $KD = KC + DC = 1 + 2 = 3$

$$\frac{I}{3} = \frac{SL}{LD} \Rightarrow \frac{DL}{LD} = \frac{AN}{NA} = \frac{1}{3}, \text{ но } \tau \text{ о } \text{нечн. отрезках} \Rightarrow$$

$\Rightarrow LN \parallel SA \Rightarrow SA \parallel (OMK) \perp \Delta$

8)



Тк $LN \parallel SA$
 $\angle DLN = \angle DSA$, как соответ \Rightarrow
 $\Rightarrow \Delta DLN \sim \Delta DSA$ по двум углам
 $\angle DLN = \angle DSA$ и $\angle SDN = \angle SDA$ - общий

$$\frac{DL}{LS} = \frac{SN}{NA} \text{ отсюда } DL = 3x \quad LS = x$$

$$\frac{DL}{DS} = \frac{DL}{DL+LS} = \frac{3x}{3x+x} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{DL}{DS} = \frac{LN}{SA} = \frac{3}{4}$$

Сделаем по теореме Пифагора гол ΔASD

$$SD = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$$

$$SO = \frac{1}{2} SD = \sqrt{2}$$

по теореме Пифагора гол ΔSOB

$$SB = \sqrt{4+2} = 4$$

Тк. пирамида правильная $SB = SA$

$$\frac{LN}{SA} = \frac{LN}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow LN = 3$$

Отв. $LN = 3$

Комментарий.

Верное доказательство утверждения пункта а и обоснованный верный ответ в пункте б.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 14.1.3


В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ с основанием $ABCD$ точка O — центр основания пирамиды, точка M — середина ребра SC , точка K делит ребро BC в отношении $BK : KC = 3 : 1$, а $AB = 2$ и $SO = \sqrt{14}$.

а) Докажите, что плоскость OMK параллельна прямой SA .

б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMK пересекает грань SAD .

Ответ: б) 3.

14



а) 3-2у, что т.к. пирам-прав \rightarrow АРХО-4
 \rightarrow $\varphi \in AC \rightarrow O_1 \in AC$ и O -сер AC
 (из центра AB)
 рассм $\triangle ASC$: $O \in AC$;
 $M \in SC$; M -сер SC ; O -сер $AC \Rightarrow$
 MO -сер $\triangle ASC \Rightarrow MO \parallel AS \Rightarrow$
 площ $МОК \parallel SA$ т.к $МО \subset (МОК)$ и
 $МО \parallel SA$ \Rightarrow

Комментарий.

Верное доказательство утверждения пункта а. Решение пункта б отсутствует.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 14.1.4

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ с основанием $ABCD$ точка O — центр основания пирамиды, точка M — середина ребра SC , точка K делит ребро BC в отношении $BK:KC=3:1$, а $AB=2$ и $SO=\sqrt{14}$.

- а) Докажите, что плоскость OMK параллельна прямой SA .
- б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMK пересекает грань SAD .

Ответ: б) 3.

Задана 14

Дано. $AB=2; SO=\sqrt{14}$
 $BK:KC=3:1$
 а) Доказ-ть $(OMK) \parallel SA$
 б) найти длину отрезка, по которому (OMK) пересекает грань SAD

Решение

1) Проверим линии $(OMK) \parallel SA$
 2) Т.к. пирамида правильная $\Rightarrow O \perp$ середина AC
 M — середина $SC \Rightarrow MO$ — сред. линия ΔSAC
 $\Rightarrow MO \parallel SA$
 $MO \in (OMK) \Rightarrow (OMK) \parallel SA$
 (признак \parallel прямой и плоскости — т.к. прямая параллельна плоскости, то и любая другая прямая, параллельная этой, тоже параллельна плоскости)

б) SO — высота $= \sqrt{14}$; $AC=2\sqrt{2}$ (квадрат)
 $\Rightarrow AO=\sqrt{2}=\frac{1}{2}AC \Rightarrow \Delta SOA$ — Δ \Rightarrow катетов
 $SA=\sqrt{SO^2+AO^2}=\sqrt{14+2}=\sqrt{16}=4 \Rightarrow SM=MS=2$.

4) KL и MN — проекции BK и CM на (ABC)
 $\Rightarrow BL:LO=3:1; ON=NC$

5) Вспомогат. теорема по теореме о пропорциях прямая LN делит AB в отношении $1:2$
 (проходящая через E)

Соотношения на рисунке \Rightarrow
 $BE \cdot EA = 4 \cdot 2 = 8 \Rightarrow BE = \frac{8}{3}$
 $EO \cap AD = F \Rightarrow CF, FD = 1 \text{ и } 2$

6) Вспомогат. теорема $EF \cap AD = R$
 $EA = \frac{2}{3} FD = \frac{4}{3}$ и $EA \parallel DF \Rightarrow$
 EA — средняя линия
 $RA = AK = 2$

Комментарий.

Решалась другая задача: точка K лежит на стороне основания, а не на боковом ребре.


Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 14.2.1

В основании прямой призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежит равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 3$ и $BC = 2$. Точка M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении $A_1 M : MD_1 = 1 : 2$, а точка K — середина ребра DD_1 .

- а) Докажите, что плоскость MKC делит отрезок BB_1 пополам.
 б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью MKC , если $\angle MKC = 90^\circ$, $\angle ADC = 60^\circ$.

Ответ: б) $\frac{7\sqrt{10}}{6}$.



№14. Дано: $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — призма, $ABCD$ — равноб. трап., $AD = 3, BC = 2$, $M \in A_1 D_1, A_1 M : MD_1 = 1 : 2, K$ — ср. DD_1 , а) Док: $(MKC) \cap BB_1 = N$ — ср. BB_1 , б) $S_{сеч} = ?$, $\angle MKC = 90^\circ, \angle ADC = 60^\circ$.

а) Д.п. ~~$AD \parallel A_1 D_1, DL \perp AD$~~ ; $F = (MKC) \cap A_1 B_1$; $E = \Pi_{(ABC)}^M, G = \Pi_{(AB_1 C_1)}^F$
 Т.к. $A_1 D_1 = AD = 3$ и $A_1 M : MD_1 = 1 : 2$, то $A_1 M = 1, MD_1 = 2$.

$A_1 D_1 \parallel AD, ML$ — ссек. $\Rightarrow \angle D_1 M K = \angle K L D$.
 $\left. \begin{array}{l} \angle K D_1 M = \angle K D L = 90^\circ \\ D_1 K = KD \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta K D_1 M = \Delta K D L \Rightarrow DL = D_1 M = 2$

$(B_1 C_1 C) \parallel (A_1 D_1 D), MK = (MKC) \cap (A_1 D_1 D), NC = (MKC) \cap (B_1 C_1 C) \Rightarrow MK \parallel NC$

$MK \parallel NC, BC \parallel AD \Rightarrow \angle NCB = \angle M L A$
 $\left. \begin{array}{l} \angle NBC = \angle K D L = 90^\circ \\ BC = DL = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta NBC = \Delta K D L \Rightarrow NB = KD = \frac{1}{2} BB_1 = \frac{1}{2} AA_1 = NB_1$

б) Д.п. $H = \Pi_{AD}^C$. Т.к. трап. равнобедр., то $HD = \frac{AD - BC}{2} = 0,5$ ^{ЧТД.}

$CH = HD \tan \angle ADC = 0,5\sqrt{3}$. $CD = \frac{HD}{\cos \angle ADC} = 1$.

$\angle MKC = 90^\circ \Rightarrow MC^2 = MK^2 + KC^2$. Пусть $h = \frac{1}{2} AA_1 = DK$. $AA_1 = EM = 2h$

$MC^2 = ME^2 + EC^2 = ME^2 + EH^2 + HC^2$ $EH = ED - HD = MD_1 - HD = 1,5$

$MC^2 = 4h^2 + 2,25 + 0,75 = 4h^2 + 3$

$KC^2 = CD^2 + KD^2 = 1 + h^2$ $MK^2 = MD_1^2 + D_1 K^2 = 4 + h^2$

$4h^2 + 3 = 4 + h^2 + 1 + h^2$ $2h^2 = 2$ $h = 1$ $AA_1 = 2$ $\angle CDL = 180^\circ - \angle ADC = 120^\circ$
 По т. косинусов $CL^2 = CD^2 + DL^2 - 2CD \cdot DL \cdot \cos \angle CDL = 1 + 4 + 1 \cdot 2 = 7$ $CL = \sqrt{7}$

$(MKC) \cap (ABC) = CL, (MKC) \cap (ABC_1) = FM, (ABC) \parallel (ABC_1) \Rightarrow FM \parallel CL$
 Т.к. $E = \Pi_{(ABC)}^M, G = \Pi_{(ABC)}^F, (ABC) \parallel (ABC_1) \Rightarrow E = FM, G = E \parallel FM$
 Тогда $GE \parallel CL \Rightarrow \angle GEA = \angle CLH$. $\sin \angle GEA = \sin \angle CLH = \frac{CH}{CL} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$
 ~~$\sin \angle GEA = \sin \angle ADC$ (p/d тран.)~~ $\angle GAE = \angle ADC$
 $\sin \angle AGE = \sin(180^\circ - \angle GAE - \angle GEA) = \sin(120^\circ - \angle GEA) = \sqrt{1 - \sin^2 \angle GEA} = \frac{5}{2\sqrt{2}}$
 $= \sin 120^\circ \cos \angle GEA - \cos 120^\circ \sin \angle GEA = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{5}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{5}{2\sqrt{2}}$
 По т. синусов $\frac{GE}{\sin \angle GEA} = \frac{AE}{\sin \angle AGE} \Rightarrow GE = AE \cdot \frac{\sin \angle GEA}{\sin \angle AGE} = A_1M \cdot \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} =$
 $= \frac{A_1M}{3} = \frac{1}{3}$. $S_{AGE} = \frac{1}{2} AE \cdot EG \cdot \sin \angle AEG = \frac{1}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{12\sqrt{2}}$
 $S_{GEDCB} = S_{ABCD} - S_{AGE} = \frac{(BC+AD) \cdot CH}{2} - \frac{\sqrt{3}}{12\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{12\sqrt{2}}$
 Введём систему координат как на рисунке. $L(5; 0; 0) M(1; 0; 2)$
 $C(3 - 0,5; -0,5\sqrt{3}; 0) C(2,5; -0,5\sqrt{3}; 0)$
 $(ABC): z=0, x, y \text{ - любые } (MCK): Ax + By + Cz + t = 0$
 $\begin{cases} A + 2C + t = 0 \\ 5A + t = 0 \\ 2,5A - 0,5\sqrt{3}B + t = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{5} \\ C = -\frac{2}{5} \\ B = \sqrt{3} \end{cases}$ $(MCK): -\frac{1}{5}x + \frac{\sqrt{3}}{5}y - \frac{2}{5}z + t = 0 \quad | \cdot 5$
 $3x - \sqrt{3}y + 6z - 15 = 0$
 \vec{n}_1 и \vec{n}_2 - нормали к (ABC) и (MCK) . $\vec{n}_1 \{0; 0; 1\}$ $\vec{n}_2 \{3; -\sqrt{3}; 6\}$
 $\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \frac{6}{1 \cdot \sqrt{9+3+36}} = \frac{3}{\sqrt{30}} = \cos((ABC); (MCK)) = \frac{\sqrt{3}}{10}$
 $S_{GEDCB} = \Pi_{(ABC)}^{MCKNF} \Rightarrow S_{MCKNF} = \frac{S_{GEDCB}}{\cos((ABC); (MCK))} = \frac{5\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{12\sqrt{2}} \cdot \frac{10}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{12\sqrt{2}}$

Комментарий.

Верное доказательство утверждения пункта а и получен неверный ответ в пункте б (не арифметическая ошибка).


Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 14.2.2

В основании прямой призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежит равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 3$ и $BC = 2$. Точка M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении $A_1 M : MD_1 = 1 : 2$, а точка K — середина ребра DD_1 .

- а) Докажите, что плоскость MKC делит отрезок BB_1 пополам.
 б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью MKC , если $\angle MKC = 90^\circ$, $\angle ADC = 60^\circ$.

Ответ: б) $\frac{7\sqrt{10}}{6}$.




№14

Реш: $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — прямая призма
 $ABCD$ — равнобедренная трапеция
 $AD = 3; BC = 2$
 $M \in A_1 D_1; \frac{A_1 M}{MD_1} = \frac{1}{2}$
 $K \in DD_1; KD = KD$

а) Дока-ть: (MKC) делит BB_1 пополам

б) Найдти: $S_{\text{сеч } MKC}$



Решение:
 1) $\frac{A_1 M}{MD_1} = \frac{1}{2}$ и $A_1 D_1 = 3 \Rightarrow A_1 M = \frac{1}{3} A_1 D_1 = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$
 $MD_1 = A_1 D_1 - A_1 M = 3 - 1 = 2$
 2) Проверим принадлежность $MK \subset (ADD_1)$
 Проверим $KC \subset (ADD_1)$
 3) $BC \parallel AD$, т.к. $ABCD$ — трап.
 $AD \subset (ADD_1) \Rightarrow BC \parallel (ADD_1)$ (по признаку параллельности прямой и плоскости)
 $BC \parallel AD \Rightarrow BC \parallel (ADD_1)$
 $BC \parallel (ADD_1); KC \subset (ADD_1)$ (т.к. прямая принадлежит плоскости) $\Rightarrow BC \parallel KC$

$(BCC_1) \parallel (ADD_1)$ по признаку параллельности плоскостей.

4) $(BCC_1) \parallel (ADD_1)$ и $(MKC) \cap (BCC_1) = MK$ и $(MKC) \cap (ADD_1) = MN$
 $(MKC) \cap (ADD_1) = MN$
 $(MKC) \cap (B_1 C_1 C) = CN$, где N — точка на пр. BB_1
 $MK \parallel CN$ (по следствию из параллельности плоскостей)

5) В $\triangle KDC$, $\angle C = \angle KDC = 90^\circ$ (т.к. прямая принадлежит плоскости):

$$\tan \angle D_1 K M = \frac{2}{h} = 4h, \text{ где } h \text{ — высота призмы}$$

$$\left. \begin{array}{l} KC \parallel DD_1 \\ NC \parallel MK \end{array} \right\} \angle D_1 K M = \angle C_1 C N \Rightarrow \tan \angle C_1 C N = \tan \angle D_1 K M = 4h$$

$$\angle BCC_1 = 90^\circ \Rightarrow \tan \angle BCN = \tan(90^\circ - \angle C_1 C N) = \cot \angle C_1 C N = \frac{1}{4h}$$

Тогда в $\triangle CAN$ ($\angle CBN = 90^\circ$, т.к. прямая принадлежит плоскости):

Тогда в $\triangle CAN$ ($\angle CBN = 90^\circ$, т.е. $\triangle CAN$ - прямоугольный):

$$\tan \angle CAN = \frac{BN}{BC} = \frac{1}{4h} \Rightarrow BN = \frac{BC}{4h} = \frac{2}{4h} = \frac{1}{2h}$$

т.к. $BB_1 = h$ как высота, а $BN = \frac{1}{2}$, то $B_1N = BB_1 - BN = h - \frac{1}{2} = \frac{h}{2}$ и

$$BN = B_1N = \frac{h}{2}, \text{ т.е. } N - \text{середина } BB_1, \quad \text{Ч.Т.Д.}$$

б) Соединим C_1N в (CBB_1) .

в) Расклевываем многогранник координатными осями. ось x - вдоль AD (и A_1D_1); ось y - вдоль AB (и A_1B_1); ось z - вдоль AA_1 (и BB_1).

A_1A , AA_1 (см. рисунок), а γ - начало координат. Тогда

$$A(0; 0; 0); D(3; 0; 0); A_1(0; 0; h); D_1(3; 0; h);$$

В трап. $ABCD$ проведем перпендикуляры BH_1 и CH_2

т.к. $AB = CD$ по условию, то $\triangle AH_1B = \triangle DH_2C$ по катетам B и C

и гипотенузе ($AB = CD$). Отсюда $AH_1 = DH_2$

$$AH_1 = DH_2, \quad H_1H_2 = BC = 2 \quad (H_1, H_2 \text{ - середины } CB \text{ - медианы})$$

$$AH_1 = DH_2 = \frac{3-2}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{В } \triangle AH_1B \text{ и } \triangle DH_2C: BH_1 = CH_2 = \tan 60^\circ \cdot H_1D = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{А } AB = DC = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{1} = 1.$$

$$\text{Тогда } B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right); C\left(\frac{5}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right); B_1\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; h\right); C_1\left(\frac{5}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; h\right).$$

Ранее: $M(1; 0; h); K(3; 0; \frac{h+0}{2}) = K(3; 0; \frac{h}{2})$ как середина DD_1 .

$$\text{По теореме Пифагора в } \triangle MDK: MK = \sqrt{4 + \frac{h^2}{4}} = \sqrt{\frac{16+h^2}{4}}$$

$$\text{По теореме Пифагора в } \triangle CDK: CK = \sqrt{1 + \frac{h^2}{4}} = \sqrt{\frac{4+h^2}{4}}$$

$$\text{По теореме Пифагора в } \triangle MKC: MC = \sqrt{\frac{16+h^2}{4} + \frac{4+h^2}{4}} = \sqrt{\frac{20+h^2}{4}}$$

$$= \sqrt{\frac{20+h^2}{4}} = \sqrt{\frac{10+h^2}{2}}$$

Найдем MC координатным способом: $MC = \sqrt{\left(\frac{5}{2}-1\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}-0\right)^2 + (h-0)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4} + h^2} = \sqrt{\frac{12}{4} + h^2} = \sqrt{3+h^2}$.

$$\text{Итак, } MC = \sqrt{\frac{10+h^2}{2}} = \sqrt{3+h^2} \Rightarrow \frac{10+h^2}{2} = 3+h^2 \Rightarrow 5 + \frac{h^2}{2} = 3+h^2 \Rightarrow$$

$$\frac{h^2}{2} = 2 \Rightarrow h^2 = 4 \Rightarrow h = \pm 2 \quad (-2 \text{ не ур. ур.}) \quad \boxed{h=2}$$

Проведем SN до пересеч. с B_1C_1 (впл. B_1C_1C), пусть
 $SN \cap B_1C_1 = L$.

$\Delta SNB_1 \sim \Delta SCC_1$, по какому-то отношению ($\angle S$ - общий) $\Rightarrow \frac{SB_1}{SC_1} = \frac{NB_1}{CC_1} = \frac{1}{2}$

$$\frac{SB_1}{SC_1} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{SB_1}{SB_1 + B_1C_1} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{SB_1}{SB_1 + 2} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2SB_1 = SB_1 + 2 \Rightarrow SB_1 = 2$$

~~Пусть $SN = 3$~~

Пусть M - середина перпендикула на B_1C_1 : MH_3

$$B_1H_3 = \frac{1}{2}; B_1S = 1,5; \text{угол } SH_3M \text{ по теореме Пифагора:}$$

$$MS = \sqrt{1,5^2 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{18}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{19}{4}} = \frac{\sqrt{19}}{2}$$

$\Delta A_1EM \sim \Delta B_1ES$ (так как $\angle EBS$ как м/л при $\parallel A_1D_1$ и A_1C_1 , смежные A_1B_1)
 $\angle A_1EM = \angle B_1ES$ как вертикал.

Следовательно, $\frac{A_1M}{SB_1} = \frac{A_1E}{B_1E} = \frac{1}{2} : \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

$$AB_1 = 1 \Rightarrow A_1E = \frac{1}{3}; AK = \frac{1}{4} AB_1 = \frac{1}{4}; B_1K = \frac{3}{4}$$



Соединим MK и KN .

$$MK = \sqrt{\left(\frac{6+4}{4}\right)^2 + \left(\frac{2-0}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{16+4}{4}} = \sqrt{\frac{20}{4}} = \sqrt{5}$$

$$CN = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}; \text{ ~~AK =~~$$

$$MK = \sqrt{(3-0)^2 + (0-0)^2}$$

$$L = \left(\frac{3 \cdot 0 + 0 \cdot 1}{3+0}; \frac{3 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{3+0} \right) = \left(0; 0 \right)$$



Комментарий.

Доказательство утверждения в пункте а не обосновано – неверно найден $\text{tg} \angle D_1KM = 2 : (0,5h) = 4h$. Решение пункта б не завершено.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 14.3.1

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точки M и N — середины рёбер AB и AD соответственно.

а) Докажите, что прямые $B_1 N$ и CM перпендикулярны.

б) Плоскость α проходит через точки N и B_1 параллельно прямой CM . Найдите расстояние от точки C до плоскости α , если $B_1 N = 6$.

Ответ: б) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

а) Введем ПСК оxyz, направим Ox по BA, Oy — по BC, Oz по BB1. Пусть сторона куба a , тогда $B_1(0;0;a)$, $N(a;\frac{a}{2};0)$, $C(0;a;0)$, $M(\frac{a}{2};0;0)$.
 $\vec{B_1N}(a;\frac{a}{2};-a)$, $\vec{CM}(\frac{a}{2};-a;0)$
 $\cos(\vec{B_1N}, \vec{CM}) = \frac{\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2}}{\sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4} + a^2} \sqrt{\frac{a^2}{4} + a^2}} = 0 \Rightarrow \angle(\vec{B_1N}, \vec{CM}) = 90^\circ \Rightarrow B_1N \perp CM$

б) Так плоскость $\alpha \parallel CM$ проведем $B_1 k \parallel CM$, тогда плоскость $\alpha = (B_1 N k)$.
 $B_1 C_1 \parallel AT \Rightarrow k(-\frac{a}{2}; a; a)$, пусть h — нормаль α .
 $k \parallel CM \Rightarrow \angle B_1 C_1 k = \angle MC = 90^\circ$
 $k \parallel CM \Rightarrow B_1 N \perp k \Rightarrow B_1 N \perp \alpha$
 $B_1 N = \sqrt{(a-0)^2 + (\frac{a}{2}-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4} + a^2} = \frac{3a}{2} = 6 \Rightarrow a = 4$
 $h(x; y; z)$, тогда $4x + 2y - 4z = 0$, пусть $x=1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{4}$
 $h(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4})$
 $\vec{CB_1}(0; -4; 4)$ $S(C; \alpha) = \frac{|\vec{CB_1} \cdot h|}{|h|} = \frac{|-4 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4}|}{\sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{25}{16}}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{41}{16}}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$
 Ответ: $\frac{4}{\sqrt{5}}$

Комментарий.

Верное доказательство утверждения пункта а) и обоснованно получен верный ответ в пункте б).

Оценка эксперта: 3 балла.


Пример 14.3.2

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точки M и N — середины рёбер AB и AD соответственно.

а) Докажите, что прямые $B_1 N$ и CM перпендикулярны.

б) Плоскость α проходит через точки N и B_1 параллельно прямой CM . Найдите расстояние от точки C до плоскости α , если $B_1 N = 6$.


Ответ: б) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$.



а) Дано.

проведем проекцию NB_1 на $(ABCD)$
 чтобы $NB_1 \perp BN$ (необходимо по
 теореме $ОЗ \perp$ чтобы $NB \perp MC$.

рассмотрим треугольник $ABCD$



пусть $MC \perp BN \perp O$

пусть $\angle BMC = \angle$, тогда $\triangle ABN \sim \triangle BMC$, $\angle ANB = \angle BMC$

тогда $\angle AMO = 180^\circ - \angle$.

$\angle AMO + \angle ANO = 180^\circ \Rightarrow$ вокруг четырехугольника $MONA$

можно еще сказать $\angle MAN + \angle MON = 90^\circ \Rightarrow \angle MON = 90^\circ$

$\Rightarrow MC \perp BN \Rightarrow$ по теореме $ОЗ \perp NB_1 \perp MC$.

б) $V_1 N = 6$

пусть ребро и сторона куба $= 2a$, тогда $NB^2 = a^2 + 4a^2 = 5a^2$, а $V_1 B_1 V_1^2 = 5a^2 + 4a^2 = 9a^2 \Rightarrow 36 = 9a^2 \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$

т.к. $(\alpha) \parallel CM$ и содержится $NB_1 \perp MC \Rightarrow (\alpha) \perp CM$, тогда расстояние от C до (α) = расстояние от точки O до NB_1 и пусть оно равняется h .

проведи XB - высоту в $\triangle NBV_1$, проведем $BO \perp$ касательной 2α , $NB''O$ и NB_1V_1 , они подобны по $\angle M C$, $\angle NB''O = \angle NB_1V_1$ и $\angle NOB'' = \angle NB_1V_1$

тогда $\frac{h}{XB} = \frac{NO}{NB}$

$$NB = \sqrt{20} = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$$

$$NO = NB - OB$$

$$OB = \frac{MB \cdot BC}{MC} = \frac{2 \cdot 4}{\sqrt{20}} = \frac{8}{\sqrt{20}}; NO = \sqrt{20} - \frac{8}{\sqrt{20}} = \frac{20 - 8}{\sqrt{20}} = \frac{12}{\sqrt{20}}$$

$$XB = \frac{\sqrt{20} \cdot NB \cdot V_1 B}{NB_1} = \frac{\sqrt{20} \cdot 4^2}{8\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{20}}{3}$$

тогда

$$\frac{3h}{2\sqrt{20}} = \frac{12}{\sqrt{20}} \cdot \frac{1}{8\sqrt{20}} = \frac{3}{5} \Rightarrow h = \frac{2\sqrt{20} \cdot 3}{5} = \frac{2 \cdot 2\sqrt{5}}{5} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

Ответ: $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

Комментарий.

Имеется верное доказательство утверждения пункта а.

При обоснованном решении пункта б получен неверный ответ не из-за арифметической ошибки – длина ребра куба найдена неверно.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 14.3.3

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точки M и N — середины рёбер AB и AD соответственно.

а) Докажите, что прямые $B_1 N$ и CM перпендикулярны.

б) Плоскость α проходит через точки N и B_1 параллельно прямой CM . Найдите расстояние от точки C до плоскости α , если $B_1 N = 6$.

Ответ: б) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

Дано:

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — куб; M — ср. AB ; N — ср. AD


а) Докажем: $B_1 N \perp CM$

б) $\exists N, B_1, \exists \alpha$; $\alpha \parallel CM$

$B_1 N = 6$

$\rho(C, \alpha) = ?$

а)



$$\begin{aligned} \vec{B_1 N} &= \vec{B_1 A_1} + \vec{A_1 A} + \vec{AN} = \vec{BA} + \vec{A_1 A} + \frac{\vec{AD}}{2} \\ \vec{CM} &= \vec{CB} + \vec{BM} = -\vec{AD} + \frac{\vec{BA}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{B_1 N} \cdot \vec{CM} &= \left(\vec{BA} + \vec{A_1 A} + \frac{\vec{AD}}{2} \right) \cdot \left(-\vec{AD} + \frac{\vec{BA}}{2} \right) = \\ &= -\vec{BA} \cdot \vec{AD} - \vec{A_1 A} \cdot \vec{AD} - \frac{\vec{AD}^2}{2} + \frac{\vec{BA}^2}{2} + \frac{\vec{A_1 A} \cdot \vec{BA}}{2}, \frac{\vec{BA} \cdot \vec{AD}}{4} \end{aligned}$$

$$\vec{BA} \cdot \vec{AD} = 0, \text{ т.к. } BA \perp AD$$

$$\vec{A_1 A} \cdot \vec{AD} = 0, \text{ т.к. } A_1 A \perp AD$$

$$\frac{-\vec{AD}^2 + \vec{BA}^2}{2} = 0, \text{ т.к. } AD = BA$$

$$\frac{\vec{A_1 A} \cdot \vec{BA}}{2} = 0, \text{ т.к. } A_1 A \perp BA$$

$$\frac{\vec{BA} \cdot \vec{AD}}{4} = 0, \text{ т.к. } BA \perp AD$$

$$\vec{B_1 N} \cdot \vec{CM} = 0$$



$$B_1 N \perp CM$$

$$\left(\begin{array}{l} \vec{B_1 N} \neq \vec{0} \\ \vec{CM} \neq \vec{0} \end{array} \right)$$

8) 1) Пусть a — сторона куба, $a > 0$

По т. Пифагора в $\triangle B_1BN$, $B_1N^2 = B_1B^2 + BN^2$


По т. Пифагора в $\triangle BAN$, $BN^2 = BA^2 + AN^2$

$$B_1N^2 = B_1B^2 + BA^2 + AN^2$$

$$36 = a^2 + a^2 + \frac{a^2}{4}$$

$$36 = \frac{9a^2}{4} \Rightarrow a = 4$$

2)



Введем ортогональную систему координат

$$C(4; 4; 0) \quad B_1(0; 4; 4) \quad N(2; 0; 0) \quad M(0; 2; 0)$$

$$\overrightarrow{MC}(x_C - x_M; y_C - y_M; z_C - z_M) \quad \overrightarrow{MC}(4; 2; 0)$$

т.е. $\perp \overline{MC}$, то м. $P(x_N + x_{MC}; y_N + y_{MC}; z_N + z_{MC}) \in \mathcal{L}$

$$P(6; 2; 0)$$

3) Найдем уравнение \mathcal{L} :

$$\begin{cases} ax_M + by_M + cz_M + d = 0 \\ ax_N + by_N + cz_N + d = 0 \\ ax_P + by_P + cz_P + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4b + 4c + d = 0 \\ 2a + d = 0 \\ 6a + 2b + d = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a = -\frac{d}{2} \\ -3d + 2b + d = 0 \\ 4b + 4c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{d}{2} \\ b = d \\ c = -\frac{5}{4}d \end{cases}$$

$$-\frac{x}{2} + y - \frac{5}{4}z + 1 = 0$$

$$2x - 4y + 5z - 4 = 0 \quad \text{— уравнение } \alpha.$$

$\vec{n}(2; -4; 5)$ — вектор нормален к α .

4) Пусть M, H — основание перпендикуляра, опущенного из M на α .

Тогда, $\vec{CH} = (x_H - x_C; y_H - y_C; z_H - z_C)$

$$\vec{CH} = (x_H - 4; y_H - 4; z_H)$$

П.к. $CH \perp \alpha$, $\vec{CH} = k\vec{n}$; $k \in \mathbb{R}$

$$x_H - 4 = 2k \rightarrow x_H = 4 + 2k$$

$$y_H - 4 = -4k \rightarrow y_H = 4 - 4k$$

$$z_H = 5k$$

П.к. $H \in \alpha$, $2x_H - 4y_H + 5z_H - 4 = 0$

$$2(4 + 2k) - 4(4 - 4k) + 5 \cdot 5k - 4 = 0$$

$$8 + 4k - 16 + 16k + 25k - 4 = 0$$

$$45k = 12$$

$$k = \frac{4}{15}$$

$$5) \rho(C; \alpha) = |\vec{CH}| = k |\vec{n}| = \frac{4}{15} \cdot \sqrt{4 + 16 + 25}$$

$$\rho(C; \alpha) = \frac{4}{15} \sqrt{45} = \frac{12\sqrt{5}}{15} = \frac{4}{5} \sqrt{5}$$

Ответ: ~~$\frac{12\sqrt{5}}{15}$~~ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$


Комментарий.

Имеется верное доказательство утверждения пункта а, при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки.

В предпоследней строке неверно вынесен множитель из-под корня.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 14.4.1



Решение.

или

$ABCA, B, C_1$ - прав. трехгр. приз.м.

$AA_1 = 3, AB = 6, AK = 2,$

$B, L = 2. A, M = MC_1 = 3.$

φ - плоскость $\parallel AC$ и

прямая содержащая $K, L.$

а) Доказ. $BM \perp \varphi$

б) $V = AKK, LL,$

$$BF = \sqrt{BC^2 - FC^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$BM = \sqrt{BF^2 + FM^2} = \sqrt{27 + 9} = \sqrt{36} = 6$$

$$BF = 3\sqrt{3}, \frac{BF}{BE} = \frac{KF}{KE}$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{BE} = \frac{4}{6} \Rightarrow 4BE = 18\sqrt{3}$$

$$BE = \frac{6}{4} \Rightarrow BE = 1.5$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{BE} = \frac{6}{4} \Rightarrow BE = 1.5$$

$$RG \parallel BF \Rightarrow RE = B, B. \quad ZG = FB - (FZ + GB) \quad FZ = GB = \sqrt{3} = \frac{1}{2} ZB$$

$$ZG = 3\sqrt{3} - (\sqrt{3} + \sqrt{3}) = \sqrt{3}. \quad RZ = \sqrt{RG^2 + ZG^2} = \sqrt{3 + 3} = \sqrt{6} = 2\sqrt{3}$$

~~$\triangle BFM \sim \triangle BOZ$ по отн. $\angle MBF$ и $\angle BOZ$ на BF и BO , $BF = BO$~~

$\triangle ZOB = \triangle MOR$ т.к. $\angle MOR = \angle ZOB$ (т.к. они вертикальные),

$ZB = MR = 2\sqrt{3}, \angle ZBM = \angle OMR$ т.к. это верш. углы. или углы при 2-х \parallel прям. B, M и F, B . следовательно $BO = OZ$

по теореме Пифагора. $ZB = \sqrt{BO^2 + ZO^2} = 2\sqrt{3} = \sqrt{3 + 3} \Rightarrow 2\sqrt{3} = \sqrt{6} \Rightarrow 2\sqrt{3}$

след $\triangle ZBO$ - прямоугольн.: след $BO \perp ZR$. след $BO \perp \varphi$ след $BM \perp \varphi$.

$V = \frac{1}{3} MO \cdot S_{KK, LL} = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3 \cdot ((\frac{KK_1 + LL_1}{2}) \cdot RZ) = 1 \cdot (\frac{2+4}{2}) \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$

$$= 1 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$$

Итого: $12\sqrt{3}$.

Ответ: $6\sqrt{3}$.


$\sqrt{217}$.

Комментарий.

Доказательство утверждения в пункте а не обосновано. С использованием утверждения пункта а верно получен ответ в пункте б.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 14.4.2



а) BM перпендикулярна любой прямой, параллельной AC и лежащей в плоскости (ABC) по теореме о 3-х перпендикулярах $\Rightarrow BM \perp PK$

Проведем QH ($QH \perp NL$ и $QH \perp PK$)

$QM \perp PK$; $QH \cap BM = O$ $\Delta OQM \sim \Delta B, BM$ ^{по Г. П. р. з. м.} $\Rightarrow \angle MOH = \angle MB, B = 90^\circ$. Т.к. $BM \perp PK$ и $BM \perp QH \Rightarrow BM \perp \gamma$. т.т.г.

б) (O) делит BM пополам из ΔBMB_1 по т. Пифагора $BM = 6 \Rightarrow BO = 3$ Из $\Delta B, LM$ по т. Пифагора $B, M = \sqrt{3}$ Из $\Delta B, MB_1$ по т. Пифагора $B, M = 2\sqrt{3}$ Из ΔBOM по т. Пифагора $OM = \sqrt{3}$. (O) делит QH пополам $\Rightarrow QH = 2OM = 2\sqrt{3}$

$$V_{MKPLN} = \frac{1}{3} \cdot MO \cdot S_{KPLN} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{2+4}{2} \cdot 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$$

($KPLN$ - р/б трапеция)

Ответ: $6\sqrt{3}$

Комментарий.

Утверждение в пункте а не доказано. В основе решения пункта б лежит необоснованное утверждение.


Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 14.4.3

- 3) $\triangle BDK \sim \triangle BSA$ по 2-м углам ($\angle B$ -общий, $\angle BDK = \angle BAS$ как соотв.) $k_1 = \frac{2}{3}$ 4) аналогично $\triangle B_1EL \sim \triangle B_1A_1C_1$ $k_2 = \frac{1}{3}$
 5) из 3) и 4) $B_1O_1 = \frac{1}{3} B_1M$ $BO = \frac{2}{3} BF$
~~6) $O_1M = B_1M - B_1O_1 = B_1M - \frac{1}{3} B_1M = \frac{2}{3} B_1M = \frac{2}{3} BF$~~
 7) $\triangle O_1HM = \triangle BOH$ по 2-м углам и стороне между ними ($\angle MO_1H = \angle HOB$ как нак. лем. $\angle O_1MB = \angle MBO$ как н. л. $O_1M = \frac{2}{3} B_1M = \frac{2}{3} BF = BO$)

Вычисления

- а) $B_1M = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ 2) $O_1M = \frac{2}{3} \cdot 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$
 3) $O_1T \perp BF$ в (BFM) 4) $TO = \frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{3} = \sqrt{3}$
 5) по т. Пиф. $BM = \sqrt{9+27} = 6 \Rightarrow HM = BH = \frac{1}{2} \cdot BM = 3$
 6) $O_1O = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3} \Rightarrow O_1H = HO = \sqrt{3}$
 7) по теор. обратной теореме Пифагора т.к.
 $O_1M^2 = O_1H^2 + HM^2 = 3 + 3 = 6$, то $\angle O_1HM = 90^\circ$ и $O_1H \perp MH$.
 8) $MP \perp AE$ (т.к. прямая AE перпендикулярна MP) и $MF \perp KD$ т.к. $KD \parallel AE$ *
 9) т.к. $EL \parallel KD$, то $EL \perp KD$ - очевидно
 10) XY - средняя линия $\triangle AED$. $EL \perp KD$ и $O_1H = HO \Rightarrow H \in XY$ в плоскости (EKD) 11) т.к. $XK \parallel MH$ и $XY \parallel KD$ см. на обороте.



2) $XY \perp KD$ $MF \perp KD$ и $MF \perp BF$, тогда $MF \perp (BKF)$
 ~~$MF \perp KD$~~ ~~$MF \perp BF$~~ ~~$MF \perp (BKF)$~~ ~~$MF \perp KD$~~ ~~$MF \perp BF$~~ ~~$MF \perp (BKF)$~~ ~~$MF \perp KD$~~ ~~$MF \perp BF$~~ ~~$MF \perp (BKF)$~~
 $MF \perp (BKF) \Rightarrow MF \perp KD$ по прямой перпен.
 пр. и пл. $KD \perp (BFM) \Rightarrow$ любая прямая в пл.
 (BFM) перпендикулярна $KD \Rightarrow BM \perp KD$ и
 $BM \perp XY$ т.е. $(KDL) = \gamma$

13) т.к. $BM \perp XY$ и $BM \perp O_1O$, то по прямой перпен.
 пр. и пл. $BM \perp (KDL)$ и $BM \perp \gamma$ т.е. γ .

д) 1) $S_{\triangle KOD} = \frac{1}{2} (EL + KD) \cdot O_1O$

2) $EL = A_1C_1 \cdot n_2 = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$

3) $KO = AC \cdot n_1 = 6 \cdot \frac{2}{3} = 4$

4) $S_{\triangle KOD} = \frac{1}{2} (2+4) \cdot 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

5) $V_{MSEKO} = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot h = 6\sqrt{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot MH = 6\sqrt{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 3 = 6\sqrt{3}$

Ответ: $6\sqrt{3}$ куб. ед.

Комментарий.

Доказательство утверждения в пункте а содержит неточности. В решении пункта б обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 14.5.1

а) $\angle BAD + \angle ADK = 90^\circ \Rightarrow \angle DKB = 90^\circ$.

плоск. $(DKP) \perp$ плоск. (ADK) } \Rightarrow
 $AK \perp DK$

$\Rightarrow AK \perp$ ~~плоск.~~ $пл. (DPK)$

$AK \subset$ $пл. (AKP) \Rightarrow$ $пл. (AKP) \perp$ $пл. (DPK)$

\Rightarrow плоскости $PAB \perp$ $пл.-ти$ PCD .

б) $AB = BC = CD = 4$.

$AB = CD \Rightarrow$ трапеция - равн. берзр. $\Rightarrow \angle KAD = \angle HDK \Rightarrow$
 $\Rightarrow \angle KBC = \angle BCK \Rightarrow BK = CK = \frac{CB}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$.

$AK \perp$ $пл. (DPK) \Rightarrow AK \perp PK$.

$пл. (AKP) \perp$ $пл. (ADK)$ } $\Rightarrow DK \perp$ $пл. (APK) \Rightarrow DK \perp PK$
 $AK \perp DK$

$AK \perp PK$ } $\Rightarrow PK \perp$ $пл. (ADK) \Rightarrow PK$ - высота.
 $DK \perp PK$

$V_{KBSP} = \frac{1}{3} \cdot PK \cdot \frac{1}{2} \cdot CK \cdot BK = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} =$
 $= 3 \cdot 4 = 12$.

Ответ: $V_{KBSP} = 12$.

Комментарий.


Утверждение в пункте а не доказано. В решении пункта б обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 14.5.2

Дано:
 $PABCD$ - ч.п. пирамиды
 $ABCD$ - трапеция ($AD \parallel BC$)
 $\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ$
 $AD \cap CD = K$

а) Доказать: $PAB \perp PCO$
 б) Найти: V_{KPCB} , если
 $AB = BC = CD = 4, PK = 9$



а) PK - высота пирамиды
 $\angle PKA = 180^\circ - (\angle PAB + \angle ADC) = 90^\circ$
 Заметим, что $\angle PKA$ - линейный

угол двугранного угла между плоскостями PAB и PCO ,
 в.к. $DK \perp PK$ и $AK \perp PK$.
 $\angle PKA = 90^\circ \Rightarrow PAB \perp PCO$, ч.т.д.

б) $AB = BC = CD = 4 \Rightarrow AD = 8$;

$$S_{ABCD} = \frac{4+8}{2} \sqrt{12} = 6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

$$S_{KCB} \approx \frac{BC \cdot AD}{2} \Rightarrow \triangle KCB \sim \triangle KDA \Rightarrow S_{KCB} = \frac{S_{AKD}}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_{KCB} = \frac{12\sqrt{3} + S_{KCB}}{4} \Rightarrow \frac{3S_{KCB}}{4} = 3\sqrt{3} \Rightarrow S_{KCB} = 4\sqrt{3}$$

$$V_{PKCB} = \frac{1}{3} PK \cdot S_{KCB} = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 4\sqrt{3} = 3 \cdot 4\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$


Ответ: $12\sqrt{3}$

Комментарий.

Утверждение в пункте а не доказано. В решении пункта б есть ошибочное утверждение, что привело к неверному ответу.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 14.5.3



Дано:
 $\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ$
 $(PAB) \perp (ADK)$
 $(PCD) \perp (ADK)$
 $ABCD$ - трапеция
 $K = AB \cap CD$

а) Док-ть: $PAB \perp PCD$

б) $V_{\text{квср}} = ?$, если:

$AB = BC = CD = 4$
 $PK = 9$

а) $BC \parallel AD$ (т.к. $ABCD$ - трапеция) $\Rightarrow \begin{cases} \angle KBC = \angle KAD \\ \angle KCB = \angle KDA \end{cases}$

(как внутр. одностор. и внутр. внешн. одностор. внешн. и внутр. при секущей AK и KD)

$\Rightarrow \angle KBC + \angle KCB = 90^\circ$ (по условию $\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ$)

$\Rightarrow \angle BKC = 90^\circ$ ($180^\circ - \angle KBC - \angle KCB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$)

Т.к. ~~$PAB \perp ADK$~~ $PAB \perp ADK$ и $PKD \perp ADK$, то

$\angle AKP = \angle DKP = 90^\circ \Rightarrow AK \perp PK$ и $AK \perp DK \Rightarrow$

$\Rightarrow PAK \perp PKD$ т.н.д.

б) $AB = CD \Rightarrow ABCD$ - равнобокая трапеция.

$\angle BAD + \angle CDA = 90^\circ$

$\angle BAD = \angle CDA$ (как углы при основании равнобок. трап.)

$\Rightarrow \angle KBC = \angle KCB = 45^\circ$

$\Rightarrow \triangle KBC$ - равнобедр. прямоугольный треугол.

Опустим из K перпендикуляр на BC ; $KS \perp BC$; $BS = SC$
 (медиана = высота в равнобедр. \triangle) $\Rightarrow BS = 2$

$KB = \frac{BS}{\cos 45^\circ} = \frac{2}{\cos 45^\circ} = 2\sqrt{2} = KC \Rightarrow S_{\triangle KBC} = \frac{1}{2} (2\sqrt{2})^2 = 4$

$V_{\text{квср}} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle KBC} \cdot KP = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 9 = 12$ Ответ: 12.


Комментарий.

Утверждение в пункте а не доказано. В решении пункта б обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 14.6.1

а)



$\Delta CNK \sim CDS$

(теорема Фалеса.)

$\Rightarrow NK \parallel DS$; ~~(BSA)~~ $DSE \in (DSA) \Rightarrow NK \parallel (DSA)$

Построим $NP \parallel DA$. Построим $PT \parallel SA$

$(SA \in (DSA) \Rightarrow (NPT) \parallel (SDA)$; ~~(NPT)~~ $= (\alpha)$

$\Rightarrow (\alpha) \parallel (SDA)$ Прямая $NP \parallel AD$ (по

построению.) $DA \parallel CB$ (т.к. $SABCD$ - правильная

пирамида.) $\Rightarrow NP \parallel CB$, т.к. $NP \in (\alpha) \Rightarrow$

$(\alpha) \parallel CB$ и т.д.

б) Построим $LO \perp CB$; $LO \in CB$. (O - центр пересечения диаг. осн пирамиды)

Построим $\perp LG$ к (α) LG - расстояние до (α) (теорема о 3-х перпендикулярах)

LB - перпендикуляр; OB - проекция; LO - касательная.


Комментарий.

Утверждение в пункте а доказано. В решении есть неточности в обозначении длин отрезков на первом чертеже и неоднозначность использования ссылки на теорему Фалеса. Решение пункта б не закончено.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 14.6.2

1) $SABCD$ - правильная четырехугольная пирамида \Rightarrow
 \Rightarrow 1. Основание - правильный четырехугольник, т.е. квадрат, 2. Высота пирамиды проецируется в центр основания, т.е. в точку O диагоналей квадрата, 3. Боковые стороны равны, 4. Боковые грани равные \triangle и треугольники (\triangle - равнобедренные)



2) $\triangle (ASC)$. $KV \parallel AS$

$P! \triangle ASC$ и $\triangle CKV$.

1 $\angle SCA$ - общий

2 $\angle KVC = \angle SAC$ как соответственные углы, образованные $KV \parallel AS$ и секущей AC

$\Rightarrow \triangle ASC \sim \triangle CKV$ по 1 критерию \Rightarrow

$$\Rightarrow \frac{CK}{CS} = \frac{CV}{AC} \quad (\text{из квадрата } AC = a\sqrt{2} = BD = 6\sqrt{2} \text{ как диагональ})$$

$$CK : CS = 5 : 1 \text{ по условию } \Rightarrow CK = \frac{7.5}{6}, SK = \frac{7}{6} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{7.5}{6 \cdot 7} = \frac{CV}{6\sqrt{2}} \Rightarrow CV = 5\sqrt{2} \Rightarrow OV = 2\sqrt{2} \quad (CO = 3\sqrt{2} = DO = OD = AO)$$

3) (KNV) $KVC (KNV)$ $\Rightarrow AS \parallel (KNV)$
 $KV \parallel AS$
 $AS \notin (KNV)$

(KNV) содержит τ . K и N и $\parallel AS \Rightarrow (KNV)$ исходная плоскость κ

4) В грани $ABCD$: $NH \perp OC$ и $NM \perp OD$

$P!$ кр/пл $\triangle CHN$: $\angle HCN = 45^\circ$ тк AC диагональ квадрата:

$$\Rightarrow \cos \angle HCN = \frac{HC}{NC} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (NC = 5, ND = 1 \text{ тк } \angle N : NC = 1 : 5) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow HC = \frac{5\sqrt{2}}{2} \Rightarrow OH = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$P!$ кр/пл $\triangle NMD$: $\angle NDM = 45^\circ$ (BD - диагональ квадрата)

$$\Rightarrow \cos \angle NDM = \frac{MD}{DN} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow MD = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow OM = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

5) В $\triangle (ASC)$ $KP \parallel SO$

$SO \perp (ABC)$, $KP \parallel SO \Rightarrow KP \perp (ABC)$; $PC \in (ABC)$; $KP \perp (ABC) \Rightarrow KP \perp PC$:

3. Критерии проверки и оценка решений задания 15

Задание № 15 — это неравенство: дробно-рациональное, логарифмическое или показательное.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением/ включением граничных точек, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

В первом случае выставления 1 балла допускаются только ошибки в строгости неравенства: «<» вместо «≤» или наоборот. **Если в ответ включено значение переменной, при котором одна из частей неравенства не имеет смысла, то следует выставлять оценку «0 баллов».**

Задача 15 (демонстрационный вариант ЕГЭ 2025 г.)

Решите неравенство $\frac{\log_2(2-x) - \log_2(x+1)}{\log_2^2 x^2 + \log_2 x^4 + 1} \geq 0$.

Решение.

Запишем исходное неравенство в виде:

$$\frac{\log_2(2-x) - \log_2(x+1)}{\log_2^2 x^2 + 2\log_2 x^2 + 1} \geq 0; \frac{\log_2(2-x) - \log_2(x+1)}{(\log_2 x^2 + 1)^2} \geq 0.$$

Значение знаменателя $(\log_2 x^2 + 1)^2$ не определено при $x = 0$, равно нулю при

$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ и при $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ и положительно при других значениях x .

При $x \neq -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x \neq 0$ и $x \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$ неравенство принимает вид:

$$\log_2(2-x) - \log_2(x+1) \geq 0; \log_2(x+1) \leq \log_2(2-x); 0 < x+1 \leq 2-x,$$

откуда $-1 < x \leq \frac{1}{2}$. Учитывая условия $x \neq -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x \neq 0$ и $x \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$, получаем:

$$-1 < x < -\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2} < x < 0; 0 < x \leq \frac{1}{2}.$$

Ответ: $\left(-1; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right); \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0\right); \left(0; \frac{1}{2}\right]$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки $\frac{1}{2}$, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 15.1

Решите неравенство $\frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}$.

Решение.

Пусть $t = 3^x$, тогда неравенство примет вид:

$$\frac{t+9}{t-9} + \frac{t-9}{t+9} \geq \frac{12t+144}{t^2-81}; \frac{t^2+18t+81}{(t-9)(t+9)} + \frac{t^2-18t+81}{(t-9)(t+9)} - \frac{12t+144}{(t-9)(t+9)} \geq 0;$$
$$\frac{2t^2-12t+18}{(t-9)(t+9)} \geq 0; \frac{2(t-3)^2}{(t-9)(t+9)} \geq 0,$$

откуда $t < -9$; $t = 3$; $t > 9$.

При $t < -9$ получим: $3^x < -9$, решений нет.

При $t = 3$ получим: $3^x = 3$, откуда $x = 1$.

При $t > 9$ получим: $3^x > 9$, откуда $x > 2$.

Решение исходного неравенства:

$$x = 1; x > 2.$$

Ответ: $1; (2; +\infty)$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки 1, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 15.2

Решите неравенство $\log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5$.

Решение.

Запишем исходное неравенство в виде:

$$\log_8(x-1)^3 \geq \log_2(x^2 - 1) - 5; \log_2(x-1) \geq \log_2(x-1) + \log_2(x+1) - 5.$$

Левая часть неравенства определена при $x > 1$.

При $x > 1$ неравенство принимает вид:

$$\log_2(x+1) \leq 5; 0 < x+1 \leq 32,$$

откуда $-1 < x \leq 31$. Учитывая ограничение $x > 1$, получаем: $1 < x \leq 31$.

Ответ: $(1; 31]$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки 31, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 15.3

Решите неравенство $\frac{4}{3^x - 27} \geq \frac{1}{3^x - 9}$.

Решение.

Пусть $t = 3^x$, тогда неравенство примет вид:

$$\frac{4}{t-27} \geq \frac{1}{t-9}; \frac{3t-9}{(t-9)(t-27)} \geq 0; \frac{3(t-3)}{(t-9)(t-27)} \geq 0,$$

откуда $3 \leq t < 9; t > 27$.

При $3 \leq t < 9$ получим: $3 \leq 3^x < 9$, откуда $1 \leq x < 2$.

При $t > 27$ получим: $3^x > 27$, откуда $x > 3$.

Решение исходного неравенства: $1 \leq x < 2; x > 3$.

Ответ: $[1; 2); (3; +\infty)$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки 1, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 15.4

Решите неравенство $2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$.

Решение.

Пусть $t = 2^x$, тогда неравенство примет вид:

$$t - 6 - \frac{9t - 37}{t^2 - 7t + 12} \leq \frac{1}{t - 4}; \quad t - 6 - \frac{9t - 37}{(t - 3)(t - 4)} - \frac{t - 3}{(t - 3)(t - 4)} \leq 0;$$

$$t - 6 - \frac{10}{t - 3} \leq 0, \text{ где } t \neq 4; \quad \frac{(t - 1)(t - 8)}{t - 3} \leq 0, \text{ где } t \neq 4,$$

откуда $t \leq 1$; $3 < t < 4$; $4 < t \leq 8$.

При $t \leq 1$ получим: $2^x \leq 1$, откуда $x \leq 0$.

При $3 < t < 4$ получим: $3 < 2^x < 4$, откуда $\log_2 3 < x < 2$.

При $4 < t \leq 8$ получим: $4 < 2^x \leq 8$, откуда $2 < x \leq 3$.

Решение исходного неравенства:

$$x \leq 0; \log_2 3 < x < 2; 2 < x \leq 3.$$

Ответ: $(-\infty; 0]$; $(\log_2 3; 2)$; $(2; 3]$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек 0 и/или 3, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 15.5

Решите неравенство $\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$.

Решение.

Пусть $t = \log_4 x$, тогда неравенство примет вид:

$$\frac{t+3}{t-3} + \frac{t-3}{t+3} \geq \frac{4t+16}{t^2-9}; \frac{t^2+6t+9}{(t-3)(t+3)} + \frac{t^2-6t+9}{(t-3)(t+3)} - \frac{4t+16}{(t-3)(t+3)} \geq 0;$$

$$\frac{2t^2-4t+2}{(t-3)(t+3)} \geq 0; \frac{2(t-1)^2}{(t-3)(t+3)} \geq 0, \text{ откуда } t < -3; t = 1; t > 3.$$

При $t < -3$ получим: $\log_4 x < -3$, откуда $0 < x < \frac{1}{64}$.

При $t = 1$ получим: $\log_4 x = 1$, откуда $x = 4$.

При $t > 3$ получим: $\log_4 x > 3$, откуда $x > 64$.

Решение исходного неравенства: $0 < x < \frac{1}{64}$; $x = 4$; $x > 64$.

Ответ: $\left(0; \frac{1}{64}\right)$; 4; $(64; +\infty)$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки 4, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 15.6

Решите неравенство $\log_3(5-5x) \geq \log_3(x^2-3x+2) - \log_3(x+4)$.

Решение.

Запишем исходное неравенство в виде:

$$\log_3(5(1-x)) \geq \log_3((2-x)(1-x)) - \log_3(x+4);$$

$$\log_3 5 + \log_3(1-x) \geq \log_3(2-x) + \log_3(1-x) - \log_3(x+4).$$

Неравенство определено при $-4 < x < 1$, поэтому при $-4 < x < 1$ неравенство принимает вид:

$$5 \geq \frac{2-x}{x+4}; \frac{6x+18}{x+4} \geq 0,$$

откуда $x < -4$; $x \geq -3$. Учитывая ограничение $-4 < x < 1$, получаем: $-3 \leq x < 1$.

Ответ: $[-3; 1)$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки -3 , ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Примеры оценивания решений задания 15

Пример 15.1.1

Решите неравенство $\frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}$.

Ответ: $1; (2; +\infty)$.

$$\begin{aligned} \text{N. 15} \quad \frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} &\geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81} \quad ; \quad 3^{x+1} = 3^x \cdot 3 \\ \frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} &\geq \frac{4 \cdot 3^x \cdot 3 + 144}{(3^x - 9)(3^x + 9)} \end{aligned}$$

Обозначу $t = 3^x$; $3 < 9$, это ~~то~~ ~~то~~ 3^x всегда $> 0 \Rightarrow t > 0$ тогда
ур. имеет вид

$$\frac{t+9}{t-9} + \frac{t-9}{t+9} \geq \frac{12t+144}{(t-9)(t+9)}$$

$$\frac{t+9}{t-9} + \frac{t-9}{t+9} - \frac{12t+144}{(t-9)(t+9)} \geq 0. \text{ Приведу к общему знаменателю:}$$

$$\frac{(t+9)(t+9) + (t-9)(t-9) - 12t - 144}{(t-9)(t+9)} \geq 0. \text{ Раскрою скобки в числителе:}$$

$$\frac{t^2 + 18t + 81 + t^2 - 18t + 81 - 12t - 144}{(t-9)(t+9)} \geq 0$$

$$\frac{2t^2 - 12t + 18}{(t-9)(t+9)} \geq 0 \quad | :2, \quad 2 > 0 \Rightarrow \text{знак нер. не меняется}$$

$$\frac{t^2 - 6t + 9}{(t-9)(t+9)} \geq 0 \quad 3 < 9, \text{ это } t^2 - 6t + 9 = (t-3)^2$$

$$\frac{(t-3)^2}{(t-9)(t+9)} \geq 0. \text{ Для решения нер. воспользуюсь}$$

методом интервалов, т.к. слева стоит непрерывная функция.


для это нужно найти, когда числитель и знаменатель обращаются в

$$0: (t-3)^2 = 0 \rightarrow t=3; (t-9)(t+9) = 0 \rightarrow \begin{cases} t=9 \\ t=-9 \end{cases} \text{ нанесу эти корни}$$

на числовую ось, причем ~~то~~ только 9 и -9 будут выколоти, т.к.

знаменатель не может равняться 0 . также не забуду, что $t > 0$

№15 Продолжение



для того чтобы иметь знак
на каждом из интервалов представлю

числа в этих интервалах

интервалов 4: I $(-\infty; -9)$; II $(-9; 3)$; III: ~~$(3; 9)$~~ ; IV: $(9; +\infty)$

I: $-10 \in (-\infty, -9) \rightarrow$

$$\frac{(-10-3)^2}{(-10-9)(-10+9)} = \frac{13^2}{(-19)(-1)} = \frac{13^2}{19} > 0 \rightarrow \text{на I знак } +$$

. 3-24, 250 ^{3 числа} _{абсолютно} ^{больше} ₀

II $1 \in (-9; 3)$

$$\frac{(1-3)^2}{(1-9)(1+9)} = \frac{2^2}{-8 \cdot 10} < 0 \rightarrow \text{на II знак } -$$

III $4 \in (3; 9) \rightarrow$

$$\frac{(4-3)^2}{(4-9)(4+9)} = \frac{1^2}{-5 \cdot 13} < 0 \rightarrow \text{на III знак } -$$

IV $10 \in (9; +\infty) \rightarrow$

$$\frac{(10-3)^2}{(10-9)(10+9)} = \frac{7^2}{1 \cdot 19} > 0 \rightarrow \text{на IV знак } +$$

Т.к. нужно, чтобы $\frac{(t-3)^2}{(t-9)(t+9)} \geq 0$, то подходят I и IV интервалы

$t \in (-\infty; -9) \cup \{3\} \cup (9; +\infty)$, но т.к. $t > 0 \Rightarrow$

$t \in \{3\} \cup (9; +\infty)$ всего много, но $t=3^x \Rightarrow 3^x \in \{3\} \cup (9; +\infty) \Rightarrow$
 $x \in \{1\} \cup (2; +\infty)$

Ответ: $\{1\} \cup (2; +\infty)$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 15.1.2

Решите неравенство $\frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}$.

Ответ: 1; (2; +∞).

№ 15

$$\frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81} \Leftrightarrow \frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{12 \cdot 3^x + 144}{3^{2x} - 81}$$

Введём новую переменную $t = 3^x$ ($t > 0$):

$$\frac{t + 9}{t - 9} + \frac{t - 9}{t + 9} \geq \frac{12t + 144}{t^2 - 81} \quad \frac{t^2 + 18t + 81 + t^2 - 18t + 81}{t^2 - 81} \geq \frac{12t + 144}{t^2 - 81}$$

$$\frac{2t^2 + 162 - 12t - 144}{t^2 - 81} \geq 0 \quad \frac{2t^2 - 12t + 18}{t^2 - 81} \geq 0 \quad \text{или} \quad \frac{t^2 - 6t + 9}{t^2 - 81} \geq 0 \quad \frac{(t-3)^2}{t^2 - 81} \geq 0$$

$$\frac{(t-3)^2}{t^2 - 81} \geq 0 \quad \frac{(t-3)^2}{(t-9)(t+9)} \geq 0 \quad t = 3, t \neq 9$$

$3^x > 9 \Leftrightarrow x > 2$ **Ответ:** (2; +∞).

Комментарий.

Неверно решено дробно-рациональное неравенство относительно t - «потеряно» решение неравенства $t = 3$, что и привело к потере решения неравенства $x = 1$.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 15.1.3

Решите неравенство $\frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}$.

Ответ: 1; (2; +∞).

$$\frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}$$

$$\frac{(3^x + 9)^2 + (3^x - 9)^2}{3^{2x} - 81} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}$$

$$2 \cdot 3^{2x} + 2 \cdot 3^x \cdot 9 + 81 + 3^{2x} - 2 \cdot 3^x \cdot 9 + 81 \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}$$

$$\frac{2 \cdot 3^{2x} + 2 \cdot 27 - 4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81} \geq 0$$

$$\frac{2 \cdot 3^{2x} - 4 \cdot 3^{x+1} + 18}{9^x - 9^2} \geq 0$$

$$\frac{2(3^{2x} - 2 \cdot 3^x \cdot 3 + 9)}{9^x - 9^2} \geq 0$$

$$\frac{2(3^x - 3)^2}{9^x - 9^2} \geq 0$$

$$\begin{cases} 9^x - 9^2 > 0 \\ 3^x - 3 = 0 \\ 9^x - 9^2 \neq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} (9-1)(x-2) > 0 \\ (3-1)(x-3) > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} (9-1)(x-2) > 0 \\ 3^x = 3 \\ 9^x \neq 9^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 2 \\ x = 3 \\ x \neq 2 \end{cases} \quad x \in \{1\} \cup (2; +\infty)$$

Ответ: $x \in \{1\} \cup (2; +\infty)$

Комментарий.

В работе допущена ошибка в применении формул сокращенного умножения – квадрата суммы и квадрата разности.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 15.1.4

Решите неравенство $\frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}$.

Ответ: 1; (2; +∞).

$$\sqrt{15.} \quad \frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}$$


□ $t = 3^x$, тогда $t^2 = 9^x$, при этом $t > 0$:

$$\frac{t+9}{t-9} + \frac{t-9}{t+9} \geq \frac{12t+144}{t^2-81}$$

$$\frac{t^2+81+18t+t^2-18t+81-12t+144}{(t-9)(t+9)} \geq 0$$

$$\frac{2t^2-12t+162-144}{(t-9)(t+9)} \geq 0 \quad | :2$$

$$\frac{t^2-6t+9}{(t-9)(t+9)} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{(t-3)^2}{(t-9)(t+9)} \geq 0$$



обр. замена: $\begin{cases} 3^x = 3 \\ 3^x > 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x > 2 \end{cases} \Rightarrow x \in \{1\} \cup (2; +\infty)$.

Ответ: $x \in \{1\} \cup (2; +\infty)$.

Комментарий.

В работе допущена ошибка при решении дробно-рационального неравенства относительно t : на координатной прямой в точке $t=3$ (в «петле» стоит знак «+» – очевидно, попытка объяснить чередование знаков), то есть участник экзамена утверждает,

что дробное выражение $\frac{(t-3)^2}{(t-9)(t+9)}$ принимает положительное значение.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 15.2.1

Решите неравенство $\log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5$.

Ответ: $(1; 31]$.

$$\text{р-15. } \log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5$$

$$\log_{2^3} (x-1)^3 \geq \log_2(x^2-1) - \log_2 32$$

$$\frac{1}{3} \log_2 (x-1)^3 \geq \log_2 \frac{x^2-1}{32}$$

$$\log_2 (x-1) \geq \log_2 \frac{(x-1)(x+1)}{32}$$

$$\begin{cases} x-1 \geq \frac{(x-1)(x+1)}{32} & (1) \\ x-1 > 0 & (2) \\ \frac{(x-1)(x+1)}{32} > 0 & (3) \end{cases}$$

$$(1) \quad x-1 \geq \frac{(x-1)(x+1)}{32} \quad | \cdot 32$$


$$32x - 32 \geq (x-1)(x+1)$$

$$32(x-1) - (x-1)(x+1) \geq 0$$

$$(x-1)(32 - (x+1)) \geq 0$$

$$(x-1)(32-x-1) \geq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$(x-1)(x-31) \leq 0$$




$$1 \leq x \leq 31$$

$$\text{Ответ: } [1; 31].$$


$$(2) \quad \begin{cases} x-1 > 0 \\ x > 1 \end{cases}$$

$$(3) \quad \frac{(x-1)(x+1)}{32} > 0$$



$$\begin{cases} x < -1 \\ x > 1 \end{cases}$$

Найдём пересечение:



$$x \in [1; 31].$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 15.2.2

Решите неравенство $\log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5$.

Ответ: $(1; 31]$.

№15

$$\log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5$$

1) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$

Заметим, что $x=1$ — корень уравнения

$$-\frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^2 - 2x + 1} \cdot \frac{x-1}{x^2 - 2x + 1} \quad (x-1)(x^2 - 2x + 1) = 0$$

$$\frac{-2x^2 + 2x}{-x - 1} \quad (x-1)(x-1)^2 = 0$$

$$\frac{x-1}{-x-1} \quad (x-1)^3 = 0$$

2) $\frac{1}{3} \log_2(x-1)^3 - \log_2(x^2 - 1) \geq -5$

$$\log_2(x-1) - \log_2(x^2 - 1) \geq -5$$

① $\log_2\left(\frac{x-1}{x^2-1}\right) \geq \log_2\left(\frac{1}{32}\right)$

② $(x-1) > 0$

③ $x^2 - 1 > 0$

① $\log_2\left(\frac{x-1}{x^2-1}\right) \geq \log_2\left(\frac{1}{32}\right)$

② $(x-1)^3 > 0$

③ $x^2 - 1 > 0$

$$\frac{x-1}{x^2-1} \geq \frac{1}{32} \quad | \cdot 32$$

$$x-1 > 0$$

$$(x-1)(x+1) > 0$$

$$\frac{32x-32}{x^2-1} - 1 \geq 0$$

$$x > 1$$

$$\begin{cases} x < -1 \\ x > 1 \end{cases}$$

$$\frac{32x-32-x^2+1}{x^2-1} \geq 0$$

$$\frac{-x^2+32x-31}{x^2-1} \geq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x^2-32x+31}{(x-1)(x+1)} \leq 0$$

$$\frac{(x-1)(x-31)}{(x-1)(x+1)} \leq 0$$



Ответ: $(1; 31]$

$$\begin{cases} -1 < x < 1 \\ 1 < x \leq 31 \\ x > 1 \\ x < -1 \\ x > 1 \end{cases}$$



$(1; 31]$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 15.2.3

Решите неравенство $\log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5$.

Ответ: $(1; 31]$.

N15

$$\log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5$$

$$\log_2(x-1)^3 - \log_2(x^2-1) + 5 \geq 0$$

$$\frac{1}{3}\log_2(x-1)^3 - \log_2(x^2-1) + 5 \geq 0$$

$$\log_2 \sqrt[3]{(x-1)^3} - \log_2(x^2-1) + \log_2 32 \geq 0$$

$$\log_2(x-1) - \log_2(x^2-1) + \log_2 32 \geq 0$$

$$\log_2 \frac{(x-1) \cdot 32}{(x^2-1)^3} \geq 0$$

используем метод рационализации:

$$(2-1) \left(\frac{(x-1) \cdot 32}{x^2-1} - 1 \right) \geq 0$$

$$1 \cdot \frac{32x - 32 - x^2 + 1}{x^2-1} \geq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x^2 - 32x + 31}{(x-1)(x+1)} \leq 0$$

решим отдельно числитель:

$$x^2 - 32x + 31 = 0$$

по т. Виета:

$$\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = 31 \\ x_1 + x_2 = 32 \end{cases}$$

отсюда: $x_1 = 31$
 $x_2 = 1$

$$\frac{(x-31)(x-1)}{(x-1)(x+1)} \leq 0$$

с учетом (*)

$$x \in (1; 31]$$

Ответ: $x \in (1; 31]$

$$\begin{cases} * \textcircled{1} x^2 - 1 > 0 \\ \textcircled{2} x^3 - 3x^2 + 3x - 1 > 0 \end{cases}$$

① $x^2 - 1 > 0$
 $(x-1)(x+1) > 0$

$x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$

② $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 > 0$

$$\begin{array}{r|l} -x^3 - 3x^2 + 3x - 1 & \frac{x-1}{x^2-2x+1} \\ \hline x^3 - x^2 & \\ \hline -2x^2 + 3x & \\ \hline -2x^2 + 2x & \\ \hline -x - 1 & \\ \hline x - 1 & 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^2-2x+1) > 0$$

$$(x-1)(x-1)^2 > 0$$

$$(x-1)^3 > 0$$

$x \in (1; +\infty)$

Отсюда; $x \in (1; +\infty)$
объединяя оба неравенства получаем:

Комментарий.

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки 31.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 15.2.4

Решите неравенство $\log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5$.

Ответ: $(1; 31]$.

$$\begin{aligned} & \text{N15.} \\ & \log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5 \\ & \log_{2^3}(x-1)^3 \geq \log_2(x^2 - 1) - 5 \\ & \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \log_2(x-1) - \log_2(x^2 - 1) \geq -5 \end{aligned}$$

$$\log_2\left(\frac{(x-1)}{(x-1)(x+1)}\right) \geq -5$$

$$\log_2\left(\frac{1}{x+1}\right) \geq -5$$

$$2^{-5} = \frac{1}{x+1}$$


$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{32}$$

$$x+1 = 32$$


$$x = 31$$

ОДЗ:

$$\begin{cases} x^2 - 1 > 0 \\ (x-1)^3 > 0 \end{cases} \begin{cases} x > 1 \\ x < -1 \Rightarrow \\ x > 1. \end{cases}$$



Объединим в ОДЗ:



Ответ: $x \in (1; 31] \cup [31; +\infty)$

Комментарий.

Неверно решено неравенство $\log_2\left(\frac{1}{x+1}\right) \geq -5$. Нарушена логика решения.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 15.3.1

Решите неравенство $\frac{4}{3^x - 27} \geq \frac{1}{3^x - 9}$.

Ответ: $[1; 2); (3; +\infty)$.


$$15. \frac{4}{3^x - 27} \geq \frac{1}{3^x - 9}$$

$$3^x = t \quad (\text{замена})$$

$$\frac{4}{t-27} - \frac{1}{t-9} \geq 0$$

$$\frac{4t - 36 - (t - 27)}{(t-27)(t-9)} \geq 0$$

$$\frac{3(t-3)}{(t-27)(t-9)} \geq 0$$



$$t \in [3; 9) \cup (27; +\infty)$$

$$3^x \in [3; 9) \cup (27; +\infty)$$

$$x \in [1; 2) \cup (3; +\infty)$$

Ответ: $x \in [1; 2) \cup (3; +\infty)$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 15.3.2

Решите неравенство $\frac{4}{3^x - 27} \geq \frac{1}{3^x - 9}$.

Ответ: $[1; 2); (3; +\infty)$.

NIS

$$\frac{4}{3^x - 27} \geq \frac{1}{3^x - 9}$$
$$\frac{4}{3^x - 27} - \frac{1}{3^x - 9} \geq 0$$
$$\frac{4(3^x - 9) - (3^x - 27)}{(3^x - 27)(3^x - 9)} \geq 0$$
$$\frac{3 - 3^x - 9}{(3^x - 27)(3^x - 9)} \geq 0$$
$$\frac{3^x - 3^1}{(3^x - 3^3)(3^x - 3^2)} \geq 0$$

Применим метод рационализации. Так как $3 > 1$, то

$$\frac{(x-1)}{(x-3)(x-2)} \geq 0$$
$$\begin{cases} 1 \leq x < 2 \\ 3 < x \end{cases}$$

Ответ: $x \in [1; 2) \cup (3; +\infty)$

Additional constraints from the denominator:
 $\begin{cases} 3^x - 27 \neq 0 \\ 3^x - 9 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3^x \neq 27 \\ 3^x \neq 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3^x \neq 3^3 \\ 3^x \neq 3^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq 3 \\ x \neq 2 \end{cases}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 15.3.4

Решите неравенство $\frac{4}{3^x - 27} \geq \frac{1}{3^x - 9}$.

Ответ: $[1; 2); (3; +\infty)$.

$$\frac{4}{3^x - 27} \geq \frac{1}{3^x - 9}$$

Неравенство определено, если $x \neq 3$ и $x \neq 2$


Пусть $3^x = t$, запишем:

$$\frac{4}{t - 27} \geq \frac{1}{t - 9}$$

$$\frac{4}{t - 27} - \frac{1}{t - 9} \geq 0$$

$$\frac{4t - 36 - t + 27}{(t - 27)(t - 9)} \geq 0$$

$$\frac{3t - 9}{(t - 27)(t - 9)} \geq 0$$



$$3 \leq t \leq 9 \qquad t \geq 27$$

$$3 \leq 3^x \leq 9 \qquad 3^x \geq 27$$

$$1 \leq x \leq 2 \qquad x \geq 3$$

Так как $x \neq 3$ и $x \neq 2$, получим: $x \in [1; 2) \cup (3; +\infty)$.

Ответ: $[1; 2) \cup (3; +\infty)$.

Комментарий.

Неверно решено рациональное неравенство относительно новой переменной.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 15.4.1

Решите неравенство $2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$.

Ответ: $(-\infty; 0]; (\log_2 3; 2); (2; 3]$.

$$2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4};$$

$$2^x = t;$$

$$t - 6 - \frac{9t - 37}{t^2 - 7t + 12} \leq \frac{1}{t - 4};$$

$$t - 6 - \frac{9t - 37}{(t-3)(t-4)} \leq \frac{1}{t-4};$$

$$t - 6 - \frac{9t - 37 + t - 3}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$t - 6 - \frac{10(t-4)}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$\frac{(t-4)(t-6)(t-3) - 10}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$\frac{(t-4)(t^2 - 9t + 8)}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$\frac{(t-4)(t-1)(t-8)}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

ОДЗ: $x \neq 2$
 $x \neq \log_2 3$
 $4^x - 7 \cdot 2^x + 12 \neq 0$
 $(2^x - 3)(2^x - 4) \neq 0$
 $t > 0;$



$$0 < 2^x < 1 \quad 3 < 2^x < 4 \quad 4 < 2^x \leq 8$$

$$\underline{x \leq 0}; \quad \begin{cases} x > \log_2 3; \\ x < 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2; \\ x \leq 3; \end{cases}$$

Ответ: $(-\infty; 0] \cup (\log_2 3; 2) \cup (2; 3]$.

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 15.4.2

Решите неравенство $2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$.

Ответ: $(-\infty; 0]; (\log_2 3; 2); (2; 3]$.

$$2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$$

Положим $2^x = t$ Тогда

$$t - 6 - \frac{9t - 37}{(t-4)(t-3)} \leq \frac{1}{t-4}$$

ОДЗ $\begin{cases} t \neq 4 \\ t \neq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2^x \neq 4 \\ 2^x \neq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq 2 \\ x \neq \log_2 3 \end{cases}$

$$\frac{t^3 - 13t^2 + 54t - 72 - 9t + 37 - t + 3}{(t-4)(t-3)} \leq 0$$

$$\frac{t^3 - 13t^2 + 44t - 32}{(t-4)(t-3)} \leq 0$$

$$\frac{(t-4)(t^2 - 9t + 8)}{(t-4)(t-3)} \leq 0$$

$$\frac{(t-1)(t-8)}{t-3} \leq 0$$

Вернемся

$$\frac{(2^x - 1)(2^x - 8)}{2^x - 3} \leq 0$$

~~Ответ: $(-\infty; 0]; (\log_2 3; 2); (2; 3]$~~

Ответ: $(-\infty; 0] \cup (\log_2 3; 2) \cup (2; 3]$

Комментарий.

В решении содержится запись «ОДЗ», которая может трактоваться по-разному. Получен неверный ответ, но он отличается от верного только исключением точки 3.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 15.4.3

Решите неравенство $2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$.

Ответ: $(-\infty; 0]; (\log_2 3; 2); (2; 3]$.

$$2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$$

Пусть $2^x = t$, то $t - 6 - \frac{9t - 37}{t^2 - 7t + 12} - \frac{1}{t - 4} \leq 0$

$$\frac{(t-3)(t-4)}{t^2 - 7t + 12} \cdot \frac{9t - 37}{(t-3)(t-4)} - \frac{1}{t-4} \leq 0$$

$$\frac{(t^2 - 7t + 12)(t-6) - (9t - 37) - (t-3)}{(t-3)(t-4)} \leq 0$$

$$\frac{(t^3 - 7t^2 + 12t - 6t^2 + 92t - 72) - (9t - 37) - (t - 3)}{(t-3)(t-4)} \leq 0$$

$$\frac{t^3 - 13t^2 + 54t - 72 - 9t + 37 - t + 3}{(t-3)(t-4)} \leq 0$$

$$\frac{t^3 - 13t^2 + 44t - 32}{(t-3)(t-4)} \leq 0$$

Схема Горнера: Пусть $t_1 = 1$, то

$$1 - 13 + 44 - 32 = 0 \text{ - находим}$$

	1	-13	44	-32
1	1	-12	32	0

$$(t-1)(t^2 - 12t + 32) \leq 0$$

$$t^2 - 12t + 32 = 0$$

$$D = 144 - 4 \cdot 32 = 144 - 128 = 16$$

$$t_2 = \frac{12-4}{2} = 4$$

$$t_3 = \frac{12+4}{2} = 8$$

$$t_2 = \frac{12-4}{2} = 4$$

$$t_1 = 1$$

$$t_1 = 4$$

$$t_3 = 8$$

$$2^x = 1$$

$$2^x = 4$$


$$2^x = 8$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = 3$$

$$x \in (-\infty; 0] \cup [2; 3]$$



$$\text{Ответ: } (-\infty; 0] \cup [2; 3]$$

Комментарий.

В решении неравенства допущена ошибка – неравносильный переход.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 15.5.1

Решите неравенство $\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$.

Ответ: $(0; \frac{1}{64}); 4; (64; +\infty)$.

$$\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$$

$$D \begin{cases} x > 0 \\ \log_4 x - 3 \neq 0 \\ \log_4(64x) \neq 0 \\ \log_4^2 x - 9 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_4 x \neq 3 \\ 64x \neq 1 \\ (\log_4 x - 3)(\log_4 x + 3) \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 64 \\ x \neq \frac{1}{64} \\ \log_4 x \neq -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 64 \\ x \neq \frac{1}{64} \end{cases}$$

$$x \in (0; \frac{1}{64}) \cup (\frac{1}{64}; 64) \cup (64; +\infty)$$

$$\frac{\log_4 x + 3}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4 x + 3} \geq \frac{4 \log_4 x + 16}{(\log_4 x - 3)(\log_4 x + 3)}$$


$$t = \log_4 x \quad t \neq \pm 3$$

$$\frac{t+3}{t-3} + \frac{t-3}{t+3} \geq \frac{4t+16}{(t-3)(t+3)}$$

$$\frac{(t+3)^2 + (t-3)^2 - 4t - 16}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{t^2 + 6t + 9 + t^2 - 6t + 9 - 4t - 16}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{2t^2 - 4t + 2}{(t-3)(t+3)} \geq 0 \quad \frac{t^2 - 2t + 1}{(t-3)(t+3)} \geq 0 \quad \frac{(t-1)^2}{(t+3)(t-3)} \geq 0$$



$$t \in (-\infty; -3) \cup \{1\} \cup (3; +\infty) \Rightarrow \log_4 x \in (-\infty; -3) \cup \{1\} \cup (3; +\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x \in (0; \frac{1}{64}) \cup \{4\} \cup (64; +\infty)$$

$$\text{Ответ: } x \in (0; \frac{1}{64}) \cup \{4\} \cup (64; +\infty)$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 15.5.2

Решите неравенство $\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$.

Ответ: $(0; \frac{1}{64}); 4; (64; +\infty)$.

$$\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$$

ОДЗ. $x > 0$, $x \in (0; +\infty)$

$$\frac{\log_4 64 + \log_4 x}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4 64 + \log_4 x} - \frac{4 \log_4 x + 16}{\log_4^2 x - 9} \geq 0$$

$$\frac{3 + \log_4 x}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{3 + \log_4 x} - \frac{4 \log_4 x + 16}{\log_4^2 x - 9} \geq 0$$

Пусть $\log_4 x = t$, тогда

$$\frac{3+t}{t-3} + \frac{t-3}{3+t} - \frac{4t+16}{t^2-9} \geq 0$$

$$\frac{(t+3)(t+3) + (t-3)(t-3)}{(t-3)(t+3)} - \frac{4t+16}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{t^2+3t+3t+9+t^2-3t-3t+9-4t-16}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{2t^2 - 4t + 2}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{2(t-1)^2}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$



$$\log_4 x < -3$$

$$x < \frac{1}{64}$$

$$\log_4 x = 1$$

$$x = 4$$

$$\log_4 x > 3$$

$$x > 64$$

Ответ: $x \in (-\infty; \frac{1}{64}) \cup (4) \cup (64; +\infty)$

Комментарий.

При выполнении задания допущена ошибка в решении простейшего логарифмического неравенства. В решении также содержится ошибочное утверждение, связанное с ОДЗ.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 15.6.1

Решите неравенство $\log_3(5-5x) \geq \log_3(x^2-3x+2) - \log_3(x+4)$.

Ответ: $[-3; 1)$.

$$\log_3(5-5x) \geq \log_3(x^2-3x+2) - \log_3(x+4)$$

ОДЗ:

$$5(1-x) > 0$$

$$x^2-3x+2 > 0 \Rightarrow (x-2)(x-1) > 0$$

$$x > -4$$

$$\log_3(5-5x) \geq \log_3 \frac{x^2-3x+2}{x+4}$$


$3 > 1 \Rightarrow$ функция монотонно возрастает

$$\Rightarrow 5-5x \geq \frac{x^2-3x+2}{x+4} \Rightarrow \frac{(5-5x)(x+4) - x^2 + 3x - 2}{x+4} \geq 0$$

$$\frac{5x+20-5x^2-20x-x^2+3x-2}{x+4} \geq 0$$

$$\frac{-6x^2-12x+18}{x+4} \geq 0 \Rightarrow \frac{x^2+2x-3}{x+4} \leq 0 \Rightarrow \frac{(x+3)(x-1)}{x+4} \leq 0$$

~~метод интервалов~~



$$\Rightarrow x \in [-3; 1)$$

Ответ: $[-3; 1)$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 15.6.2

Решите неравенство $\log_3(5-5x) \geq \log_3(x^2-3x+2) - \log_3(x+4)$.

Ответ: $[-3; 1)$.

$$\log_3(5-5x) \geq \log_3(x^2-3x+2) - \log_3(x+4)$$

$$\text{ОДЗ. } \begin{cases} 5-5x > 0 \\ x^2-3x+2 > 0 \\ x+4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 1 \\ x < 1; x > 2 \\ x > -4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x \in (-4; 1); (2; +\infty)$$

$$\log_3(5-5x) + \log_3(x+4) \geq \log_3(x^2-3x+2)$$

$$\log_3(5-5x) \cdot (x+4) \geq \log_3(x^2-3x+2)$$

\log_3 - монотонно возрастающая функция \Rightarrow
знак неравенства не меняем.

$$(5-5x) \cdot (x+4) \geq x^2-3x+2$$

$$-6x^2-12x+18 \geq 0 \quad | : -6$$

$$x^2+2x-3 \leq 0 \Rightarrow (x-1)(x+3) \leq 0$$



$$\begin{cases} x \in [-3; 1] \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in (-4; 1); (2; +\infty) \end{cases} \Rightarrow x \in [-3; 1)$$

$$\text{Ответ: } [-3; 1)$$

Комментарий.

Система неравенств в ОДЗ решена неверно (не вычислительная ошибка). Также неверно решено логарифмическое неравенство.

Оценка эксперта: 0 баллов.

4. Критерии проверки и оценка решений задания 16

Задание № 16 — это текстовая задача с экономическим содержанием.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Подробнее: 1 балл можно выставить в тех случаях, когда сюжетное условие задачи верно сведено к решению математической (арифметической, алгебраической, функциональной, геометрической) задачи, но именно к решению, а не к отдельному равенству, набору уравнений, уравнению, задающему функцию, и т.п. Предъявленный текст должен включать описание того, как построена модель.

Следует подчеркнуть, что один и тот же сюжет может быть успешно сведён к различным математическим моделям и доведён до верного ответа. По этой причине в критериях оценивания нет жёсткого упоминания какой-либо конкретной (арифметической, алгебраической, геометрической, функциональной) модели.

Задача 16 (демонстрационный вариант ЕГЭ 2025 г.)

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг будет возрастать на r % по сравнению с концом предыдущего года (r — целое число);

— с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;

— в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;

— в июле 2030 года долг должен составить 200 тыс. рублей;

— в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;

— к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1480 тыс. рублей. Найдите r .

Решение. По условию долг (в тыс. рублей) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

800; 680; 560; 440; 320; 200; 160; 120; 80; 40; 0.

Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$. Тогда последовательность размеров долга (в тыс. рублей) по состоянию

на январь такова:

$800k$; $680k$; $560k$; $440k$; $320k$; $200k$; $160k$; $120k$; $80k$; $40k$.

Следовательно, платежи (в тыс. рублей) должны быть следующими:

$800k - 680$; $680k - 560$; $560k - 440$; $440k - 320$; $320k - 200$;

$200k - 160$; $160k - 120$; $120k - 80$; $80k - 40$; $40k$.

Значит, сумма всех платежей (в тыс. рублей) будет составлять:

$$5(560k - 440) + 5(120k - 80) = 3400k - 2600.$$

Получаем: $3400k - 2600 = 1480$, откуда $k = 1,2$ и $r = 20$.

Ответ: 20.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 16.1

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года) и общая сумма платежей после полного погашения кредита должна быть на 77 200 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Решение.

Пусть сумма кредита составляет S рублей, а ежегодные выплаты X рублей. По условию, долг перед банком (в рублях) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$$S, \frac{6}{5} \cdot S - X, \left(\frac{6}{5}\right)^2 S - \frac{6}{5} \cdot X - X, \left(\frac{6}{5}\right)^3 S - \left(\frac{6}{5}\right)^2 X - \frac{6}{5} \cdot X - X = 0,$$

откуда

$$X = \frac{\left(\frac{6}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{6}{5} - 1\right)}{\left(\frac{6}{5}\right)^3 - 1} \cdot S = \frac{216}{455} \cdot S; \quad 3X - S = \frac{193}{455} \cdot S = 77\,200.$$

Получаем $S = 182\,000$ рублей.

Ответ: 182 000.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 16.2

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1300 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2580 тыс. рублей. Сколько рублей составит долг в июле 2030 года?

Решение.

Пусть долг в июле 2030 года составит B тыс. рублей.

По условию долг (в тыс. рублей) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$$1300; 1040 + 0,2B; 780 + 0,4B; 520 + 0,6B; 260 + 0,8B; \\ B; 0,8B; 0,6B; 0,4B; 0,2B; 0.$$

В январе каждого года долг возрастает на 20 %, значит, последовательность размеров долга (в тыс. рублей) по состоянию на январь такова:

$$1560; 1248 + 0,24B; 936 + 0,48B; 624 + 0,72B; 312 + 0,96B; \\ 1,2B; 0,96B; 0,72B; 0,48B; 0,24B.$$

Следовательно, платежи (в тыс. рублей) должны быть следующими:

$$520 - 0,2B; 468 - 0,16B; 416 - 0,12B; 364 - 0,08B; 312 - 0,04B; \\ 0,4B; 0,36B; 0,32B; 0,28B; 0,24B.$$

Значит, сумма всех платежей (в тыс. рублей) будет составлять:

$$5(416 - 0,12B) + 5 \cdot 0,32B = 2080 + B.$$

Получаем: $2080 + B = 2580$, откуда $B = 500$.

Долг в июле 2030 года составит 500 тыс. рублей.

Ответ: 500 тыс. рублей.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 16.3

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1254,4 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2027 года?

Решение.

Пусть платежи в 2027 и 2028 годах составят по x тыс. рублей.

В январе 2027 года долг (в тыс. рублей) будет равен 960, а в июле равен $960 - x$. В январе 2028 года долг будет равен $1152 - 1,2x$, а в июле равен $1152 - 2,2x$. В январе 2029 года долг будет равен $1382,4 - 2,64x$.

По условию, к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью, значит, платёж в 2029 году должен быть равен $(1382,4 - 2,64x)$ тыс. рублей,

а сумма всех платежей будет составлять $(1382,4 - 0,64x)$ тыс. рублей. Получаем:

$$1382,4 - 0,64x = 1254,4; 0,64x = 128,$$

откуда $x = 200$.

Платёж в 2027 году должен быть равен 200 тыс. рублей.

Ответ: 200 тыс. рублей.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 16.4

15 января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн руб. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, где r – **целое** число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн руб.)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат будет больше 1,2 млн руб.

Решение.

По условию, долг перед банком (в млн руб.) на 15-е число каждого месяца должен уменьшаться до нуля следующим образом:

$$1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0.$$

Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$, тогда долг на 1-е число каждого месяца равен:

$$k; 0,9k; 0,8k; 0,7k; 0,6k; 0,5k.$$

Следовательно, выплаты со 2-го по 14-е число каждого месяца составляют:

$$k - 0,9; 0,9k - 0,8; 0,8k - 0,7; 0,7k - 0,6; 0,6k - 0,5; 0,5k.$$

Общая сумма выплат составляет:

$$\begin{aligned} & k(1 + 0,9 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 0,5) - (0,9 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 0,5) = \\ & = (k - 1)(1 + 0,9 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 0,5) + 1 = 4,5(k - 1) + 1. \end{aligned}$$

По условию, общая сумма выплат будет больше 1,2 млн руб., значит,

$$4,5(k - 1) + 1 > 1,2; 4,5 \cdot \frac{r}{100} + 1 > 1,2; r > 4 \frac{4}{9}.$$

Наименьшее целое решение этого неравенства – число 5. Значит, искомое число процентов – 5.

Ответ: 5.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 16.5

- 15 января планируется взять кредит в банке на 39 месяцев. Условия его возврата таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 20% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r .

(Считайте, что округления при вычислении платежей не производятся.)

Решение.

Пусть сумма кредита равна S . По условию, долг перед банком по состоянию на 15-е число должен уменьшаться до нуля равномерно:

$$S, \frac{38S}{39}, \dots, \frac{2S}{39}, \frac{S}{39}, 0.$$

Первого числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$. Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$, тогда последовательность размеров долга на 1-е число каждого месяца такова:

$$kS, \frac{38kS}{39}, \dots, \frac{2kS}{39}, \frac{kS}{39}.$$

Следовательно, выплаты должны быть следующими:

$$(k-1)S + \frac{S}{39}, \frac{38(k-1)S + S}{39}, \dots, \frac{2(k-1)S + S}{39}, \frac{(k-1)S + S}{39}.$$

Всего следует выплатить $S + S(k-1)\left(1 + \frac{38}{39} + \dots + \frac{2}{39} + \frac{1}{39}\right) = S(1 + 20(k-1))$.

Общая сумма выплат на 20% больше суммы, взятой в кредит, поэтому

$$20(k-1) = 0,2; \quad k = 1,01; \quad r = 1.$$

Ответ: 1.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Примеры оценивания решений задания 16

Пример 16.1.1

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года) и общая сумма платежей после полного погашения кредита должна быть на 77 200 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Ответ: 182 000.

16) S - сумма (руб) X - платеж (руб) $p = 20\%$
оставшийся долг

конец 2026г. S

конец 2027г. $S \cdot 1,2 - X$

конец 2028г. $(S \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X$

конец 2029г. $((S \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X = 0$

Также известно: $S = 3X - 77\,200$

$$1,2^3 (3X - 77\,200) - 1,2^2 X - 1,2 X - X = 0$$

$$5,184 X - 1,44 X - 1,2 X - X = 133\,401,6$$

$$1,544 X = 133\,401,6$$

$$X = \frac{133\,401\,600}{1544} = 86\,400$$

$$S = 3X - 77\,200 = 259\,200 - 77\,200 = 182\,000$$

Ответ: планируется взять 182 000 руб

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 16.1.2

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года) и общая сумма платежей после полного погашения кредита должна быть на 77 200 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Ответ: 182 000.

✓16.

Долг, руб.	Долг + %, руб.	Выплата, руб.
S	$1,2 S$	x
$1,2 S - x$	$1,2 (1,2 S - x)$	x
$1,2 (1,2 S - x) - x$	$1,2 (1,2 (1,2 S - x) - x)$	x

Пусть ~~S~~ руб. S руб. - сумма кредита

x руб. - ежегодный платеж

$$3x = S + 77200$$

$$S = 3x - 77200$$

$$\begin{cases} 3x = S + 77200 \\ 1,2(1,2(1,2S - x) - x) = x \end{cases}$$

$$1,2(1,2(1,2S - x) - x) = x$$

$$1,2(1,44S - 1,2x - x) = x$$

$$1,728S - 2,64x = x$$

$$1,728S = 3,64x$$

$$1,728(3x - 77200) = 3,64x$$

$$5,184x - 133401,6 = 3,64x$$

$$1,544x = 133401,6$$

$$x = 86400$$

$$S = 3x - 77200$$

$$S = 259200 - 77200$$

$$S = 182000$$

Ответ: 182000 руб.

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 16.1.3

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года) и общая сумма платежей после полного погашения кредита должна быть на 77 200 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Ответ: 182 000.

N16

	долг к началу (руб)	долг к концу (руб)	выплата (руб)	остаток (руб)
1	S	1,2S	x	1,2S - x
2	1,2S - x	1,2 ² S - 1,2x	x	1,2 ² S - 1,2x - x
3	1,2 ² S - 1,2x - x	1,2 ³ S - 1,2 ² x - 1,2x	x	1,2 ³ S - 1,2 ² x - 1,2x - x

$$\begin{cases} 1,2^3 S - 1,2^2 x - 1,2x - x = 0 \\ 3x = S + 77200 \end{cases}$$

$$1,728 \cdot 3S = 3,64(S + 77200)$$

$$1,544S = 77200$$

$$S = 50000 \text{ руб.}$$

Ответ: 50000 руб.

$$\textcircled{1} 1,728S - 1,44x - 1,2x - x = 0$$

$$1,728S - 3,64x = 0$$

$$1,728S = 3,64x$$

$$1,728S = 3,64 \cdot \frac{S + 77200}{3}$$

Комментарий.

Верно построена математическая модель. Ошибка допущена в строке $1,544S = 77200$, должно быть $1,544S = 3,64 \cdot 77200$.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 16.1.4


В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года) и общая сумма платежей после полного погашения кредита должна быть на 77 200 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Ответ: 182 000.

~16. S руб. - сумма кредита $k = 1,2 = \left(1 + \frac{20}{100}\right)$



$$kS - \frac{2}{3}S + \frac{2}{3}kS - \frac{1}{3}S + \frac{1}{3}kS = S + 77200$$

$$2kS - 2S = 77200$$

$$S(2k - 2) = 77200$$

$$S = \frac{77200}{2 \cdot 1,2 - 2} = \frac{77200}{0,4} = 193000 \text{ руб.}$$

Ответ: 193000 рублей

Комментарий.

Неверно построена математическая модель.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 16.2.1

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1300 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2580 тыс. рублей. Сколько рублей составит долг в июле 2030 года?

Ответ: 500 тыс. рублей.

16. Для того, чтобы наглядно всё показать, составим таблицу. (Январь - после возрастания долга на 20%, июль - после платежа)

Пусть x - величина, на которую уменьшается долг каждый год с 2026 до 2030

y - величина, на которую уменьшается долг каждый год с 2031 по 2035

Таблица (Платеж равен разности между суммой долга в январе и в июле)

Год	Январь	Июль	Платеж
2025	—	$5x + 5y$	—
2026	$\frac{5 \cdot 6}{5}x + 6y$	$4x + 5y$	$\frac{10x}{5} + y$
2027	$\frac{4 \cdot 6}{5}x + 6y$	$3x + 5y$	$\frac{9x}{5} + y$
2028	$\frac{3 \cdot 6}{5}x + 6y$	$2x + 5y$	$\frac{8x}{5} + y$
2029	$\frac{2 \cdot 6}{5}x + 6y$	$x + 5y$	$\frac{7x}{5} + y$
2030	$\frac{6}{5}x + 6y$	$5y$	$\frac{6x}{5} + y$
2031	$\frac{6 \cdot 5}{5}y$	$4y$	$\frac{10y}{5}$
2032	$\frac{6 \cdot 4}{5}y$	$3y$	$\frac{9y}{5}$
2033	$\frac{6 \cdot 3}{5}y$	$2y$	$\frac{8y}{5}$
2034	$\frac{6 \cdot 2}{5}y$	y	$\frac{7y}{5}$
2035	$\frac{6}{5}y$	0	$\frac{6y}{5}$

По условию задачи мы можем составить систему уравнений:

$$\begin{cases} 5x + 5y = 1300 \\ \frac{10x}{5} + y + \frac{9x}{5} + y + \dots + \frac{6x}{5} + y + \frac{10y}{5} + \frac{9y}{5} + \dots + \frac{6y}{5} = 2580 \end{cases}$$

(По условию задачи сумма всех платежей равна 2580 тыс. рублей, нач. сумма 1300)

$$\begin{cases} 5x + 5y = 1300 \\ 5y + \left(\frac{10}{5}(x+y) + \frac{9}{5}(x+y) + \dots + \frac{6}{5}(x+y) \right) = 2580 \end{cases}$$

$$5y + \frac{(x+y)}{5} \left(\frac{10}{1} + 9 + 8 + 7 + 6 \right) = 5y + \frac{x+y}{5} \cdot \left(\frac{10+6}{2} \cdot 5 \right) =$$

$$= 5y + 8(x+y)$$

$$5x + 5y = 1300$$

$$x + y = 260$$

$$\cancel{8(x+y)} \quad 8(x+y) = 2080$$

$$5y + 8(x+y) = 2580$$

$$5y + 2080 = 2580$$

$$5y = 500$$

По таблице долг в итоге равен 5y, т.е.
500 тыс. рублей

Ответ: 500 тыс. рублей

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 16.2.2

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1300 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2580 тыс. рублей. Сколько рублей составит долг в июле 2030 года?

Ответ: 500 тыс. рублей.

N 16

$S = 1300$ тыс. руб - сумма кредита
 r - процент банка
 $r = 20\%$
 n - срок кредитования
 $n = 10$

1) составим схему выплат:

год	долг до начала %	долг после начисл. %	выплата	остаток
2026	S	$1,2S$	$0,2S + x$	$S - x$
2027	$S - x$	$1,2(S - x)$	$0,2(S - x) + x$	$S - 2x$
2028	$S - 2x$	$1,2(S - 2x)$	$0,2(S - 2x) + x$	$S - 3x$
2029	$S - 3x$	$1,2(S - 3x)$	$0,2(S - 3x) + x$	$S - 4x$
2030	$S - 4x$	$1,2(S - 4x)$	$0,2(S - 4x) + x$	$S - 5x$
2031	$S - 5x$	$1,2(S - 5x)$	$0,2(S - 5x) + y$	$S - 5x - y$
2032	$S - 5x - y$	$1,2(S - 5x - y)$	$0,2(S - 5x - y) + y$	$S - 5x - 2y$
2033	$S - 5x - 2y$	$1,2(S - 5x - 2y)$	$0,2(S - 5x - 2y) + y$	$S - 5x - 3y$
2034	$S - 5x - 3y$	$1,2(S - 5x - 3y)$	$0,2(S - 5x - 3y) + y$	$S - 5x - 4y$
2035	$S - 5x - 4y$	$1,2(S - 5x - 4y)$	$0,2(S - 5x - 4y) + y$	$S - 5x - 5y$

2) т.к. в июле 2035 года кредит был полностью погашен, то долг на конец 2035 года составил 0 рублей, значит:

$$S - 5x - 5y = 0$$

$$y = \frac{S - 5x}{5} = \frac{S}{5} - x = \frac{1300}{5} - x = 260 - x$$

3) сумма выплат за 2026-2030 года: $0,2S + x + 0,2(S - x) + x + 0,2(S - 2x) + x + 0,2(S - 3x) + x + 0,2(S - 4x) + x =$
 $= S + 3x$

сумма выплат за 2031-2035 года:

$$0,2(S - 5x) + y + 0,2(S - 5x - y) + y + 0,2(S - 5x - 2y) + y + 0,2(S - 5x - 3y) + y + 0,2(S - 5x - 4y) + y =$$

$$= S - 5x + 3y$$

4) общая сумма выплат по условию равняется 2580 тыс. рублей, значит:

$$\begin{aligned} S + 3x + S - 5x + 3y &= 2580 \\ 2S - 2x + 3y &= 2580 \\ 2S - 2x + 3(260 - x) &= 2580 \\ 2S - 2x + 780 - 3x &= 2580 \\ x &= \frac{2S + 780 - 2580}{5} = \frac{2 \cdot 1300 + 780 - 2580}{5} = 160. \end{aligned}$$

5) т.к. с ~~2026~~ 2026 г по 2030 г долг равномерно уменьшается на x , то долг в июле 2030 г будет составлять:

$$S - 5x = 1300 - 5 \cdot 160 = 500 \text{ тыс. руб.}$$

Ответ: 500 тыс. рублей.

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 16.2.3

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1300 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2580 тыс. рублей. Сколько рублей составит долг в июле 2030 года?

Ответ: 500 тыс. рублей.

№ 16.

$S = 1300$ тыс. руб. — сумма кредита ; $S_{\text{платежей}} = 2580$ тыс. руб.
 $r = 20\%$ — процентная ставка ; $b = 1 + 0,2 = 1,2$ — коэффициент

x — часть, на которую уменьшается долг в 2026–2030 гг.
 y — часть, на которую уменьшается долг в 2031–2035 гг.

год	Долг с %	Выплаты	Долг после выплат
2025			S
2026	Sb	$Sb - S + x$	$S - x$
2027	$Sb - xb$	$Sb - xb - S + 2x$	$S - 2x$
2028	$Sb - 2xb$	$Sb - 2xb - S + 3x$	$S - 3x$
2029	$Sb - 3xb$	$Sb - 3xb - S + 4x$	$S - 4x$
2030	$Sb - 4xb$	$Sb - 4xb - S + 5x$	$S - 5x$
2031	$Sb - 5xb$	$Sb - 5xb - S + 5x + y$	$S - 5x - y$
2032	$Sb - 5xb - yb$	$Sb - 5xb - yb - S + 5x + 2y$	$S - 5x - 2y$
2033	$Sb - 5xb - 2yb$	$Sb - 5xb - 2yb - S + 5x + 3y$	$S - 5x - 3y$
2034	$Sb - 5xb - 3yb$	$Sb - 5xb - 3yb - S + 5x + 4y$	$S - 5x - 4y$
2035	$Sb - 5xb - 4yb$	$Sb - 5xb - 4yb$	$0 = S - 5x - 5y$

Суммарные выплаты: $10Sb + 35xb - 10yb - 9S + 35X + 10Y = 2580$

$$\begin{cases} 10 \cdot 1300 \cdot 1,2 - 35 \cdot 1,2 \cdot X - 10 \cdot 1,2 \cdot Y - 9 \cdot 1300 + 35X + 10Y = 2580 & (1) \text{ тыс. руб.} \\ 1300 - 5X - 5Y = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) Y = 260 - X$$

$$\begin{aligned} 2) 15600 - 42X - 12Y - 11700 + 35X + 10Y &= 2580 \\ 3900 - 7X - 2Y &= 2580 \end{aligned}$$

$$7X + 2Y = 1310$$

$$7X = 1310 - 2Y$$

~~$$X = \frac{1310 - 2Y}{7}$$~~

$$7X = 1310 - 2(260 - X)$$

$$5X = 790$$

$$X = 158 \text{ — тыс. руб.}$$

Долг в июле 2030 составит:

$$S - 5X = 1300 - 5 \cdot 158 = 510 \text{ тыс. руб.}$$

Ответ: 510 тыс. руб.

Комментарий.

Математическая модель построена верно. Ошибка допущена при решении уравнения: вместо уравнения $7x + 2y = 1310$ должно быть уравнение $7x + 2y = 1320$.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 16.2.4

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1300 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2580 тыс. рублей. Сколько рублей составит долг в июле 2030 года?

Ответ: 500 тыс. рублей.

ш/б.

т.к. долг погашается равными платежами - x - выпл. на погашение долга - 2026 - 2030 годах

y - выплаты на погашение долга с 2031 - 2035 г.

из условия следует, что $5x + 5y = 1300$

$\Rightarrow 5(x+y) = 1300 \Rightarrow x+y = 260$, $\cdot 1,2$ - наши проценты

Схема 1

Сумма выплат = сумма долга + погаш. проценты \Rightarrow
 Погашение процентов: $2580 - 1300 = 1280 \Rightarrow$

У схемы 1 сумма платежей за первые 5 лет 1280, пусть $S = 1300 \Rightarrow$

26.01-04 $S \cdot 1,2 - (S - x) = S \cdot 1,2 - S + x$

27.02-04 $(S - x) \cdot 1,2 - (S - 2x) = S \cdot 1,2 - 1,2x - S + 2x$

28.03-04 $(S - 2x) \cdot 1,2 - (S - 3x) = S \cdot 1,2 - 2x \cdot 1,2 - S + 3x$

29.04-04 $(S - 3x) \cdot 1,2 - (S - 4x) = S \cdot 1,2 - 1,2 \cdot 3x - S + 4x$

30.05-04 $(S - 4x) \cdot 1,2 - (S - 5x) = S \cdot 1,2 - 4x \cdot 1,2 - S + 5x$

=> сумма выплат за первые 5 лет:

$$\text{Выплата по послед. 5 лет} = \frac{12}{10} (\underline{S} + \underline{S} - x + \underline{S} - 2x + \underline{S} - 3x + \underline{S} - 4x) - (\underline{S} - x + \underline{S} - 2x + \underline{S} - 3x + \underline{S} - 4x + \underline{S} - 5x)$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow S + 3x \text{ (первые 5 лет)} \\ & \text{сумма выплат: } 1,2 (\underline{S} - 5x + \underline{S} - 5x - y + \underline{S} - 5x - 2y + \underline{S} - 5x - 3y + \underline{S} - 5x - 4y) - (\underline{S} - 5x - y + \underline{S} - 5x - 2y + \underline{S} - 5x - 3y + \underline{S} - 5x - 4y + \underline{S} - 5x - 5y) \end{aligned}$$

$$31 \text{ г. } (\underline{S} - 5x) \cdot 1,2 - (\underline{S} - 5x - y)$$

$$32 \text{ г. } (\underline{S} - 5x - y) \cdot 1,2 - (\underline{S} - 5x - 2y)$$

$$33 \text{ г. } (\underline{S} - 5x - 2y) \cdot 1,2 - (\underline{S} - 5x - 3y)$$

$$34 \text{ г. } (\underline{S} - 5x - 3y) \cdot 1,2 - (\underline{S} - 5x - 4y)$$

$$35 \text{ г. } (\underline{S} - 5x - 4y) \cdot 1,2 - (\underline{S} - 5x - 5y)$$

$$\Rightarrow 1,2 (5\underline{S} - 25x - 10y) - (5\underline{S} - 25x - 15y)$$

$$\Rightarrow \frac{12}{10} \cdot 5\underline{S} - \frac{12 \cdot 25}{10} x - \frac{10 \cdot 12}{10} y - 5\underline{S} + 25x + 15y \Rightarrow$$

=> сумма выплат

$$2580 = \underline{S} + 3x + \underline{S} + 19x + 3y \Rightarrow$$

$$2580 = 2\underline{S} + 22x + 3y \Rightarrow 2580 = 2 \cdot 1300 + 22x + 3y$$

$$2580 - 2600 = 22x + 3y$$

Комментарий.

Математическая модель не построена. При подсчете суммы платежей за последние пять лет из-за вычислительной ошибки вместо выражения $\underline{S} - 5x + 3y$ получено выражение $\underline{S} + 19x + 3y$, что привело к составлению неверного уравнения.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 16.3.1

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1254,4 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2027 года?

Ответ: 200 тыс. рублей.

№16 Начальный долг - 800 тыс.
Каждый год долг возр в 1,2 раза от текущего долга
Пусть платежи в 2027 и 2028 годах составили x тыс. р.
а в 2029 - y тыс. рублей. Тогда согласно условию за-
дачи: $x+x+y=1254,4 \Rightarrow y=1254,4-2x$
Далее рассмотрим таблицу долга и выплат:

	Долг	Выплата	Остаток
2027	$1,2 \cdot 800 = 960$	x	$960 - x$
2028	$1,2(960 - x)$	x	$1,2(960 - x) - x$
2029	$1,2(1,2(960 - x) - x)$	y	0

Тогда, согласно данной таблице, долг и выплата в последний год равны, тогда

$$1,2(1,2(960 - x) - x) - y = 0, \text{ т.к. } y = 1254,4 - 2x, \text{ то}$$
$$1,2(1152 - 2,2x) - 1254,4 + 2x = 0$$
$$1382,4 - 2,64x - 1254,4 + 2x = 0$$
$$0,64x = 128$$
$$x = 200, \text{ значит платежи в 2027 и 2028 годах}$$

составит 200 тыс. р., что и требовалось найти

Ответ: 200 тыс. р.

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 16.3.2

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1254,4 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2027 года?

Ответ: 200 тыс. рублей.

N16
Т.к. деньги ~~каждый~~ ^{берут} в июле 2026 г., то в 2026 году никаких платежей не делаем и долг на конец 2026 г. равен 800 тыс. руб.

Тогда в январе ²⁰²⁷ долг возрастёт на 20%, т.е. в $(1 + \frac{20}{100}) = 1,2$ раз, т.е. долг будет равен $800 \cdot 1,2 = 960$ тыс. руб.

С февраля по июнь вносился некоторый платеж, пусть он равен x тыс. Тогда в декабре 2027 г. долг равен $960 - x$ (тыс. руб.)

Тогда в январе 2028 г. долг возр. в 1,2 раза: $(960 - x) \cdot 1,2 = 1152 - 1,2x$ (тыс. руб.)

С февр. по июнь 2028 г. вносился платеж, равный платежу в 2027 г., т.е. x (тыс. руб.). Тогда в декабре 2028 г. долг составл.

$1152 - 1,2x - x = 1152 - 2,2x$ (тыс. руб.).

Тогда в январе 2029 г. долг возраст. в 1,2 раза: $(1152 - 2,2x) \cdot 1,2 = 1382,4 - 2,64x$ (тыс. руб.)

с февр. по июнь 2029 г. ~~автом~~ вносится платеж, и т.к.
кредит и долг погашаются полностью, то платеж равен
оставш. сумме долга, т.е. $1382,4 - 2,64x$ (тыс. руб.).

Известно, что сумма всех платежей равна 1254,4 тыс. руб.
т.е.

$$x + x + 1382,4 - 2,64x = 1254,4$$

$$0,64x = 128$$

$$x = \frac{128}{0,64} = \frac{128 \cdot 100}{64} = 200 \quad (\text{тыс. руб.})$$

Т.е. платеж 2027 г. составил 200 тыс. руб. ≈ 200.000 руб.

Ответ: 200 тыс. руб. (или же 200.000 руб.)

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 16.3.3

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1254,4 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2027 года?

Ответ: 200 тыс. рублей.

Пусть $S = 800$ тыс руб - сумма кредита, процент $p = 20$,
платежи 2027 и 2028 г по x тыс руб каждый, y - платеж 2029 г
Каждый январь долг возрастает в $1 + \frac{p}{100} = 1,2$ раза
Тогда получим систему уравнений:

$$\begin{cases} ((S \cdot 1,2 - x) \cdot 1,2 - x) \cdot 1,2 - y = 0 \\ 2x + y = 1254,4 \end{cases}$$
$$1,728S - 2,64x - y = 0$$
$$y = 1,728S - 2,64x$$
$$2x + 1,728S - 2,64x = 1254,4$$
$$0,64x = 1,728S - 1254,4$$
$$0,64x = 128$$
$$64x = 12800$$
$$x = 100$$

Ответ: 100 тыс. руб.

Комментарий.

Верно построена математическая модель. Линейное уравнение решено неверно.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 16.3.4

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1254,4 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2027 года?

Ответ: 200 тыс. рублей.

Пусть март - месяц платежа
 Пусть x - выплата в 2027 г. ~~в 2027 г.~~ = выплата в 2028 г.
 Тогда y - выплата в 2029 г.

Дата	Долг
июль 2026	800
январь	$0,2 \cdot 800 = 160$
март } 2027	\Rightarrow была выплата = x
июль	$160 - x$
январь	$0,2(160 - x) = 32 - 0,2x$
март } 2028	\Rightarrow была выпл. = x
июль	$32 - 0,2x - x = 32 - 1,2x$
январь	$0,2(32 - 1,2x) = 6,4 - 0,24x$
март } 2029	\Rightarrow была выпл. = y
июль	$6,4 - 0,24x - y$

$$\begin{cases} 6,4 - 0,24x - y = 0 \\ 2x + y = 1254,4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 1254,4 - 2x \\ 6,4 - 0,24x - 1254,4 + 2x = 0 \end{cases}$$

$$1,76x - 1248 = 0$$

$$x = \frac{1248}{1,76}$$

$$x = \frac{7800}{11} \approx 709 \text{ тыс. р.}$$

Ответ: 709 тыс. р.

Комментарий.

Неверно построена математическая модель.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 16.4.1

15 января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн руб. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, где r – **целое** число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн руб.)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат будет больше 1,2 млн руб.

Ответ: 5.

Всего было 6 вариантов: $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$.

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 \geq 1,2$$

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = S$$

r	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	S
7	0,12	0,163	0,156	0,149	0,142	0,135	1,315
5	0,15	0,185	0,14	0,138	0,13	0,125	1,225
4	0,14	0,126	0,132	0,128	0,124	0,12	1,18

$$P_1 = (1 + \frac{r}{100}) - 0,9$$

$$P_2 = 0,9(1 + \frac{r}{100}) - 0,6$$

$$P_3 = 0,8(1 + \frac{r}{100}) - 0,4$$

$$P_4 = 0,7(1 + \frac{r}{100}) - 0,6$$

$$P_5 = 0,6(1 + \frac{r}{100}) - 0,5$$

$$P_6 = 0,5(1 + \frac{r}{100})$$

Наименьшим числом, при котором $S > 1,2$ является 5. При $r=4, S < 1,2$.

Ответ: 5

Комментарий.

Математическая модель построена верно. Усложняет проверку отсутствие вычислений. В таблице все результаты вычислений по формулам, записанным справа, верные. Логика решения верна.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 16.4.2

15 января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн руб. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, причём r – целое число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн руб.)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат будет больше 1,2 млн руб.

Ответ: 5.

Решение:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 > 1,2 \text{ млн, где } x - \text{ выплата}$$

$$N = 1 - \text{ сумма кредита}$$

$$r_{\min} = ? , \text{ где } r - \% \quad r \in \mathbb{Z}$$

$$x_1 = N + \frac{rN}{100} - 0,9 \quad ; \quad x_2 = 0,9 + \frac{r \cdot 0,9}{100} - 0,8 \quad ; \quad x_3 = 0,8 + \frac{r \cdot 0,8}{100} - 0,7 \quad ;$$

$$x_4 = 0,7 + \frac{r \cdot 0,7}{100} - 0,6 \quad ; \quad x_5 = 0,6 + \frac{r \cdot 0,6}{100} - 0,5 \quad ; \quad x_6 = 0,5 + \frac{r \cdot 0,5}{100}$$

$$1 + \frac{r}{100} - 0,9 + 0,9 + \frac{r \cdot 0,9}{100} - 0,8 + 0,8 + \frac{r \cdot 0,8}{100} - 0,7 + 0,7 + \frac{r \cdot 0,7}{100} - 0,6 + 0,6 +$$

$$+ \frac{r \cdot 0,6}{100} - 0,5 + 0,5 + \frac{r \cdot 0,5}{100} \geq 1,2$$

$$1 + \frac{3,5r}{100} > 1,2 \quad ; \quad r > \frac{20}{3,5} \quad ; \quad \text{Ответ: } r = 5\%$$

$$\frac{3,5r}{100} > 0,2 \quad ; \quad r_{\min} = 5\%$$

Комментарий.

Математическая модель построена верно. Допущены ошибки: $1 + \frac{4,5r}{100} > 1,2$, а не $1 + \frac{3,5r}{100} > 1,2$; $\frac{20}{3,5} > 5,7$, т.е. должно быть $r = 6$.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 16.4.3

15 января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн руб. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, где r – **целое** число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг(в млн руб.)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат будет больше 1,2 млн руб.

Ответ: 5.

месяц	сумма долга 1-го числа (млн р)	сумма долга 15-го числа	сумма выплат
1		1 млн	
2	$1 + 1 \cdot r$	0,9	$1 + 1r - 0,9$
3	$0,9 + 0,9 \cdot r$	0,8	$0,9 + 0,9r - 0,8$
4	$0,8 + 0,8 \cdot r$	0,7	$0,8 + 0,8r - 0,7$
5	$0,7 + 0,7 \cdot r$	0,6	$0,7 + 0,7r - 0,6$
6	$0,6 + 0,6 \cdot r$	0,5	$0,6 + 0,6r - 0,5$
7	$0,5 + 0,5 \cdot r$	0	$0,5 + 0,5r$

тогда общая сумма выплат:

$$1 + 1 \cdot r - 0,9 + 0,9 + 0,9r - 0,8 + 0,8 + 0,8r - 0,7 + 0,7 + 0,7r - 0,6 + 0,6 + 0,6r - 0,5 + 0,5 + 0,5r = 1 + r + 0,9r + 0,8r + 0,7r + 0,6r + 0,5r = 1 + 4,5r$$

общая сумма выплат должна быть больше 1,2 млн =>

$$1 + 4,5r > 1,2$$

$$4,5r > 0,2$$

$$r > 2,25$$

наименьшее $r = 3$. т.к. r – целое число, то

Ответ: r наименьшее = 3

Комментарий.

Математическая модель построена неверно. Если подставить в таблицу число 3 вместо r , то сумма долга уже на 1-е число второго месяца должна составить 4 млн руб. Кроме того, ещё и неравенство решено неверно.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 16.5.1

15 января планируется взять кредит в банке на 39 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 20% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r .

Ответ: 1.

S - сумма, которую взяли в кредит
 x - сумма, на которую каждый раз уменьшается долг.

$\frac{r\%}{100} = n$, где $r\%$ - на сколько возрастает долг.

	банк	выплаты
1.	$S + Sn$	$Sn + x$
2.	$S - x + (S - x)n$	$(S - x)n + x$
⋮		
39.	$S - 38x + (S - 38x)n$	$(S - 38x)n + x \Rightarrow S - 38x + (S - 38x)n = (S - 38x)n + x \Rightarrow$
40.	0	$\Rightarrow S = 39x$

Z - сумма выплат

По условию: $Z - S = 0,2S$

$$\begin{aligned} Z &= Sn + x + (S - x)n + x + \dots + (S - 38x)n + x = 39x + n(39S - (x + 2x + \dots + 38x)) \\ &= 39x + n(39S - x(\frac{1+38}{2} \cdot 38)) = 39x + n \cdot 39S - nx \cdot 39 \cdot 19 = 39x + n \cdot 39 \cdot 39x - n \cdot 39 \cdot 19x = 39x + 39 \cdot 20nx \Rightarrow \\ &\Rightarrow 39x + 39 \cdot 20nx - 39x = 0,2 \cdot 39x \Rightarrow 39 \cdot 20nx = 0,2 \cdot 39x \Rightarrow \\ &\Rightarrow n = \frac{0,2}{20} = \frac{1}{100}; \quad z = n \cdot 100 \Rightarrow r = 1\% \end{aligned}$$

Ответ: 1%.

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 16.5.2

- 15 января планируется взять кредит в банке на 39 месяцев. Условия его возврата таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 20% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r .

Ответ: 1.

Всего 39 месяцев. Пусть сумма, взятая в кредит — S . Пусть $k = \frac{r}{100}$ — коэффициент начисления процентов. Тогда, Выплати каждый месяц будут равны; из части долга $\frac{S}{39}$ + проценты за месяц. Проценты за месяц, вычисляются по формуле:

$$1 \text{ мес.} \quad 2 \text{ м.} \quad 3 \text{ м.} \quad \dots \quad 39 \text{ м.}$$
$$S \cdot k \quad + \quad \frac{38S \cdot k}{39} \quad + \quad \frac{37S \cdot k}{39} \quad \dots \quad \frac{S \cdot k}{39}$$

Применим формулу арифметической прогрессии

$$N = \left(\frac{x_1 + x_n}{2} \right) \cdot n$$

$$\text{Процента} = \left(\frac{S \cdot k + \frac{S \cdot k}{39}}{2} \right) \cdot 39 = \frac{39S \cdot k + S \cdot k}{2} = \frac{40S \cdot k}{2}$$
$$= 20 S k.$$

Часть долга:

$$1 \text{ м.} \quad 2 \text{ м.} \quad \dots \quad 39 \text{ м.}$$
$$\frac{S}{39} + \frac{S}{39} + \dots + \frac{S}{39} = S.$$

Общие выплаты:

$$S + 20 \cdot S \cdot k = 1,2 \cdot S$$

$$20k = 0,2.$$

$$k = 0,01$$

$$k = \frac{r}{100}$$

$$0,01 \cdot 100 = r \Rightarrow r = 1\%$$

Ответ: ~~1%~~ 1%

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

5. Критерии проверки и оценка решений задания 17

Задание № 17 — это планиметрическая задача. В пункте a нужно доказать геометрический факт, в пункте b – найти (вычислить) геометрическую величину.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта a и обоснованно получен верный ответ в пункте b	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте b ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта a и при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , ИЛИ при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте b с использованием утверждения пункта a , при этом пункт a не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	3

Задача 17 (демонстрационный вариант ЕГЭ 2025 г.)

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$.

а) Докажите, что $AC = CE$.

б) Найдите длину диагонали BE , если $AD = 6$.

Решение.

а) В четырёхугольнике $ABCD$ острые углы ACB и CAD опираются на равные хорды AB и CD . Следовательно, $\angle ACB = \angle CAD$, а значит, прямые BC и AD параллельны. Аналогично прямые CD и BE параллельны.

Значит, четырёхугольники $ABCD$ и $BCDE$ являются равнобедренными трапециями. Следовательно, $AC = BD = CE$.


б) Обозначим точку пересечения диагоналей AD и BE через M . Четырёхугольник $BCDM$ является параллелограммом, поскольку его противоположные стороны параллельны. Значит: $BM = CD = AB = 3$, $DM = BC = DE = 4$. Следовательно, треугольники ABM и MDE равнобедренные, причём $\angle BAM = \angle AMB = \angle DME = \angle DEM$.

Значит, эти треугольники подобны с коэффициентом подобия $\frac{DE}{AB} = \frac{4}{3}$, откуда получаем:

$$ME = \frac{DE}{AB} \cdot AM = \frac{DE}{AB} \cdot (AD - DM) = \frac{8}{3};$$

$$BE = BM + ME = \frac{17}{3}.$$

Ответ: б) $\frac{17}{3}$.



Задание 17.1

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$.

а) Докажите, что $AC = CE$.

б) Найдите длину диагонали BE , если $AD = 6$.

Решение.

а) В четырёхугольнике $ABCD$ острые углы ACB и CAD опираются на равные хорды AB и CD . Следовательно, $\angle ACB = \angle CAD$, а значит, прямые BC и AD параллельны. Аналогично прямые CD и BE параллельны.

Значит, четырёхугольники $ABCD$ и $BCDE$ являются равнобедренными трапециями. Следовательно, $AC = BD = CE$.


б) Обозначим точку пересечения диагоналей AD и BE через M . Четырёхугольник $BCDM$ является параллелограммом, поскольку его противоположные стороны параллельны. Значит: $BM = CD = AB = 3$, $DM = BC = DE = 4$. Следовательно, треугольники ABM и MDE равнобедренные, причём $\angle BAM = \angle AMB = \angle DME = \angle DEM$.

Значит, эти треугольники подобны с коэффициентом подобия $\frac{DE}{AB} = \frac{4}{3}$, откуда получаем:

$$ME = \frac{DE}{AB} \cdot AM = \frac{DE}{AB} \cdot (AD - DM) = \frac{8}{3};$$

$$BE = BM + ME = \frac{17}{3}.$$

Ответ: б) $\frac{17}{3}$.



Задание 17.2

Биссектрисы углов BAD и BCD равнобедренной трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O . Через точку O провели прямую, параллельную основаниям BC и AD .

- а) Докажите, что отрезок этой прямой внутри трапеции равен её боковой стороне.
 б) Найдите отношение длин оснований трапеции, если $AO = CO$ и данная прямая делит сторону AB в отношении $AM : MB = 1 : 2$.

Решение.

а) Прямые MO и AD параллельны, значит, $\angle MOA = \angle OAD$ (рис. 1). Следовательно, треугольник AMO равнобедренный и $AM = MO$. Аналогично $CN = NO$.

Поскольку $MB = CN$, получаем:

$$AB = AM + CN = MO + ON = MN.$$

б) Пусть $\angle OAD = \angle OAM = \alpha$. Тогда

$$\angle CNO = \angle CDA = \angle BAD = 2\alpha.$$

Пусть $MO = AM = a$. Тогда

$$MB = CN = ON = 2a.$$

По теореме косинусов для треугольников AMO и CNO имеем:

$$AO^2 = a^2 + a^2 - 2a^2 \cdot \cos(180^\circ - 2\alpha),$$

$$OC^2 = 4a^2 + 4a^2 - 8a^2 \cdot \cos 2\alpha,$$

откуда получаем:

$$2a^2 + 2a^2 \cdot \cos 2\alpha = 8a^2 - 8a^2 \cdot \cos 2\alpha; \cos 2\alpha = \frac{3}{5}.$$

Проведём высоты M_1M_2 и N_1N_2 через точки M и N соответственно (рис. 2) и найдём длины оснований трапеции:

$$\begin{aligned} AD &= AM_2 + M_2N_2 + N_2D = \\ &= MN + 2AM \cdot \cos 2\alpha = \\ &= 3a + \frac{6}{5}a = \frac{21}{5}a, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BC &= M_1N_1 - M_1B - CN_1 = MN - 2BM \cdot \cos 2\alpha = \\ &= 3a - \frac{12}{5}a = \frac{3}{5}a. \end{aligned}$$

Таким образом, $BC : AD = 1 : 7$.

Ответ: б) 1 : 7.




Рис. 1




Рис. 2

Задание 17.3

В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основаниям. Из точки A на сторону CD опустили перпендикуляр AH . На стороне AB отмечена точка E так, что прямые CD и CE перпендикулярны.

- а) Докажите, что прямые BH и ED параллельны.
 б) Найдите отношение BH к ED , если $\angle BCD = 120^\circ$.

Решение.

а) Поскольку

$$\angle ABC = \angle AHC = \angle ECD = \angle EAD = 90^\circ,$$

около четырёхугольников $ABCH$ и $AECD$ можно описать окружности (рис. 1).

Значит,

$$\angle ABH = \angle ACH = \angle ACD = \angle AED,$$

то есть прямые BH и ED параллельны.

б) Опустим из точки B перпендикуляр BK на прямую CD (рис. 2). Стороны KH и CD треугольников BKH и ECD лежат на одной прямой, а стороны BK и EC , BH и ED попарно параллельны. Значит, треугольники BKH и ECD подобны.

Поскольку

$$\begin{aligned} BK &= BC \cdot \sin \angle BCK = EC \cdot \cos \angle ECB \cdot \sin \angle BCK = \\ &= EC \cdot \cos 30^\circ \cdot \sin 60^\circ = \frac{3}{4} EC, \end{aligned}$$

коэффициент подобия равен $\frac{3}{4}$. Значит,

$$BH : ED = 3 : 4.$$

Ответ: б) 3 : 4.




Рис. 1




Рис. 2

Задание 17.4


В равнобедренном тупоугольном треугольнике ABC на продолжение боковой стороны BC опущена высота AH . Из точки H на сторону AB и основание AC опущены перпендикуляры HK и HM соответственно.

- а) Докажите, что отрезки AM и MK равны.
 б) Найдите MK , если $AB = 5$, $AC = 8$.

Решение.

а) Поскольку $\angle AMH = \angle AKH = 90^\circ$, около четырёхугольника $AMKH$ можно описать окружность с диаметром AH . Получаем:

$\angle BAC = \angle BCA = 90^\circ - \angle HAC = \angle AHM$,
 поэтому $AM = MK$ как хорды, стягивающие равные дуги.



б) В прямоугольных треугольниках AHM и ACH имеем:

$$AM = AH \cdot \cos \angle HAM = AC \cdot \cos^2 \angle HAM = AC \cdot (1 - \cos^2 \angle ACB).$$

Поскольку $\cos \angle ACB = \frac{AC}{2BC} = \frac{4}{5}$, получаем:

$$MK = AM = \frac{72}{25}.$$

Ответ: б) $\frac{72}{25}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> и обоснованно получен верный ответ в пункте <i>б</i>	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>б</i> ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> и при обоснованном решении пункта <i>б</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , ИЛИ при обоснованном решении пункта <i>б</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>б</i> с использованием утверждения пункта <i>a</i> , при этом пункт <i>a</i> не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	3

Задание 17.5

В остроугольном треугольнике ABC все стороны различны. Прямая, содержащая высоту BH треугольника ABC , вторично пересекает описанную около этого треугольника окружность в точке K . Отрезок BN – диаметр этой окружности.

а) Докажите, что $AN = CK$.

б) Найдите NK , если радиус описанной около треугольника ABC окружности равен 16, $\angle BAC = 40^\circ$, $\angle ACB = 85^\circ$.

Решение.

а) Поскольку BN – диаметр описанной около треугольника ABC окружности, получаем

$$\begin{aligned} \angle ABN &= 90^\circ - \angle ANB = 90^\circ - \angle ACB = \\ &= 90^\circ - \angle HCB = \angle CBH = \angle CBK. \end{aligned}$$

Следовательно, хорды AN и CK стягивают равные дуги, а значит, они равны.


б) Пусть $R = 16$ – радиус окружности, описанной около треугольника ABC . Имеем:

$$\begin{aligned} \angle ABN &= \angle CBH = 90^\circ - \angle HCB = 5^\circ, \\ \angle ABC &= 180^\circ - \angle BAC - \angle ACB = 55^\circ; \\ \angle KBN &= \angle ABC - \angle ABN - \angle CBK = 45^\circ. \end{aligned}$$

Следовательно, по теореме синусов

$$NK = 2R \cdot \sin \angle KBN = 2R \cdot \sin 45^\circ = 16\sqrt{2}.$$

Ответ: б) $16\sqrt{2}$.



Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> и обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i>	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i> ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> и при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , ИЛИ при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i> с использованием утверждения пункта <i>a</i> , при этом пункт <i>a</i> не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	3

Примеры оценивания решений задания 17


Пример 17.1.1

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$.

- а) Докажите, что $AC = CE$.
 б) Найдите длину диагонали BE , если $AD = 6$.

Ответ: б) $\frac{17}{3}$.

Задача 17




Дано: $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$
 а) Доказать $AC = CE$
 б) Найти BE , если $AD = 6$

Решение
 а) 1) Углы опирающиеся на равные дуги - равны \Rightarrow
 $\angle BCA = \alpha = \angle CED = \angle CAD$
 $\angle BAC = \beta = \angle ECD = \angle BEC$
 2) Тогда $\angle ABC = \angle CDE = 180^\circ - \alpha - \beta$
 $\Rightarrow \triangle ABC = \triangle CDE$ (по 2м сторонам и углу между ними)
 $\Rightarrow AC = CE$

б) 1) $\angle BEC = \angle ECD = \alpha$ - накрест лежащие углы
 $\angle BCA = \alpha = \angle CAD$
 \Rightarrow по признаку \parallel прямых $AD \parallel BC$ и $CD \parallel BE$
 получили, что $ABCD$ и $BCDE$ - трапеции

- 4) Т.к. $AB = CD$ и $BC = DE$, то трапеции $ABCD$ и $BCDE$ - равнобедренные.
 5) Биномской теореме.



- Опустим высоты: $h_1, h_2 = 4 = BC$
 $AD = h_2 + h_1 = 3$
 б) Т.к. $AD = 6$, то $h_1 = h_2 = 4$ (р/б трап.)
 7) $\cos \angle BAC = \cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{3} = \cos \angle CBE$
 8) В $BCDE$: $h_2 = BC \cdot \cos(\alpha + \beta) = BC \cdot \cos \angle CBE = \frac{4}{3}$
 9) $BE = h_2 + h_1 + \alpha \cdot h_2 = \frac{4}{3} + 3 = \frac{17}{3}$

Ответ: б) $\frac{17}{3}$

Комментарий.

Приведено верное доказательство утверждения пункта а и обоснованно получен верный ответ в пункте б.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 17.1.2


Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$.

а) Докажите, что $AC = CE$.

б) Найдите длину диагонали BE , если $AD = 6$.

Ответ: б) $\frac{17}{3}$.

№ 17.



Дано окружность ω ;

$A, B, C, D, E \in \omega$

$AB = CD = 3$; $BC = DE = 4$.

а) $\Rightarrow AC = CE$

б) если $AD = 6$, найти BE

а) Проверю AC, AD, EB, EC .

Пусть $\angle BEC = \alpha$; $\angle AEB = \beta$.

З-чу, что $\angle BEC$ опир на хорду $BC = 4$; также $\angle EAD$ опир на хорду $ED = 4 \Rightarrow \angle EAD = \angle BEC$ (равные углы в окр опираются на равные хорды) $\Rightarrow \angle EAD = \alpha$.

$\angle AEB$ опирается на хорду $AB = 3$, з-чу, что $\angle CAD$ опир на хорду $CD = 3 \Rightarrow \angle CAD = \angle AEB = \beta$ (равные углы, опир на равные хорды).

$\angle AEC = \angle AEB + \angle BEC = \alpha + \beta$; $\angle EAC = \angle EAD + \angle DAC = \alpha + \beta \Rightarrow$

$\angle AEC = \angle EAC$. з-чу, что $\angle AEC$ опир на хорду AC ; $\angle EAC$ опир на хорду EC , т.к $\angle AEC = \angle EAC$, то и хорды на к-ые эти два угла опираются тоже равны $\Rightarrow AC = CE$. з.т.д.


б) Проверю BD . з-чу, что $\angle DBC$ опир на $CD = 3$;

$\angle ADB$ опирается на $AB = 3 \Rightarrow \angle DBC = \angle ADB$ (равные углы

опир на равные хорды) $\Rightarrow AD \parallel BC$ (AD - сер для $AD \parallel BC$)

$\Rightarrow ABCD$ - р/б трапеция ($BC \parallel AD$; $AB = CD$)

нарисуем ос:



проеку высоту BH_1, CH_2

т.к. BK_1K_2 - прям ($BC \parallel K_1K_2$,

$BH_1 \perp K_1K_2; CH_2 \perp K_1K_2$), то

$K_1K_2 = 4 \rightarrow AK_1 = 1$ (т.к. $AK_1 = K_2D$)

т.к. $\angle ABK_1 = \angle CK_2D$

$(\angle BAK_1 = \angle CDK_2;$

$AB = CD = 3;$

$\angle BAK_1 = \angle CDK_2 = 90^\circ)$

тогда $\triangle CK_2D$ -

прям с $K_2D = 1, ED = 3 \rightarrow$

по т. Пиф. где $\triangle CK_2D \rightarrow CK_2^2 = 9 - 1 = 8$
($CH_2 = \cos^2 - KD^2$)

$\triangle ACK_1$ - прям с $AK_1 = 1 + 4 = 5;$

$CK_1^2 = 8$ по т. Пиф. где $\triangle ACK_1$

$$AC^2 = CK_1^2 + AK_1^2 = 8 + 25 = 33 \rightarrow AC = \sqrt{33}$$

рассмотрим $\triangle ABC$. где $AB = 3; BC = 4; AC = \sqrt{33}$

по т. кос. где $\rightarrow \text{тр} \rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cos \angle BAC \cdot AB \cdot AC$

$$16 = 9 + 33 - 2 \cos \angle BAC \cdot 3 \cdot \sqrt{33} \quad \text{Пусть } \angle BAC = \alpha \rightarrow$$

$$2 \cos \alpha \cdot 3\sqrt{33} = 26$$

$$3\sqrt{33} \cos \alpha = 13$$

$$\cos \alpha = \frac{13}{3\sqrt{33}}$$

\rightarrow т.к. $\angle BEC = \angle BAC$, т.к. оба опущены на AC
 $\Rightarrow \cos \angle BEC = \frac{13}{3\sqrt{33}}$

по т. кос $\angle BEC \rightarrow$

$$BC^2 = BE^2 + EC^2 - 2 \cos \angle BEC \cdot BE \cdot EC \quad \text{Пусть } BE = x;$$

т.к. $\cos \angle BEC = \frac{13}{3\sqrt{33}}$, то

$$16 = x^2 + 33 - 2 \cos \frac{13}{3\sqrt{33}} \cdot x \cdot \sqrt{33}$$

$$x^2 + 17 - \frac{26}{3}x = 0 \quad | \cdot 3$$

$$3x^2 - 26x + 51 = 0$$

$$D/4 = 13^2 - 3 \cdot 51 = 169 - 153 = 16$$

$$x = \frac{13 \pm 4}{3} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{17}{3} \\ x = \frac{9}{3} = 3 \end{cases}$$

Пусть $x = 3 \rightarrow BE = 3 \rightarrow BEDC$ - прям ($BE = ED = 3; BC = CD = 4$)

известно, что если в окружности
у двух противоположных сторон
попарно равны, то это прямая \Rightarrow

$$\angle BEC = \angle BCD = \angle EDC = 90^\circ$$

но $\triangle ABCD$ - трап. и если $\angle BAC = 90^\circ$, то $\angle BDC = 90^\circ$ ($BC \parallel AD$), т.к.

тогда $\angle BDA = \angle BDC - \angle ADC = 90^\circ - 90^\circ = 0 \rightarrow$ такого быть не может

$$\Rightarrow BE \neq 3 \Rightarrow BE = \frac{17}{3} \quad \text{Ответ: } \frac{17}{3}$$

Комментарий.

Приведено верное доказательство утверждения пункта а и обоснованно получен верный ответ в пункте б.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 17.1.3


Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$.

а) Докажите, что $AC = CE$.

б) Найдите длину диагонали BE , если $AD = 6$.

Ответ: б) $\frac{17}{3}$.

17



а) Дано: $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$

Доказ-ть: $AC = CE$

Доказ-во:

$AB = CD$ - значит, $\cup AB = \cup CD$ (по теореме о том, что равные хорды отсекают равные дуги)

$BC = DE$ - значит, $\cup BC = \cup DE$ (по той же теореме)

$$\begin{array}{l} \cup BC = \cup DE \\ \cup AB = \cup CD \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{значит, } \cup AB + \cup BC = \cup DE + \cup CD \\ \cup AC = \cup CE \end{array} \right.$$

Значит, $AC = CE$ (по теореме о том, что равные дуги образуют равные хорды) з.т.з.

Комментарий.

Приведено верное доказательство утверждения пункта а, решение пункта б отсутствует.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 17.1.4

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$.

а) Докажите, что $AC = CE$.

б) Найдите длину диагонали BE , если $AD = 6$.

Ответ: б) $\frac{17}{3}$.

№17.
 Дано,
 $ABCDE$ — вписан в окружность
 $AB = CD = 3$
 $BC = DE = 4$
 а) Доказать:
 $AC = CE$

Решение:

а) равные хорды заключают равные дуги

↓

$$\angle B A = \angle C D = \alpha$$


$$\angle B C = \angle D E = \beta$$

2) $\angle A E$ опирается на дугу BC

$$\angle C A E = \frac{\beta + \alpha}{2}$$

3) $\angle C E A$ опирается на дугу $AC \Rightarrow \angle C E A = \frac{\alpha + \beta}{2}$

4) $\angle C A E = \angle C E A = \frac{\alpha + \beta}{2} \Rightarrow \triangle A C E - \text{и.д.} \Rightarrow AC = CE$.
 Доказано.



Комментарий.

Приведено верное доказательство утверждения пункта а, решение пункта б отсутствует.

Оценка эксперта: 1 балл.


Пример 17.2.1

Биссектрисы углов BAD и BCD равнобедренной трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O . Через точку O провели прямую, параллельную основаниям BC и AD .

а) Докажите, что отрезок этой прямой внутри трапеции равен её боковой стороне.

б) Найдите отношение длин оснований трапеции, если $AO = CO$ и данная прямая делит сторону AB в отношении $AM : MB = 1 : 2$.

Ответ: б) 1:7.



- 1) $\angle KAD = \angle BKA$, т.к. AK - биссектриса при $AD \parallel BC$ и секущей AK . $\angle KAD = \alpha$; $\angle BKA = \alpha$, по док. выше.
- 2) Пусть $\angle BAK = \angle KAD$, т.к. AK - биссектриса α ; $\angle BKA = \alpha$, по док. выше.
- 3) $\angle OAD = \angle MOA = \alpha$ при $MN \parallel AD$ и секущей AK .
- 4) $\angle AMO$ - равнобедренный, т.к. $\angle MAO = \angle MOA = \alpha$, следовательно $AM = MO$.
- 5) $AM = ND$, т.к. MN - отрезок, параллельный основаниям в равнобедренной трапеции, поэтому $AMND$ - равнобедренная трапеция, т.к. $\angle MAD = \angle NDA$, по условию, $\angle AMN = \angle MND = 180^\circ - 2\alpha$, по свойству равнобедренной трапеции. $\angle AMN = \angle MND = 180^\circ - 2\alpha$, по свойству равнобедренной трапеции. $\angle AMN = \angle MND = 180^\circ - 2\alpha$, по свойству равнобедренной трапеции.
- 6) $\angle BCP = \angle CPD = \beta$, т.к. PC - биссектриса при $BC \parallel AD$ и секущей PC .
- 7) $\angle CON = \angle CPD = \beta$, т.к. соответственные при $MN \parallel AD$ и секущей PC .
- 8) $\angle BCP = \angle PCD = \beta$, т.к. PC - биссектриса, откуда $\triangle PCD$ равнобедренный $CD = PD$.
- 9) $MBCN$ - равнобедренная трапеция, т.к. $BC \parallel MN$, $\angle MBC = \angle BCN$, по условию, $\angle BMN = \angle MNB = 180^\circ - 2\beta$, т.к. односторонние при $BC \parallel MN$ и секущей BM и CN , следовательно $BM = CN$.
- 10) Пусть $AM = x$, $MB = y$, тогда $AB = AM + MB = x + y$.

1) по доказательству выше $AM = MO = x$
 $BM = CN = ON = y$, значит $MN = MO + ON = x + y$
 Отсюда $MN = AB = CD = x + y$ Ч.Т.Д.

б) ~~найти~~ Найти: $\frac{BC}{AD} = ?$

1) $\frac{AM}{MB} = \frac{1}{2}$, $AM = x$, $MB = y$, $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$, значит $y = 2x$

2) $AMOP$ - ромб, т.к. $AM = MO$, по док. выше, а AO - диагональ и биссектриса,
 значит $AP = PO = AM = MO = x$

3) $AM \parallel PO$, т.е. $AMOP$ - ромб, значит $\angle MAP = \angle OPD$, т.к. соответственные при
 $AM \parallel PO$ и секущей AD ,
 отсюда $2\alpha = \beta$, значит $\angle BAD = \angle CDA$

4) $\angle CNO = \angle CDP = 2\alpha = \beta$, т.к. соотв при $MN \parallel AD$ и сек. CD

5) $\triangle CON$ и $\triangle CPD$ - равнобедренные, т.к. мы доказали, что все углы в них
 равны, а значит равны 60° , отсюда $OC = CN = ON$; $PC = CD = DP$

6) $CN = 2x$; $ND = x$; $CD = CN + ND = 2x + x = 3x$; $CD = PD = 3x$, по док. выше

7) $MBCD$ - параллелограмм, т.к. $BC \parallel MO$, так же по док. выше $2\alpha = \beta$, значит
 $\angle BMO = \angle BAP = 2\alpha = \beta$, т.к. соответственные при $MN \parallel AD$ и
 сек. AB ,
 $\angle BMO = \angle BCO$,
 отсюда $MO = BC = x$

8) $AD = AP + PD = x + 3x = 4x$

9) $\frac{BC}{AD} = \frac{x}{4x} = \frac{1}{4}$


Ответ: б) $\frac{1}{4}$

Комментарий.

Имеется верное доказательство утверждения пункта а, в пункте б получен неверный ответ не из-за арифметической ошибки.


Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 17.2.2



№17.
 Дано: $ABCD$ — ρ/δ трап., AO — бисс. $\angle BAD$,
 CO — бисс. $\angle BCD$. $BC \parallel AD$, $AD \neq BC$.
 а) Док. $MN = AB$.
 б) $\frac{BC}{AD} = ?$, $AO = CO$, $AM : MB = 1 : 2$.

а) $M = a \cap AB$, $N = a \cap CD$. AO — бисс. $\Rightarrow \angle BAO = \angle OAD$.
 CO — бисс. $\Rightarrow \angle BCO = \angle OCD$.
 Т.к. $BC \parallel MN \parallel AD$, то $\angle MOA = \angle OAD$ и $\angle NOC = \angle OCB$ как \angle ы.
 Тогда $\angle BAO = \angle MOA \Rightarrow \triangle AMO$ — $\rho/\delta \Rightarrow AM = MO$.
 $\angle CON = \angle NOC \Rightarrow \triangle CNO$ — $\rho/\delta \Rightarrow CN = NO$.
 $\angle BMN = \angle BAD$ и $\angle CNO = \angle CDA$ как \angle ы ($MN \parallel AD$)
 Знают, $BCND$ — ρ/δ трапеция $\Rightarrow BM = CN$.
 Тогда $MN = MO + ON = AM + CN = AM + BM = AB$ \checkmark т.д.



№17(б).
 Пусть $AM = x$, $MB = 2x$, $\angle AMO = \angle$, $\angle AOK =$
 Тогда $MO = x$, $ON = CN = 2x$
 Д.п.: $AB \cap CD = E$. Т.к. $\angle BAD = \angle CDA$, то
 $\triangle AED$ — ρ/δ .

Д.п. EH — медиана, высота и бисс. $\triangle AED$.
 Из $\triangle AOM$ и $\triangle OCN$ по т. кос. $AO = OC = x^2 + x^2 - 2 \cdot x \cdot x \cdot \cos \angle$
 $= 4x^2 + 4x^2 - 2 \cdot 2x \cdot 2x \cdot \cos \angle$
 $6x^2 = -10x^2 \cos \angle \Rightarrow \cos \angle = -\frac{3}{5}$. $\cos \angle BAD = \cos \angle CDA =$
 $= \frac{3}{5}$. $\sin \angle BAD = \frac{4}{5}$.

$$AD = BC + 2 AB \cos \angle BAD = BC + \frac{6}{5} AB$$

$\angle EBC = \angle EAD$ (\angle ы) $\angle BEH$ — общий $\Rightarrow \triangle BEK \sim \triangle AEM$.
 BK — медиана $\triangle BEC$

$$\frac{BC}{AD} = \frac{BK}{AH} = \frac{BE}{AE} = \frac{BE}{BE+AB}$$

$$BE = \frac{BC}{2 \sin \angle BEC} = \frac{BC}{2 \cos \angle BAH} = \frac{5}{6} BC$$

$$BC \left(\frac{5}{6} BC + AB \right) = AD \cdot \frac{5}{6} BC$$

$\triangle ENO \sim \triangle EDH$ (по 2 \angle ам).

$$\frac{EN}{ED} = \frac{BC}{DN} \quad \frac{EC+2x}{EC+3x} = \frac{BC}{2x} \quad 2x(EC+2x) = BC(EC)$$

Комментарий.

Имеется верное доказательство утверждения пункта а, решение задания пункта б не завершено.

Оценка эксперта: 1 балл.


Пример 17.2.3

Биссектрисы углов BAD и BCD равнобедренной трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O . Через точку O провели прямую, параллельную основаниям BC и AD .

а) Докажите, что отрезок этой прямой внутри трапеции равен её боковой стороне.

б) Найдите отношение длин оснований трапеции, если $AO = CO$ и данная прямая делит сторону AB в отношении $AM : MB = 1 : 2$.

Ответ: б) 1 : 7.



17. $ML \parallel BC \parallel AD$
 а) Как-то: $ML = AB$ $ML = AB$
 б) $\frac{AD}{BC}$ - найти

Решение:
 1) $\angle NAO = \angle LCO$ как н/л при $ML \parallel AD$, секущей AO .

- 2) В $\triangle AOM$ $\angle A = \angle O \Rightarrow AM = MO$ (по т.п. μ/δ)
- 3) $\angle BCO = \angle COL$ как н/л при BC и ML , секущей CO
- 4) В $\triangle COL$: $\angle C = \angle O \Rightarrow CL = LO$ (по т.п. μ/δ)
- 5) $\angle BML = \angle BAN$ и $\angle CLM = \angle CDA$ как соотв. углы при $ML \parallel AD$ секущих AM и CD . \Rightarrow Трапеция $BKLC$ - μ/δ (по т.п.); $BK = CL$
- 6) $BK = CL = LO$. $AK = KO$. $BK + AK = LO + KO = KL$. $\frac{AB = KL}{ML}$ УТД.
- 7) $\frac{AM}{MB} = \frac{1}{2}$. Пусть $AM = LO = x$; $MB = MO = 2x$. Тогда $ML = 3x$.

~~$x \geq \frac{2x}{2} \Rightarrow x \geq x$~~ $x \geq \frac{0,75y}{0,21}$

Если в классе будет такое же число, то он будет $(y+1)$.

По усл.: $\frac{y+1}{x+y+1} = 0,3 \Leftrightarrow y+1 = 0,3x+0,3y+0,3$
 $0,7y - 0,3x + 0,7 = 0 \quad | \cdot 10$
 $7y - 3x + 7 = 0$

Подставим x в $x \geq \frac{0,75y}{0,21}$:
 $3x = 7y + 7$
 $x = \frac{7y+7}{3}$

$\frac{7y+7}{3} \geq \frac{7,5y}{21} \quad | \cdot 21 \Rightarrow 7(7y+7) \geq 7,5y$
 $49y + 49 \geq 7,5y$
 $30y \leq 49 \quad y \leq \frac{49}{30}$

Т.к. $y \in \mathbb{Z}$, то единственное возможное $y = 1$.
 Тогда $x = \frac{7 \cdot 1 + 7}{3} = \frac{14}{3} \notin \mathbb{N}$.

Нет, такое невозможно.

$$\begin{aligned}
 S_{MBCI} &= \frac{BC+3x}{2} \cdot \frac{2}{3}h = \frac{h(BC+3x)}{3}, \text{ где } h - \text{высота.} \\
 S_{AMID} &= \frac{AD+3x}{2} \cdot \frac{1}{3}h = \frac{h(AD+3x)}{6} \\
 S_{MBCI} + S_{AMID} &= \frac{2hBC+6xh+hAD+3xh}{6} = \frac{2hBC+hAD+9xh}{6} \\
 S_{ABCO} &= \frac{BC+AD}{2}h \\
 S_{ABCO} &= S_{MBCI} + S_{AMID} \Leftrightarrow \frac{2hBC+hAD+9xh}{6} = \frac{BC+AD}{2}h \quad | \cdot \frac{3}{h} \\
 & \quad 2hBC+hAD+9xh = 3BC+3AD \\
 & \quad \underline{BC+2AD=9x.}
 \end{aligned}$$

Комментарий.

Утверждение в пункте а не доказано, решение задания пункта б не завершено.


Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 17.3.1


В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основаниям. Из точки A на сторону CD опустили перпендикуляр AH . На стороне AB отмечена точка E так, что прямые CD и CE перпендикулярны.

- а) Докажите, что прямые BH и ED параллельны.
 б) Найдите отношение BH к ED , если $\angle BCD = 120^\circ$.

Ответ: б) $3:4$.



а) Пусть $\angle ODH = \alpha$, тогда:
 $\angle HOD = 90^\circ - \alpha$; $\angle HOE = 90^\circ - \alpha$. ($\angle HOE = \angle HOD$ как верт.)
 $\angle EOH + \angle HOD = 180^\circ \Rightarrow \angle EOH = 90^\circ + \alpha$
 $\angle EOH = \angle MEO$ (как н.л.у) при $CE \parallel AH$ и сек $EO \Rightarrow$
 $\Rightarrow \angle MEO = 90^\circ - \alpha$ $\angle KEM = 180^\circ - \angle MEO = 90^\circ + \alpha$
 $\angle KEM = \angle BMC$ (как соотв.) $\Rightarrow \angle EMH = \angle BMC = 90^\circ + \alpha \Rightarrow$
 $\Rightarrow \angle OHM = 360^\circ - (90^\circ + \alpha) - (90^\circ + \alpha) - (90^\circ - \alpha) = 90^\circ - \alpha$
 $\angle CHM = 90^\circ - \alpha = \angle BMC = 90^\circ - \alpha$
 $\angle CHM = \angle BMC \Rightarrow \angle KEM = \angle EOH \Rightarrow EC \parallel BH$
 (п.к. равны соотв. углы.) ч.т.р



б) $\angle BCD = 120^\circ$
 $\angle ECD = 90^\circ \Rightarrow \angle BCE = 30^\circ$
 $\angle BCE = \angle BCD - \angle ECD = 30^\circ$
 $\angle BCE = \angle HAD$
 п.к. $CE \parallel AH$ и $BC \parallel AD$. (аналог
 н.л.у) $\Rightarrow \angle HAD = 30^\circ \Rightarrow HD = \frac{1}{2} AD$
 $\angle AHD = 60^\circ \Rightarrow \angle MHD = 30^\circ \Rightarrow HD = \frac{1}{2} MD$
 $MD = 2 HD = MH + HD = MH + 0.5 AD \Rightarrow$
 $\Rightarrow MH = 1.5 HD$ $\triangle MBH \sim \triangle MED$ (по 2 угл.) \Rightarrow
 $\Rightarrow \frac{BH}{ED} = \frac{MH}{MD} = \frac{1.5}{2} = \frac{3}{4}$
 Ответ: $\frac{3}{4}$

Комментарий.

В данном решении есть попытка доказательства утверждения пункта а. Логическая ошибка содержится в записи $\angle KEM = \angle BMC$ – это возможно только при параллельности прямых BH и ED , а как раз это и требовалось доказать. Верный ответ в пункте б получен обоснованно с использованием недоказанного утверждения пункта а.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 17.3.2


В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основаниям. Из точки A на сторону CD опустили перпендикуляр AH . На стороне AB отмечена точка E так, что прямые CD и CE перпендикулярны.

- а) Докажите, что прямые BH и ED параллельны.
 б) Найдите отношение BH к ED , если $\angle BCD = 120^\circ$.

Ответ: б) 3:4.

Дано:
 $ABCD$ - трапеция
 $BC \perp AB \perp AD$
 $AH \perp CD$
 $CE \perp CD$

а) Доказать:
 $BH \parallel ED$



Доказательство:
 1) т.к. $AH \perp CD$ и $CE \perp CD$, то $AH \parallel CE$;
 2) AB - секущая при двух \parallel прямых, значит $\angle BEC = \angle BAH$;
 3) BH - тоже секущая, значит $\angle BOE = \angle CON = \angle BHA$;
 4) ED - тоже секущая, значит $\angle CED = \angle EO_1A = \angle HO_1D$;
 5) $\angle EOH = 180^\circ - \angle CON$ (смеж. углы), $\angle EO_1H = 180^\circ - \angle BHA$. т.к. $\angle CON = \angle BHA$, то $\angle EOH = \angle EO_1H$, следовательно, $EOHO_1$ - параллелограмм, а его противоположные стороны = и \parallel , значит, $BH \parallel ED$.

Комментарий.

Имеется попытка доказательства утверждения пункта а. Логическая ошибка содержится в записи 5) – при вычислении угла $\angle EO_1H$: $\angle EO_1H = 180^\circ - \angle EO_1A$. Замена угла $\angle EO_1A$ углом $\angle BHA$ возможна только при условии параллельности прямых BH и ED , а как раз это и требовалось доказать.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 17.3.3

В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основаниям. Из точки A на сторону CD опустили перпендикуляр AH . На стороне AB отмечена точка E так, что прямые CD и CE перпендикулярны.

- Докажите, что прямые BH и ED параллельны.
- Найдите отношение BH к ED , если $\angle BCD = 120^\circ$.

Ответ: б) 3:4.

Дано: $AH \perp CD$ $\angle BCD = 120^\circ$
 $CE \perp CD$ и $CE \cap AB = E$
 а) Д-ть: $BH \parallel ED$
 б) $\frac{BH}{ED} = ?$

а) 1) $AH \perp CD$
 $CE \perp CD$ } \Rightarrow кон. пер. прямых $AH \parallel EC$
 2) $\angle DEC = \angle ODH$ как соств.
 3) $\angle ODH = 90^\circ - \alpha$
 4) Пусть $AB = x$ $AH = y$ 5) ~~$AB \perp CE$~~ ~~т.к.~~
 6) $\triangle BEC \sim \triangle BAN$ по 2-м углам ($\angle BAN$ - общий,
 $\angle BEC = \angle BAN$ как соств.) k - коэффициент подобия
 7) $AE = AB - BE = AB - kAB = x(1-k)$
 $AO = AH - OH = AH - kAH = y(1-k)$
 8) $\triangle AEO \sim \triangle ABH$ по углу и 2-м сторонам
 ($\angle A$ - общий; $\frac{AO}{AH} = \frac{1-k}{1}$ и $\frac{AE}{AB} = 1-k$) \Rightarrow
 $\Rightarrow \angle AEO = \angle ABH$
 б) ~~$ED \parallel BH$~~ т.к. т.к. $\angle AEO = \angle ABH$, то
 по признаку параллельности прямых (прямые парал., если
 соств. углы равны) $ED \parallel BH$ ξ т. д.

Комментарий.

Логическая ошибка: доказательство утверждения пункта а опирается на дополнительное условие из пункта б.


Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 17.4.1

В равнобедренном тупоугольном треугольнике ABC на продолжение боковой стороны BC опущена высота AH . Из точки H на сторону AB и основание AC опущены перпендикуляры HK и HM соответственно.

- а) Докажите, что отрезки AM и MK равны.
 б) Найдите MK , если $AB = 5$, $AC = 8$.

Ответ: б) $\frac{72}{25}$.



а) $\triangle ABE$: $\rho(\sigma) \Rightarrow \angle BAE \angle BCA$ (1)
 $\triangle AHE$: прямоуго. HK высота \Rightarrow
 $\triangle ACH \sim \triangle AKM \Rightarrow \angle ACB \angle AHM$ (2)
 $\triangle AOM \sim \triangle ONK$ ($\gamma\gamma$) $\Rightarrow \angle OAM \angle ONK$ (3)
 (1), (2), (3) $\Rightarrow OK$ - бисс $\triangle AKB$.
~~продолжить~~ продолжим прямую HK до
 стороны AC . $\triangle AKD$:

HM - бисс и бисс $\Rightarrow \triangle AKD$ - $\rho(\sigma) \Rightarrow HM$ - медиана $\Rightarrow AM = MD$
 $\triangle AKD$: прямоуго. $AM = MD \Rightarrow KM$ - бисс $\Rightarrow \angle KMA = \angle KMD$
 $\angle KMA = \angle KMD \Rightarrow KM = AM$ ч. т. д.

б) пусть $KB = x$ ~~$AK = x$~~ $\triangle AKB$: прямоуго. $AK^2 = AB^2 - KB^2$
 $\triangle AKC$: прямоуго $AK^2 = AC^2 - KC^2 \Rightarrow AB^2 - KB^2 = AC^2 - KC^2$
 $25 - KB^2 = 64 - CB^2 - 2KB \cdot CB - KB^2$ $KB = 1,4$
 $\triangle AKC$: $KC^2 = MC \cdot AC$ $(6,4)^2 = 8CM$ $CM = 5,12$
 $AM = AC - MC = 8 - 5,12 = 2,88$
 $AM = MK \Rightarrow MK = 2,88$

Ответ: б) $MK = 2,88$

Комментарий.

В доказательстве пункта а некорректно указано, что KM – биссектриса, при этом тут же записаны утверждения относительно KM , соответствующие медиане прямоугольного треугольника. Решение пункта б выполнено верно.


Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 17.4.2

В равнобедренном тупоугольном треугольнике ABC на продолжение боковой стороны BC опущена высота AH . Из точки H на сторону AB и основание AC опущены перпендикуляры NK и HM соответственно.

- а) Докажите, что отрезки AM и MK равны.
 б) Найдите MK , если $AB = 5$, $AC = 8$.

Ответ: б) $\frac{72}{25}$.



а) Доказательство:

Пусть $\angle BCA = \alpha$.
 Т.к. $\triangle ABC$ - равнобедренный,
 то и $\angle BAC = \alpha$.

$\angle CBA = 180 - 2\alpha$
 Пусть $BR \perp AC$, тогда $CR = RA$,
 $\angle CBR = \angle RBA = \frac{\angle CBA}{2} = \frac{180 - 2\alpha}{2} = 90 - \alpha$.
 $\angle ABH = 180^\circ - \angle CBA = 180^\circ - (180 - 2\alpha) = 2\alpha$
 Т.к. $\triangle BAH$ - прямоугольный ($AH \perp BC$),
 то $\angle BAH = 90 - 2\alpha$.

$\angle KHA = 180 - 90 - (90 - 2\alpha) = 2\alpha$.
 $\triangle BHA \sim \triangle KHA$ по трем углам.
 Пусть $AB \cap HM = O$.

$\angle AOM = 180 - 90 - \alpha = 90 - \alpha$.
 $\angle AOM = \angle KOM$ как вертикальные углы.

$\angle KHO = 180 - 90 - (90 - \alpha) = \alpha$.

$\angle KHO = \alpha$, $\angle KHA = 2\alpha$, тогда $\angle OHA = \alpha$.

Пусть $NK \cap AC = P$, тогда
 $\triangle ANP$ - равнобедренный,
 т.к. $NM \perp AP$, $\angle KHO = \angle OHA$.

Дано:
 $\angle ABC = 90^\circ$ $AB = 5$
 $AB = BC$ $AC = 8$
 $AH \perp BC$
 $NK \perp AB$
 $NM \perp AC$

Доказать:
 а) $AM = MK$ - ?
 Найти: б) MK - ?

$\angle HPA = \angle MAN = 90 - 2\alpha + \alpha = 90 - \alpha$.
 $PM = MA$, т.к. NM -
 - высота, медиана, биссектриса
 равнобедренного $\triangle ANP$.

$\triangle PKA$ - прямоугольный, т.к. $NK \perp AB$.
 Около $\triangle PKA$ можно описать
 окружность, и из-за того,
 что $\triangle PKA$ - прямоугольный,
 ее центр будет лежать
 в середине гипотенузы -
 точке M . AP будет ее
 диаметром, PM , AM и MK -
 радиусами.
 Получается, что
 $PM = AM = MK$, что и требовалось
 доказать.

б) Т.к. $BR \perp AC$ и $\triangle ABC$ -
 равнобедр., то $CR = RA =$
 $= \frac{AC}{2} = \frac{8}{2} = 4$.

По теореме Пифагора:

$$BR^2 = AB^2 - AR^2$$

$$BR^2 = 25 - 16 = 9$$

$$BR = \sqrt{9} = 3.$$

$\triangle BRA$ подобен $\triangle KPA$ по
 трем углам ($\angle BRA = \angle KPA = 90^\circ$;
 $\angle RBA = \angle APK = 90 - \alpha$; $\angle PAK = \angle RAB = \alpha$.)

$\triangle KPA$, в свою очередь, подобен $\triangle AOM$ по трем углам ($\angle AMO = \angle AKP = 90^\circ$; $\angle PAK = \angle MAO = \alpha$; $\angle AOM = \angle APK = 90^\circ - \alpha$), следовательно стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{AO}{AP} = \frac{AM}{AK} = \frac{OM}{KP}, \text{ и так как } PM = AM, AP = 2AM, \text{ коэффициент подобия } \triangle KPA \text{ и } \triangle AOM \text{ равен } 2.$$

$$\cos \alpha = \frac{AR}{AB} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Рассмотрим $\triangle PKM$, он - равнобедренный ($PM = KM$), тогда $\angle KPM = \angle KMP = 90^\circ - \alpha$.
Тогда $\angle PMK = 180^\circ - 2(90^\circ - \alpha) = 2\alpha$.

$$\cos \angle KPM = \cos(90^\circ - \alpha) = \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin \alpha.$$

$$\sin \alpha = \frac{PR}{AR} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Пусть $PM = AM = MK = x$
По теореме косинусов для $\triangle PKM$:

$$PK^2 = PM^2 + MK^2 - 2 \cdot PM \cdot MK \cdot \cos \angle KPM$$

$$PK^2 = 2x^2 - 2x^2 \cdot \sin \alpha$$

$$PK^2 = 2x^2 - 1,2x^2 = 0,8x^2$$

$$PK = \sqrt{0,8x^2} = \frac{2x\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = 2x\sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{2x\sqrt{5}}{5}$$

По теореме Пифагора для $\triangle APK$:

$$AK^2 = AP^2 - PK^2$$

$$AK^2 = 4x^2 - 0,8x^2 = 3,2x^2$$

$$AK = x\sqrt{\frac{32}{10}} = 4x\sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{4x\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{AK}{PK} = \frac{\frac{4x\sqrt{5}}{5}}{\frac{2x\sqrt{5}}{5}} = 2, \text{ ~~отсюда следует, что } BK = 5 - AK~~$$

По теореме Пифагора для $\triangle BKP$:

$$BP^2 = BK^2 + KP^2$$

$$16 - 16x + 4x^2 = BK^2 + KP^2$$

$$16 - 16x + 4x^2 = \frac{20x^2}{25} + 15 - \left(4x^2 + \frac{20x^2}{25}\right)$$

$$16 - 16x + 4x^2 = \frac{20x^2}{25} + 5 - \frac{80x^2}{25}$$

$$16 - 16x + 4x^2 = \frac{125 - 60x^2}{25}$$

$$16 - 16x + 4x^2 = \frac{25 - 12x^2}{5}$$

$$80 - 80x + 20x^2 = 25 - 12x^2$$

$$8x^2 - 80x + 65 = 0.$$

$$D = 6400 - 2080 = 4320$$

$$\sqrt{4320} = 12\sqrt{30}$$

$$x = \frac{12\sqrt{30} + 80}{16} = \frac{3\sqrt{30} + 5}{4}$$

$$= \frac{3\sqrt{30} + 20}{4} = MK;$$

$$\text{Ответ: } \frac{3\sqrt{30} + 20}{4};$$

Комментарий.

Доказательство утверждения пункта а верно. Правда, следует отметить, что в доказательстве получено много верных утверждений, которые не нужны для доказательства равенства отрезков AM и MK , кроме того, некорректно формулируется признак подобия треугольников.

В решении пункта б допущена ошибка при вычислении длины отрезка PK – вместо $\cos \angle KPM$ должно быть $\cos \angle KMP$.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 17.4.3

В равнобедренном тупоугольном треугольнике ABC на продолжение боковой стороны BC опущена высота AH . Из точки H на сторону AB и основание AC опущены перпендикуляры HK и HM соответственно.

- а) Докажите, что отрезки AM и MK равны.
 б) Найдите MK , если $AB = 5$, $AC = 8$.

Ответ: б) $\frac{72}{25}$.

$AN = CN$
 $AM = \frac{1}{2} AC = \frac{8}{2} = 4$
 $\cos A = \cos C = \frac{AK}{AB} = \frac{4}{5}$
 $\frac{AM}{Ah} = \frac{4}{5}$ $\cos A = \cos C = 0,8$ в $\triangle ABC$
 $\frac{AM}{5} = \frac{4}{5}$ $\frac{hC}{AC} = \frac{4}{5}$
 $\frac{hC}{8} = \frac{4}{5}$
 $5hC = 32$ $\frac{Ah}{AC} = \frac{3}{5}$ $Ah = 4,8$
 $hC = 6,4$
 $\sin^2 C = 1 - \cos^2 C = 1 - 0,64 = 0,36$
 $\sin C = 0,6$
 $\sin C = \cos A = \cos B$ в $\triangle ACh$
 $\frac{AM}{Ah} = \frac{4}{5}$ $\frac{AM}{Ah} = 0,6$
 $\frac{AM}{4,8} = \frac{4}{5}$ $AM = 0,6 \cdot 4,8$
 $AM = 2,88$
 $AM = MK = 2,88$

Dano: $AB = BC$; $\triangle ABC$
 $AB = 5$
 $BC = 8$
 $AK \perp AB$
 $HM \perp AC$
 $MK = ?$

Ответ: $MK = 2,88$

Комментарий.

Доказательство утверждения пункта а) отсутствует. Решение пункта б) выполнено верно с использованием недоказанного утверждения пункта а).

Оценка эксперта: 1 балл.


Пример 17.5.1

В остроугольном треугольнике ABC все стороны различны. Прямая, содержащая высоту BH треугольника ABC , вторично пересекает описанную около этого треугольника окружность в точке K . Отрезок BN – диаметр этой окружности.

а) Докажите, что $AN = CK$.

б) Найдите NK , если радиус описанной около треугольника ABC окружности равен 16, $\angle BAC = 40^\circ$, $\angle ACB = 85^\circ$.

Ответ: б) $16\sqrt{2}$.



Дано:

$BH \perp AC$
 BN – диаметр

а) Док-ть:

$AN = CK$

б) $R = 16$

$\angle BAC = 40^\circ$

$\angle ACB = 85^\circ$

Найти:

NK – ?

а) Док-во: $\angle BKN = 90^\circ$, т.к. BN – диаметр, $\Rightarrow \angle BKN = 90^\circ - \angle HBC \Rightarrow$
 $\Rightarrow \angle HCN = \angle HBC$, $\angle HCN = \angle ABN$ (т.к. они опираются на одну дугу) $\Rightarrow \angle ABN = \angle HBC \Rightarrow AN = CK$ (как хорды, стягивающие равные дуги).

Комментарий.

В доказательстве утверждения пункта а есть верное название прямого угла – « $\angle BKN = 90^\circ$ », при этом тут же записано противоречащее условию утверждение « BN – диаметр». Утверждение, записанное во второй строчке – « $\angle HCN = \angle ABN$ (т.к. они опираются на одну дугу)», – содержит неточность, поскольку точка H не лежит на окружности, а $\angle ACN = \angle ABN$ (так как они опираются на одну дугу). Решение пункта б отсутствует.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 17.5.2

В остроугольном треугольнике ABC все стороны различны. Прямая, содержащая высоту BH треугольника ABC , вторично пересекает описанную около этого треугольника окружность в точке K . Отрезок BN – диаметр этой окружности.

а) Докажите, что $AN = CK$.

б) Найдите NK , если радиус описанной около треугольника ABC окружности равен 16, $\angle BAC = 40^\circ$, $\angle ACB = 85^\circ$.


Ответ: б) $16\sqrt{2}$.

а) Пусть ABC – произвольный остроугольный треугольник, вписанный в окружность.

BN – диаметр, BH – высота $\triangle ABC$, прямая BK содержит высоту BH и пересекает окр. в точке K . $\angle ANB = 90^\circ$ (т.к. BN – диаметр.)

$\angle NKB$ – вписанный \angle , опирающийся на диаметр.

$\Rightarrow \angle NKB = 90^\circ \Rightarrow$ Прямая $AC \parallel$ прямой $NK \Rightarrow ASCN$ – трапеция. По св-ву трапеции, вписанной в окружность её стороны равны. $AN = CK$ ч.т.д.



Комментарий.

При выполнении пункта а используется недоказанное утверждение, что $ASCN$ – трапеция. В решении есть некорректное утверждение: «по свойству трапеции, вписанной в окружность, её стороны равны», при этом рядом записано верное равенство боковых сторон. Решение пункта б отсутствует.

Оценка эксперта: 1 балл.

6. Критерии проверки и оценка решений задания 18

Задание № 18 — это уравнение, неравенство или их системы с параметром.

Задачи с параметром допускают весьма разнообразные способы решения. Наиболее распространёнными из них являются:

- чисто алгебраический способ решения;
- способ решения, основанный на построении и исследовании геометрической модели данной задачи;
- функциональный способ, в котором могут быть и алгебраические, и геометрические элементы, но базовым является исследование некоторой функции.

Зачастую (но далеко не всегда) графический метод более ясно ведёт к цели. Кроме того, в конкретном тексте решения вполне могут встречаться элементы каждого из трёх перечисленных способов.

Задача 18 (демонстрационный вариант ЕГЭ 2025 г.)

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3) \cdot \sqrt{x - y + 3} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Решение.

Каждое решение уравнения $(x^2 - 5x - y + 3) \cdot \sqrt{x - y + 3} = 0$ либо является решением уравнения $x - y + 3 = 0$, откуда $y = x + 3$, либо является решением системы:

$$\begin{cases} x^2 - 5x - y + 3 = 0, \\ x - y + 3 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 5x + 3, \\ y \leq x + 3; \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 5x + 3, \\ x^2 - 5x + 3 \leq x + 3; \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 5x + 3, \\ x^2 - 6x \leq 0, \end{cases}$$

откуда $y = x^2 - 5x + 3$ при условии $0 \leq x \leq 6$.

Для каждого из этих случаев подставим $y = 3x + a$ и найдём количество корней получившегося уравнения в зависимости от a .

Первый случай: $3x + a = x + 3$, откуда $x = \frac{3-a}{2}$.

Второй случай: $3x + a = x^2 - 5x + 3$ при условии $0 \leq x \leq 6$. Получаем квадратное уравнение $x^2 - 8x - a + 3 = 0$. Дискриминант этого уравнения равен $64 + 4(a - 3) = 4(a + 13)$. Значит, уравнение $x^2 - 8x - a + 3 = 0$ имеет два корня при $a > -13$, имеет единственный корень $x = 4$ при $a = -13$ и не имеет корней при $a < -13$.

При $a > -13$ функция $f(x) = x^2 - 8x - a + 3$ принимает наименьшее значение при $x = 4$, и это значение отрицательно. Следовательно, больший корень уравнения $f(x) = 0$ удовлетворяет условию $0 \leq x \leq 6$ тогда и только тогда, когда $f(6) \geq 0$; $-a - 9 \geq 0$, откуда $a \leq -9$.

Аналогично меньший корень уравнения $f(x) = 0$ удовлетворяет условию $0 \leq x \leq 6$ тогда и только тогда, когда $f(0) \geq 0$; $-a + 3 \geq 0$, откуда $a \leq 3$.

Число $\frac{3-a}{2}$ является корнем квадратного уравнения $f(x) = 0$

при $\left(\frac{3-a}{2}\right)^2 - 4(3-a) - a + 3 = 0$, откуда

$$\left(\frac{a-3}{2}\right)^2 + 3(a-3) = 0; (a-3)(a+9) = 0,$$

то есть при $a = 3$ и при $a = -9$.

Таким образом, исходная система уравнений имеет ровно два различных решения при $a = -13$; $-9 \leq a < 3$.

Ответ: $a = -13$; $-9 \leq a < 3$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только исключением / включением точек $a = -9$ и / или $a = 3$	4
С помощью верного рассуждения получен промежуток $(-9; 3)$ множества значений a , возможно, с включением граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	3
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения параболы и прямых (аналитически или графически)	2
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	1
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только исключением / включением точек $a = -9$ и / или $a = 3$	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задание 18.1

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений


$$\begin{cases} y = |x - a| - 4, \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

Решение.

Уравнение $y = |x - a| - 4$ задаёт на плоскости Oxy пару лучей с общим началом в точке $(a; -4)$: луч l_1 , совпадающий с прямой $y = -x + a - 4$ при $x \leq a$, и луч l_2 , совпадающий с прямой $y = x - a - 4$ при $x \geq a$.

Уравнение $4|y| + x^2 + 8x = 0$ задаёт на плоскости Oxy множество точек, представляющее собой объединение дуги ω_1 параболы $y = \frac{1}{4}(x + 4)^2 - 4$ с концами в точках $(-8; 0)$ и $(0; 0)$ и дуги ω_2 параболы $y = -\frac{1}{4}(x + 4)^2 + 4$ с концами в тех же точках.



Рассмотрим варианты расположения луча l_1 и дуг ω_1 и ω_2 .

При $a = -4$ луч проходит через концевую точку дуг $(-8; 0)$, при $a = 4$ — через концевую точку дуг $(0; 0)$.

Найдём значение a , при котором прямая $y = -x + a - 4$ и парабола $y = \frac{1}{4}(x + 4)^2 - 4$ касаются, то есть имеют ровно одну общую точку. В этом случае уравнение $-x + a - 4 = \frac{1}{4}(x + 4)^2 - 4$ должно иметь единственный корень. Запишем это уравнение в виде $\frac{1}{4}x^2 + 3x - a + 4 = 0$, дискриминант этого квадратного уравнения $D = 9 + a - 4 = a + 5$. При условии $D = 0$, которое выполнено при $a = -5$, уравнение имеет единственный корень $x = -6$. Значит, касание прямой и параболы происходит при $a = -5$, причём точка касания имеет координаты $(-6; -3)$. Эта точка принадлежит одновременно дуге ω_1 и лучу l_1 .

Найдём значение a , при котором прямая $y = -x + a - 4$ и парабола $y = -\frac{1}{4}(x + 4)^2 + 4$ касаются, то есть имеют ровно одну общую точку. В этом случае уравнение $-x + a - 4 = -\frac{1}{4}(x + 4)^2 + 4$ должно иметь единственный корень. Запишем это уравнение в виде $\frac{1}{4}x^2 + x + a - 4 = 0$, дискриминант этого квадратного уравнения $D = 1 - a + 4 = 5 - a$. При условии $D = 0$, которое выполнено при $a = 5$, уравнение имеет единственный корень $x = -2$. Значит, касание прямой и параболы происходит при $a = 5$, причём точка касания имеет координаты $(-2; 3)$. Эта точка принадлежит одновременно дуге ω_2 и лучу l_1 .

Рассмотрим варианты расположения луча l_2 и дуг ω_1 и ω_2 .

При $a = -12$ луч проходит через концевую точку дуг $(-8; 0)$, при $a = -4$ — через концевую точку дуг $(0; 0)$.

Найдём значение a , при котором прямая $y = x - a - 4$ и парабола $y = \frac{1}{4}(x + 4)^2 - 4$ касаются, то есть имеют ровно одну общую точку. В этом случае уравнение $x - a - 4 = \frac{1}{4}(x + 4)^2 - 4$ должно иметь единственный корень. Запишем это уравнение в виде $\frac{1}{4}x^2 + x + a + 4 = 0$, дискриминант этого квадратного уравнения $D = 1 - a - 4 = -a - 3$. При условии $D = 0$, которое выполнено при $a = -3$, уравнение имеет единственный корень $x = -2$.

Значит, касание прямой и параболы происходит при $a = -3$, причём точка касания имеет координаты $(-2; -3)$. Эта точка принадлежит одновременно дуге ω_1 и лучу l_2 .

Найдём значение a , при котором прямая $y = x - a - 4$ и парабола $y = -\frac{1}{4}(x + 4)^2 + 4$ касаются, то есть имеют ровно одну общую точку. В этом случае уравнение $x - a - 4 = -\frac{1}{4}(x + 4)^2 + 4$ должно иметь единственный корень. Запишем это уравнение в виде $\frac{1}{4}x^2 + 3x - a - 4 = 0$, дискриминант этого квадратного уравнения $D = 9 + a + 4 = a + 13$. При условии $D = 0$, которое выполнено при $a = -13$, уравнение имеет единственный корень $x = -6$. Значит, касание прямой и параболы происходит при $a = -13$, причём точка касания имеет координаты $(-6; 3)$. Эта точка принадлежит одновременно дуге ω_2 и лучу l_2 .

Точка пересечения прямых l_1 и l_2 принадлежит объединению дуг ω_1 и ω_2 при $a = -4$.

Таким образом, найдено семь граничных значений параметра: $a = -13$ (система уравнений имеет одно решение), $a = -12$ (два решения), $a = -5$ (три решения), $a = -4$ (три решения), $a = -3$ (три решения), $a = 4$ (два решения), $a = 5$ (одно решение).

Используя рисунок, получаем, что система уравнений имеет четыре решения при $-5 < a < -4$ и $-4 < a < -3$.

Ответ: $-5 < a < -4$; $-4 < a < -3$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только включением точек $a = -5$ и / или $a = -3$	3
С помощью верного рассуждения получен промежуток $(-5; -3)$ множества значений a , возможно, с включением граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения дуг парабол и лучей (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задание 18.2

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3) \cdot \sqrt{x - y + 3} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Решение.

Каждое решение уравнения $(x^2 - 5x - y + 3) \cdot \sqrt{x - y + 3} = 0$ либо является решением уравнения $x - y + 3 = 0$, откуда $y = x + 3$, либо является решением системы:

$$\begin{cases} x^2 - 5x - y + 3 = 0, \\ x - y + 3 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 5x + 3, \\ y \leq x + 3; \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 5x + 3, \\ x^2 - 5x + 3 \leq x + 3; \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 5x + 3, \\ x^2 - 6x \leq 0, \end{cases}$$

откуда $y = x^2 - 5x + 3$ при условии $0 \leq x \leq 6$.

Для каждого из этих случаев подставим $y = 3x + a$ и найдём количество корней получившегося уравнения в зависимости от a .

Первый случай: $3x + a = x + 3$, откуда $x = \frac{3-a}{2}$.

Второй случай: $3x + a = x^2 - 5x + 3$ при условии $0 \leq x \leq 6$. Получаем квадратное уравнение $x^2 - 8x - a + 3 = 0$. Дискриминант этого уравнения равен $64 + 4(a - 3) = 4(a + 13)$. Значит, уравнение $x^2 - 8x - a + 3 = 0$ имеет два корня при $a > -13$, имеет единственный корень $x = 4$ при $a = -13$ и не имеет корней при $a < -13$.

При $a > -13$ функция $f(x) = x^2 - 8x - a + 3$ принимает наименьшее значение при $x = 4$, и это значение отрицательно. Следовательно, больший корень уравнения $f(x) = 0$ удовлетворяет условию $0 \leq x \leq 6$ тогда и только тогда, когда $f(6) \geq 0$; $-a - 9 \geq 0$, откуда $a \leq -9$.

Аналогично меньший корень уравнения $f(x) = 0$ удовлетворяет условию $0 \leq x \leq 6$ тогда и только тогда, когда $f(0) \geq 0$; $-a + 3 \geq 0$, откуда $a \leq 3$.

Число $\frac{3-a}{2}$ является корнем квадратного уравнения $f(x) = 0$

при $\left(\frac{3-a}{2}\right)^2 - 4(3-a) - a + 3 = 0$, откуда

$$\left(\frac{a-3}{2}\right)^2 + 3(a-3) = 0; (a-3)(a+9) = 0,$$

то есть при $a = 3$ и при $a = -9$.

Таким образом, исходная система уравнений имеет ровно два различных решения при $a = -13$; $-9 \leq a < 3$.

Ответ: $a = -13$; $-9 \leq a < 3$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только исключением / включением точек $a = -9$ и / или $a = 3$	3
С помощью верного рассуждения получен промежуток $(-9; 3)$ множества значений a , возможно, с включением граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения параболы и прямых (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задание 18.3

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$$

имеет ровно три различных корня.

Решение. Исходное уравнение равносильно уравнению $3x^2 + 2ax + 1 = (x^2 + ax + 1)^2$ при условии $x^2 + ax + 1 \geq 0$.

Решим уравнение $3x^2 + 2ax + 1 = (x^2 + ax + 1)^2$:

$$3x^2 + 2ax + 1 = x^4 + 2ax^3 + (a^2 + 2)x^2 + 2ax + 1; x^4 + 2ax^3 + (a^2 - 1)x^2 = 0;$$

$$x^2(x + a + 1)(x + a - 1) = 0, \text{ откуда } x = 0, x = 1 - a \text{ или } x = -1 - a.$$

Исходное уравнение имеет три корня, когда эти числа различны и для каждого из них выполнено условие $x^2 + ax + 1 \geq 0$.

Рассмотрим условия совпадения корней. При $a = 1$ имеем $1 - a = 0$. При $a = -1$ имеем $-1 - a = 0$. При остальных значениях a числа $0, 1 - a, -1 - a$ различны.

При $x = 0$ получаем: $x^2 + ax + 1 = 1 \geq 0$ при всех значениях a .

При $x = 1 - a$ получаем: $x^2 + ax + 1 = (1 - a)^2 + a(1 - a) + 1 = 2 - a$.

Это выражение неотрицательно при $a \leq 2$.

При $x = -1 - a$ получаем: $x^2 + ax + 1 = (-1 - a)^2 + a(-1 - a) + 1 = a + 2$.

Это выражение неотрицательно при $a \geq -2$.

Таким образом, исходное уравнение имеет ровно три различных корня при $-2 \leq a < -1; -1 < a < 1; 1 < a \leq 2$.

Ответ: $-2 \leq a < -1; -1 < a < 1; 1 < a \leq 2$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только исключением точек $a = -2$ и/или $a = 2$	3
С помощью верного рассуждения получен промежуток $(-2; 2)$ множества значений a , возможно, с включением граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Получены корни уравнения $3x^2 + 2ax + 1 = (x^2 + ax + 1)^2$: $x = 0, x = 1 - a, x = -1 - a$ и задача верно сведена к исследованию полученных корней при условии $x^2 + ax + 1 > 0$ ($x^2 + ax + 1 \geq 0$)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задание 18.4

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 - y - |x - 5y + 5| = 52, \\ y - 2 = a(x - 5) \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

Решение.

Изобразим на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют первому уравнению системы. Рассмотрим два случая:

1) Если $x - 5y + 5 \geq 0$, то получаем уравнение

$$\begin{aligned} x^2 + 5x + y^2 - y - x + 5y - 5 &= 52; \\ x^2 + 4x + y^2 + 4y - 57 &= 0; \\ (x + 2)^2 + (y + 2)^2 &= 65. \end{aligned}$$

Полученное уравнение задаёт окружность с центром в точке $O_1(-2; -2)$ и радиусом $\sqrt{65}$.

2) Если $x - 5y + 5 \leq 0$, то получаем уравнение

$$x^2 + 5x + y^2 - y + x - 5y + 5 = 52; \quad x^2 + 6x + y^2 - 6y - 47 = 0; \quad (x + 3)^2 + (y - 3)^2 = 65.$$


Полученное уравнение задаёт окружность с центром в точке $O_2(-3; 3)$ и радиусом $\sqrt{65}$.

Полученные окружности пересекаются в двух точках $A(-10; -1)$ и $B(5; 2)$, лежащих на прямой $x - 5y + 5 = 0$, поэтому в первом случае получаем дугу ω_1 с концами в точках A и B , во втором – дугу ω_2 с концами в тех же точках (см. рисунок).

Рассмотрим второе уравнение системы. Оно задаёт прямую m , которая проходит через точку B , и угловой коэффициент которой равен a .

При $a = \frac{1}{5}$ прямая m проходит через точки A и B , то есть исходная система имеет два решения.

При $a = -\frac{7}{4}$ прямая m перпендикулярна прямой O_1B , угловой коэффициент которой равен $\frac{4}{7}$, значит, прямая m касается дуги ω_1 в точке B и пересекает дугу ω_2 в двух точках (одна из которых – точка B), то есть исходная система имеет два решения.



При $a = 8$ прямая m перпендикулярна прямой O_2B , угловой коэффициент которой равен $-\frac{1}{8}$, значит, прямая m касается дуги ω_2 в точке B и пересекает дугу ω_1 в двух точках (одна из которых – точка B), то есть исходная система имеет два решения.

При $a < -\frac{7}{4}$ или $a > 8$ прямая m пересекает каждую из дуг ω_1 и ω_2 в точке B и ещё в одной точке, отличной от точки A , то есть исходная система имеет три решения.

При $-\frac{7}{4} < a < \frac{1}{5}$ прямая m пересекает дугу ω_2 в двух точках (одна из которых – точка B) и не пересекает дугу ω_1 в точках, отличных от точки B , то есть исходная система имеет два решения.

При $\frac{1}{5} < a < 8$ прямая m пересекает дугу ω_1 в двух точках (одна из которых – точка B) и не пересекает дугу ω_2 в точках, отличных от точки B , то есть исходная система имеет два решения.

Значит, исходная система имеет ровно два решения при $-\frac{7}{4} \leq a \leq 8$.

Ответ: $-\frac{7}{4} \leq a \leq 8$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только исключением точек $a = -\frac{7}{4}$ и/или $a = 8$	3
При всех значениях a верно найдено количество решений системы в одном из двух случаев, возникающих при раскрытии модуля ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения дуг окружностей и прямых (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задание 18.5

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{|3x| - 2x - 2 - a}{x^2 - 2x - a} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

Решение.

Корнями исходного уравнения являются корни уравнения $|3x| - 2x - 2 - a = 0$, для которых выполнено условие $x^2 - 2x - a \neq 0$.

При $x \leq 0$ уравнение $|3x| - 2x - 2 - a = 0$ принимает вид $-5x - 2 - a = 0$ и задаёт на плоскости Oxa луч l_1 с началом в точке $(0; -2)$. При $x \geq 0$ уравнение $|3x| - 2x - 2 - a = 0$ принимает вид $x - 2 - a = 0$ и задаёт луч l_2 с началом в точке $(0; -2)$. Значит, уравнение $|3x| - 2x - 2 - a = 0$ имеет два корня при $a > -2$, имеет один корень при $a = -2$ и не имеет корней при $a < -2$.

Уравнение $x^2 - 2x - a = 0$ задаёт параболу $a = x^2 - 2x$.

Координаты точек пересечения параболы $a = x^2 - 2x$ с лучом l_1 являются решениями системы:

$$\begin{cases} a = x^2 - 2x, \\ a = -5x - 2, \\ x \leq 0; \end{cases} \begin{cases} -5x - 2 = x^2 - 2x, \\ a = -5x - 2, \\ x \leq 0; \end{cases} \begin{cases} (x+1)(x+2) = 0, \\ a = -5x - 2, \\ x \leq 0. \end{cases}$$

Значит, парабола $a = x^2 - 2x$ пересекается с лучом l_1 в точках $(-1; 3)$ и $(-2; 8)$.

Координаты точек пересечения параболы $a = x^2 - 2x$ с лучом l_2 являются решениями системы:

$$\begin{cases} a = x^2 - 2x, \\ a = x - 2, \\ x \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x - 2 = x^2 - 2x, \\ a = x - 2, \\ x \geq 0; \end{cases} \begin{cases} (x-1)(x-2) = 0, \\ a = x - 2, \\ x \geq 0. \end{cases}$$

Значит, парабола $a = x^2 - 2x$ пересекается с лучом l_2 в точках $(1; -1)$ и $(2; 0)$.

Следовательно, условие $x^2 - 2x - a \neq 0$ выполнено для корней уравнения $|3x| - 2x - 2 - a = 0$ при всех a , кроме $a = -1$, $a = 0$, $a = 3$ и $a = 8$.

Таким образом, исходное уравнение имеет ровно два корня при $-2 < a < -1$; $-1 < a < 0$; $0 < a < 3$; $3 < a < 8$; $a > 8$.

Ответ: $-2 < a < -1$; $-1 < a < 0$; $0 < a < 3$; $3 < a < 8$; $a > 8$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только включением точки $a = -2$	3

Верно рассмотрен хотя бы один из случаев решения, и получено или множество значений a , отличающееся от искомого только включением точек $a = 8$, $a = 3$ и/или $a = -2$, или множество значений a , отличающееся от искомого только включением точек $a = 0$, $a = -1$ и/или $a = -2$,	2
ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения параболы и лучей (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Примеры оценивания решений задания 18

Пример 18.1.1

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = |x - a| - 4, \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

Ответ: $-5 < a < -4$; $-4 < a < -3$.

$$\boxed{18} \quad \begin{cases} y = |x - a| - 4 \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим отдельно 2-е ур-е:

$$1) \ y \geq 0: \quad 4y + x^2 + 8x = 0 \\ y = -\frac{1}{4}x^2 - 2x$$

$$\text{Вершина параболы: } x_0 = -\frac{b}{2a} = 2: \left(-\frac{1}{4}\right) = -4 \quad y_0 = \frac{1}{4} \cdot 16 - 8 = -4$$

$$y_0 = -\frac{1}{4} \cdot 16 + 8 = 4$$


$$2) \ y < 0: \quad -4y + x^2 + 8x = 0$$

$$y = \frac{1}{4}x^2 + 2x$$

$$x_0 = -2 \cdot \frac{1}{2} = -4$$

$$y_0 = \frac{1}{4} \cdot 16 - 8 = -4$$

Рисунок в осях XOY:



графические случаи
графика $y = |x - a| - 4$
Найдем a для них,
используя условие
касания функции и
прямой: $\begin{cases} f(x_0) = y(x_0) \\ f'(x_0) = y'(x_0) \end{cases}$

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} a - x_0 - 4 = \frac{1}{4}x_0^2 + 2x_0 \\ -1 = \frac{1}{2}x_0 + 2 \end{cases} \\ \begin{cases} x_0 = -6 \\ a = -5 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} x_0 - a - 4 = \frac{1}{4}x_0^2 + 2x_0 \\ 1 = \frac{1}{2}x_0 + 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0 = -2 \\ -2 - a - 4 = \frac{1}{4} \cdot 4 - 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x_0 = -2 \\ a = -3 \end{cases}$$

Таким образом, $y = |x + 5| - 4$

Таким образом, $y = |x + 3| - 4$

$\textcircled{3}$ Третьим случаем, когда модуль меняет знак в вершине параболы и остается 3 решения системы $y = |x + 4| - 4$, $a = -4$

$$a \in (-5; -4) \cup (-4; -3)$$

$$\text{Ответ: } a \in (-5; -4) \cup (-4; -3)$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ. В решении есть неточность в записи: при раскрытии модуля под 2) должно быть написано $y < 0$; фактически дальнейшие рассуждения проводятся при условии $y < 0$.

Оценка эксперта: 4 балла.

Пример 18.1.2

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = |x - a| - 4, \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

Ответ: $-5 < a < -4$; $-4 < a < -3$.

Задача 18
 $y = |x - a| - 4$ (1)
 $4|y| + x^2 + 8x = 0$ (2)

1) *Можно переписать уравнение параболы*
 2) *можно переписать уравнение параболы*

Или построим $y = -\frac{x^2}{4} - 2x$, "смотрим часть параболы выше оси y и отразим относительно оси y верхнюю часть".
 пересекает ось x в точках: $x^2 + 8x = 0$
 $x = 0$
 $x = -8$

x_0 - вершина параболы
 $x_0 = \frac{-6}{2 \cdot 1} = -\frac{3}{1} = -3$
 $y_0 = -2 \cdot (-3) + 8 = 4 + 8 = 12$
 $x_0 = \frac{-2}{\frac{1}{4}} = -8$
 $y_0 = -\frac{2}{4} + 2 \cdot (-8) = -0.5 - 16 = -16.5$
 $4 - 8 = -4$

(1) можно переписать
 $\begin{cases} x \geq a \\ y = x - a - 4 \end{cases}$
 $\begin{cases} x < a \\ y = x - 4 + a \end{cases}$
 Тогда график это "валка" с вершиной в точке $(a, -4)$.
 Коэффициенты наклона ветвей -1 и 1 .

2) Заметим, что (1) симметрична относительно прямой $x = -4$

3) Найдем проекции точки $(-8, 0)$ на левую ветвь $y = -x - 4 + a$ и на правую ветвь $y = x - a - 4$.
 $0 = -8 - 4 + a \Rightarrow a = 12$
 $0 = 8 - a - 4 \Rightarrow a = 4$
 - 3 пересечения с (1).

4) Найдём точку касания $y = -x + a - 4$ и $y = \frac{x^2}{a} + 2x$

$$x^2 + 8x = -4x + 4a - 16$$

$$x^2 + 12x + 16 - 4a = 0 \quad \text{Касание} \Rightarrow D = 0$$

$$D = 12^2 - 4 \cdot (16 - 4a) = 4^2(9 - 4 + a) = 4^2(5 + a) = 0$$

$$a = -5$$

5) Найдём касание параболы с правой ветвью $y = x - a$

$$x^2 + 8x = 4x - 4a - 16$$

$$x^2 + 4x + 4a + 16 = 0 \Rightarrow D = 0 = 4^2(1 + a - 4) = 4^2(-3 - a)$$

$$\Rightarrow a = -3$$

6) Найдём касание левой ветви с «верхней» параболой

$$-x^2 - 8x = -4x + 4a - 16$$

$$x^2 + 4x + 4a - 16 = 0 \quad D = 0$$

$$D = 4^2(1 - a + 4) = 0 \Rightarrow a = 5$$

7) Касание правой ветви с «верхней» параболой

$$-x^2 - 8x = 4x - 4a - 16 \Rightarrow D = 0 \quad (\text{касание})$$

$$x^2 + 12x - 4a - 16 = 0 \quad D = 4^2(9 + a + 4) = 4^2(a + 13) = 0$$

$$a = -13$$

8) Значит:

$a < -13$ — 0 решений

$a = -13$ — 1 реш.

$a \in (-13; -5)$ — 2 реш.

$a = -5$ — 3 реш.

$a \in (-5; -4)$ — 4 решения

$a = -4$ — 3 решения

$a \in (-4; -3)$ — 4 решения

$a = -3$ — 3 реш.

$a \in (-3; 5)$ — 2 решения

$a > 5$ — 0 реш.

значит искомый $a \in (-5; -4) \cup (-4; -3)$

ответ $(-5; -4) \cup (-4; -3)$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 4 балла.


Пример 18.1.3

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = |x - a| - 4, \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

Ответ: $-5 < a < -4$; $-4 < a < -3$.



Комментарий.

С помощью верного рассуждения получен промежуток $(-5; -3)$ множества значений a .

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 18.1.5

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = |x - a| - 4, \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

Ответ: $-5 < a < -4$; $-4 < a < -3$.

~ 18

$$\begin{cases} y = |x - a| - 4 \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases} \quad 4 \text{ решения}$$

$$\begin{cases} y = |x - a| - 4 & (1) \\ |y| = -\frac{1}{4}x^2 - 2x & (2) \end{cases}$$

Графиком функции является парабола, ветвями которой направлены вниз, а вершина находится на отрицательной полуоси Oy .

(1) - Семейство функций, графиком которых является "галочка" с вершинами, лежащими на прямой $y = -4$.

III Необходимо точно найти такие a , при которых график функции (1) касается между полупрямыми I и II или между полупрямыми IV и V.

$A(0; 0) \quad B(-4; 4) \quad C(-8; 0)$

Найдем при каких a график функции (1) проходит через B

$$4 = |-4 - a| - 4$$

$$|-4 - a| = 8 \Rightarrow -4 - a = 8 \quad -4 - a = -8$$

$$a = -12 \quad a = 4$$

При $a = 4$ график функции проходит через A, C, B , а при $a = -12$ через B, C . Найдем при каких a график функции (1) касается в то же время D и E

$$-\frac{1}{4}x^2 - 2x = |x - a| - 4$$

$$-\frac{1}{4}x^2 - 2x + 4 = |x - a|$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{4}x^2 - 2x + 4 = x - a & [x^2 + 8x - 16 = -4x + 4a] & [x^2 + 12x - 16 - 4a = 0] \\ -\frac{1}{4}x^2 - 2x + 4 = -x + a & [x^2 + 8x - 16 = 4x - 4a] & [x^2 + 4x - 16 + 4a = 0] \end{cases}$$

Требуется, чтобы графики касались $D = 0$

$$\begin{cases} D_1 = 0 & [144 + 4(16 + 4a) = 0] & [16a = -144 - 16] & [a = -34] & [a = -13] \\ D_2 = 0 & [16 + 4(16 - 4a) = 0] & [-44a = -16 - 4 \cdot 16] & [a = -14] & [a = 5] \end{cases}$$

При $a \in (-13; -12) \cup (4; 5)$ у системы 4 решения

Ответ: $(-13; -12) \cup (4; 5)$

Комментарий.

Задача неверно сведена к исследованию взаимного расположения дуг парабол и лучей (аналитически или графически)

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 18.2.1

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3) \cdot \sqrt{x - y + 3} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Ответ: $a = -13$; $-9 \leq a < 3$.

№ 18.

$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3) \sqrt{x - y + 3} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases}$ равно 2 р-ия.

Решим задачу численно.

Рассмотрим первое уравнение системы. Оно имеет смысл при $x - y + 3 \geq 0 \Leftrightarrow y \leq x + 3$.

Тогда имеем: $x^2 - 5x - y + 3 = 0$ или $\sqrt{x - y + 3} = 0$

$y = x^2 - 5x + 3$ — парабола, ветви вверх,

$\begin{matrix} x - y + 3 = 0 \\ y = x + 3 \end{matrix}$ — прямая

$x_0 = \frac{5}{2} = 2,5$ — вершина

$y_0 = 2,5^2 - 5 \cdot 2,5 + 3 = 6,25 - 12,5 + 3 = -3,25$ — парабола — $(2,5; -3,25)$

x	0	1	2	2,5	2	4	5
y	3	-1	-3	-3,25	-3	-1	3

$x = 2 \Rightarrow y = 2^2 - 5 \cdot 2 + 3 = 4 - 10 + 3 = -3$

$x = 1 \Rightarrow y = 1^2 - 5 \cdot 1 + 3 = 1 - 5 + 3 = -1$

$x = 0 \Rightarrow y = 0^2 - 5 \cdot 0 + 3 = 3$

Обратим внимание, что $y \leq x + 3$ гарантирует возможность по прямой $y = x + 3$

Рассмотрим 2-е ур. системы: $y = 3x + a$. Оно задает семейство прямых, параллельных $y = 3x$. Коэф. наклона = 3.

Построим график:

1) Найдем коэф. пересечения $y = x^2 - 5x + 3$ и $y = x + 3$:

$$\begin{aligned} x^2 - 5x + 3 &= x + 3 \\ x^2 - 6x &= 0 \\ x(x - 6) &= 0 \\ x = 0 \text{ или } x &= 6 \end{aligned}$$

Пусть:
 При $x=0$, $y = 0+3=3$ $A(0;3)$
 При $x=6$, $y = 6+3=9$ $B(6;9)$

2) Найдем, при каком a график $y = 3x+a$ пройдет через т. $A(0;3)$:

$$3 = 3 \cdot 0 + a \rightarrow a = 3$$

3) Найдем, при каком a график $y = 3x+a$ пройдет чпу т. $B(6;9)$:

$$9 = 3 \cdot 6 + a \rightarrow a = -9$$

4) Найдем, при каком a график $y = 3x+a$ будет касательной к параболе $y = x^2 - 5x + 3$

$$\begin{aligned} 3x+a &= x^2 - 5x + 3 \\ x^2 - 8x + (3-a) &= 0 \\ D &= 64 - 4(3-a) = 64 - 12 + 4a = 52 + 4a \end{aligned}$$

Т.к. $y = 3x+a$ касается параболу, то пересечение равно в 1 точке $\Rightarrow D=0$

$$\begin{aligned} 52 + 4a &= 0 \rightarrow a = -13 \\ 4a &= -52 \\ a &= -13 \end{aligned}$$

Рассмотрим, сколько корней имеет уравнен. система в зависимости от a :

$$\begin{aligned} a < -13 &\rightarrow 1 \text{ к. (пересек. } y = x+3) \\ a = -13 &\rightarrow 2 \text{ к. (пересек. } y = x+3 \text{ и касан. } y = x^2 - 5x + 3) \\ -13 < a < -9 &\rightarrow 3 \text{ к. (пересек. } y = x+3 \text{ и 2 пересек. с } y = x^2 - 5x + 3) \\ a = -9 &\rightarrow 2 \text{ к. (пересек. } y = x+3 \text{ и 2 пересек. с } y = x^2 - 5x + 3, \\ &\text{ но 2 из них совпадают в т. } A) \\ -9 < a < 3 &\rightarrow 2 \text{ к. (пересек. с } y = x+3 \text{ и 1 пересек. с } y = x^2 - 5x + 3) \\ a = 3 &\rightarrow 1 \text{ к. (пересек. с } y = x+3 \text{ и 1 пересек. с } y = x^2 - 5x + 3, \\ &\text{ но совпадают в т. } B). \\ a > 3 &\rightarrow 1 \text{ к. (пересек. с } y = x+3). \end{aligned}$$

Система имеет ровно 2 р-на, при $a \in \{-13\} \cup [-9; 3)$.

$$\text{Ответ: } a \in \{-13\} \cup [-9; 3).$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 4 балла.

Пример 18.2.2

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3) \cdot \sqrt{x - y + 3} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Ответ: $a = -13$; $-9 \leq a < 3$.

N 18

$$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3) \sqrt{x - y + 3} = 0 \\ y = 3x + a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (*) \quad & \sqrt{x - y + 3} \geq 0 \\ & x - y + 3 \geq 0 \\ & y \leq x + 3 \end{aligned}$$

1) $\begin{cases} x^2 - 5x - y + 3 = 0 \\ \sqrt{x - y + 3} = 0 \\ y = 3x + a \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 5x + 3 \\ x - y + 3 = 0 \\ y = 3x + a \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 5x + 3 & \text{①} \\ y = x + 3 & \text{②} \\ y = 3x + a & \text{③} \end{cases}$

2) построим график согласно заданной системе:

① $y = x^2 - 5x + 3$
 $x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{5}{2} = 2,5$
 $y_0 = 2,5^2 - 5 \cdot 2,5 + 3 = 6,25 - 12,5 + 3 = -3,25$
 $a > 0 \Rightarrow$ это график параболы с ветвями, направленными вверх

② $y = x + 3$ — линейная функция

3) нам подходят все значения x и y , лежащие ниже $y = x + 3$ по (*).

4) построим график ③ и определим значения a .

I в точке касания ① и ③ система имеет 2 решения; т.к. графики касаются друг друга, то их производные равны

$$\begin{aligned} y &= 3x + a & y &= x^2 - 5x + 3 \\ y' &= 3 & y' &= 2x - 5 \\ 3 &= 2x - 5 & \Rightarrow x &= 4 \\ y &= x^2 - 5x + 3 = 4^2 - 5 \cdot 4 + 3 = -1 \\ a &= y - 3x = -1 - 3 \cdot 4 = -13 \end{aligned}$$

II в точке пересечения ① и ② система имеет 2 решения, их значения равны

$$\begin{aligned} y &= x + 3 & y &= x^2 - 5x + 3 \\ x + 3 &= x^2 - 5x + 3 \\ x^2 - 6x &= 0 \\ x(x - 6) &= 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ тогда } y = x + 3 = 0 + 3 = 3 \\ x = 6 \text{ тогда } y = x + 3 = 6 + 3 = 9 \end{cases} \\ a &= y - 3x & a_1 &= 3 - 0 = 3 \\ & & a_2 &= 9 - 3 \cdot 6 = -9 \end{aligned}$$

или для любого значения a при дальнейшем перемещении $y = 3x + a$ вниз система имеет 1 решение.

Ответ: $a \in \{-13\} \cup [-9; 3)$

Комментарий.

Решение не является обоснованным, но получен промежуток $[-9; 3)$.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 18.2.3

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3) \cdot \sqrt{x - y + 3} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases} \text{ имеет ровно два различных решения.}$$

Ответ: $a = -13$; $-9 \leq a < 3$.

$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3) \sqrt{x - y + 3} = 0 \\ y = 3x + a \end{cases} \quad N18. \quad 2 \text{ реш. } a = ?$

$\begin{cases} y = 3x + a \\ \begin{cases} x^2 - 5x - y + 3 = 0 \\ x - y + 3 \geq 0 \\ x - y + 3 = 0 \\ y = 3x + a \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 5x + 3 \\ y \leq x + 3 \\ y = x + 3 \\ y = 3x + a \end{cases}$

Решим систему графически: $y = x^2 - 5x + 3$ - парабола
 $y = x + 3$ - прямая, $y = 3x + a$ - семейство прямых с условием коэф. $\neq 3$.

$D = 25 - 4 \cdot 3 = 13$ Нули параболы: $\frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}$ $y < \frac{5 + \sqrt{13}}{2} < 4,5$ $x_8 = 2,5$
 $0,5 < \frac{5 - \sqrt{13}}{2} < 1$ $y_8 = -3,25$

T_1 пересек. параболы и $y = x + 3$:
 $x^2 - 5x + 3 = x + 3$
 $x^2 - 6x = 0$
 $\begin{cases} x = 0 & (y = 3) \\ x = 6 & (y = 9) \end{cases}$

Прямая $y = 3x + a$ касается параболы в случае $D_1 = 0$.
 $x^2 - 5x + 3 = 3x + a$
 $x^2 - 8x + 3 - a = 0$
 $D_1 = 16 + a - 3 = 13 + a = 0 \quad a = -13$

Прямая $y = 3x + a$ имеет 2 точки пересечения с параболой при $a > -13$ и - при $a = -13$ и 0 - при $a < -13$.

С прямой $y = x + 3$ прямая $y = 3x + a$ всегда имеет 1 т. пересечения.
 $y = 3x + a$ проходит через $(0; 3)$ при $3 = 0 + a$, $a = 3$.
 через $(6; 9)$ при $9 = 6 \cdot 3 + a$, $a = -9$

При $a > 3$, 3 точки пересек. При $a = 3$, 2 т. пересечения.
 При $-9 < a < 3$, 3 точки пересечения. При $a = -9$, 2 т. пересечения.
 При $-13 < a < -9$, 3 точки пересечения. При $a = -13$, 2 т. пересечения.
 При $a < -13$, 1 точка пересечения.

Ответ: 3 ; -9 ; -13 .

Комментарий.

Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения параболы и прямых (аналитически или графически).

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 18.3.1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$ имеет ровно три различных корня.

Ответ: $-2 \leq a < -1$; $-1 < a < 1$; $1 < a \leq 2$.

$$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1 \Leftrightarrow \sqrt{3\left(x^2 + 2\frac{a}{3}x + \frac{1}{3}\right)} = x^2 + \frac{a}{2}x + 2 + 1 \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{3\left(x + \frac{a}{3}\right)^2 + 1 - \frac{a^2}{3}} = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + 1 - \frac{a^2}{4}; \text{ пусть } t(x) = \sqrt{3\left(x + \frac{a}{3}\right)^2 + 1 - \frac{a^2}{3}};$$

$$f(x) = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + 1 - \frac{a^2}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ 3x^2 + 2ax + 1 = (x^2 + ax + 1)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ 3x^2 + 2ax + 1 = x^2 + 2ax + 1 + x^2 + 2ax + x^2 + 2a^2 - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x^2(x^2 + 2ax + 2 + a^2 - 3) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x^2(x^2 + 2ax + a^2 - 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \begin{cases} x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \end{cases} \end{cases} \quad (*)$$

Для того чтобы система имела 3 различных решения, необходимо, чтобы (1) имело 2 ^{различных} решения не равных 0 и удовлетворяющих (2), пусть $g(x) = x^2 + 2ax + a^2 - 1$
 $f(x) = x^2 + ax + 1$; $f'(x) = 2x + a \Rightarrow g(0) = 0 \Leftrightarrow a^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ a = -1 \end{cases}$ ^{и $a = -1$ не подходит}

Заметим, что (1) $\Leftrightarrow x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (x+a)^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (x+a-1)(x+a+1) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1-a \\ x = -1-a \end{cases}$; тогда (*) $\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \\ x = 1-a \\ x = -1-a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \begin{cases} 1 - 2a + a^2 + a - a^2 + 1 \geq 0 \\ x = 1-a \\ 1 + 2a + a^2 - a - a^2 + 1 \geq 0 \\ x = -1-a \end{cases} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \begin{cases} a \in \mathbb{R} \setminus \{2\} \\ x = 1-a \\ a \geq -2 \end{cases} \end{cases}$ три различных решения системы имеет тогда
 (3) и (4) имеют различные, не равные нулю решения; ^{важно} каждый, при каких a обладают корни 3 и 4:
 $1-a = -1-a \Leftrightarrow 1 = -1 \Rightarrow$ таких a не существует. (3) имеет реш. равное 0 при $a = -1$ - не подходит, (4) имеет реш. = 0 при $a = 1$ - не подходит.
 (3) имеет реш. при $a \geq -2$; (4) имеет реш. при $a \leq 2 \Rightarrow$ (3) и (4) имеют различные реш., отлич. от 0 при $a \in [-2; 2]$ и $a \neq \pm 1$

Ответ: $a \in [-2; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; 2]$

Комментарий.
 Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 4 балла.

Пример 18.3.2

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$ имеет ровно три различных корня.

Ответ: $-2 \leq a < -1$; $-1 < a < 1$; $1 < a \leq 2$.

$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$

Заранее корни

Возможны ситуации

(1) имеет 2 корня
(2) имеет 1 корень

(1) имеет 1 корень
(2) имеет 2 корня

① $x^2 + ax + 1 < 0$
нет решений

② $x^2 + ax + 1 = 0$ (1)
тогда $3x^2 + 2ax + 1 = 0$ (2)

(1) $x^2 + ax + 1 = 0$
 $D > 0 \quad a^2 - 4 > 0$
 $(a-2)(a+2) > 0$

(2) $3x^2 + 2ax + 1 = 0$
 $D/4 = a^2 - 3 = 0$
 $a^2 = 3$
 $a = \pm\sqrt{3}$

или $a = \pm\sqrt{3}$ и в (1) не $> 0 \Rightarrow a \neq \pm\sqrt{3}$

(1) $x^2 + ax + 1 = 0$
 $D = 0 \quad a^2 - 4 = 0$
 $a = \pm 2$

$x_2 = \frac{-a}{2}$

(2) $3x^2 + 2ax + 1 = 0$
 $D/4 = a^2 - 3 > 0$
 $(a-\sqrt{3})(a+\sqrt{3}) > 0$ или
 $a > \sqrt{3}$ или $a < -\sqrt{3}$

$x_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 3}}{3}$

$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-3}}{3} = \frac{-2 \pm 1}{3}$ корни различные

аналогично при $a = -2$

или $a = -1$

$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4-3}}{3}$ $x_1 = \frac{2+1}{3}$ $x_2 = \frac{2-1}{3}$

$x_3 = 1$ $x_1 = x_3$ $a = -2$ не подходит

③ $x^2 + ax + 1 > 0$
 $3x^2 + 2ax + 1 = x^2 + a^2x^2 + 1 + 2ax^3 + 2x^2 + 2ax$

или $a = \pm 2$

или, возможно

продолжение

③ $x^4 + a^2 x^2 - x^2 + 2ax^3 = 0$

параметр вычитается
 $x^2 + ax + 1 > 0$ (*) перво от скобочкой

$x^2 / (x^2 + a^2 - 1 + 2ax) = 0$ ~~или два~~

$x \neq 0$
 - корни, которые x_1 и x_2 являются неравными от параметра a

$x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0$

параметр вычитается и $a^2 - 1 > 0$ ~~или два~~
 $a^2 - a^2 + 1 > 0$ ~~или два~~

$x_{1,2} = \frac{-a \pm 1}{1}$

$x_1 = -a + 1$ $x_2 = -a - 1$

$x_1 \neq x_2$ $-a + 1 \neq -a - 1$
 $1 \neq -1$ верно для любого a

$x_1 \neq x_3$

$-a + 1 \neq 0$
 $a \neq 1$

$-a - 1 \neq 0$
 $a \neq -1$

(*) $x_1 = -a + 1$

параметр вычитается $x_2 = -a - 1$
 или не-ва

$(-a+1)^2 + a(-a+1) + 1 > 0$ (и при x_1)
 $(-a-1)^2 + a(-a-1) + 1 > 0$ (и при x_2)

$(1-a)^2 - a^2 + a + 1 > 0$

$(a+1)^2 - a^2 - a + 1 > 0$

$1 - 2a + a^2 - a^2 + a + 1 > 0$

$a^2 + 2a + 1 - a^2 - a + 1 > 0$

$2 - a > 0$


$a + 2 > 0$

$a < 2$

$a > -2$

знаки x_1 и x_2 ~~или два~~

$a \in (-2; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; 2)$



Ответ: $(-2; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; 2)$

Комментарий.

В решении присутствуют все этапы. Решение соответствует критерию на 3 балла: с помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только исключением точек $a = -2$ и/или $a = 2$.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 18.3.3

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$ имеет ровно три различных корня.

Ответ: $-2 \leq a < -1$; $-1 < a < 1$; $1 < a \leq 2$.

$$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$$

$$\begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ 3x^2 + 2ax + 1 = x^4 + a^2x^2 + 1 + 2x^2 + 2ax^3 + 2ax \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x^4 + a^2x^2 - x^2 + 2ax^3 + 2ax = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x^2(x^2 + a^2 - 1 + 2ax) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x^2 = 0 \\ x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Уравнение имеет решение, когда $x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0$ имеет 2 корня и они удовлетворяют неравенству $x^2 + ax + 1 \geq 0$.

$$x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0$$

$$(x + a)^2 - 1 = 0$$

$$(x + a - 1)(x + a + 1) = 0$$

$$\begin{cases} x = -a + 1 \\ x = -a - 1 \end{cases}$$

Сформируем x в $x^2 + ax + 1 \geq 0$.

$$1) (-a+1)^2 + a(-a+1) + 1 \geq 0 \quad 2) (-a-1)^2 + a(-a-1) + 1 \geq 0$$

$$a^2 - 2a + 1 - a^2 + a + 1 \geq 0 \quad a^2 + 2a + 1 - a^2 - a + 1 \geq 0$$

$$-a + 2 \geq 0 \quad a \leq 2 \quad 2a + 2 \geq 0$$

$$a \in [-1, 2] \quad a \geq -1$$

Найдем значения x , когда они совпадают;

Замечание

$$1) -a + 1 = -a - 1 \quad 1) \text{ - нет решений}$$

$$2) 0 = -a + 1 \quad 2) a = 1$$

$$3) 0 = -a - 1 \quad 3) a = -1$$

} - вымарываем эти точки

$$a \in (-1, 1) \cup (1, 2]$$

иначе

Ответ: $(-1, 1) \cup (1, 2]$. Уравнение имеет 3 разл. корня.

Комментарий.

Решение логично, все шаги присутствуют, но при решении неравенства в пункте 2 допущена ошибка вычислительного характера, что соответствует критерию на 2 балла.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 18.3.4

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$ имеет ровно три различных корня.

Ответ: $-2 \leq a < -1$; $-1 < a < 1$; $1 < a \leq 2$.

$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$ (1); a^{-1} ур-е имеет 3 различных корня

1) ОДЗ: $x^2 + ax + 1 \geq 0$

$x^2 + ax + 1 = 0$; $x^2 + ax + 1 > 0$, если $D \leq 0$, так как тогда парабола будет располагаться так, как на рисунках (а) или (б)

$D = a^2 - 4$

ветви параболы вверх так как коэф. при x^2 равен $1 > 0$

$D \leq 0 \Rightarrow a^2 - 4 \leq 0$; $(a-2)(a+2) \leq 0$

$\Rightarrow a \in [-2; 2]$ (*)

2) ~~при~~ при $a \in [-2; 2]$ возведем обе части уравнения в квадрат, тогда

$3x^2 + 2ax + 1 = (x^2 + ax + 1)^2$

$3x^2 + 2ax + 1 = (x^2 + ax)^2 + 2(x^2 + ax) + 1$

$3x^2 + 2ax + 1 = x^4 + 2ax^3 + a^2x^2 + 2x^2 + 2ax + 1$

$x^4 + 2ax^3 + (a^2 + 2 - 3)x^2 = 0$

$x^2 \cdot (x^2 + 2ax + a^2 - 1) = 0$

$\begin{cases} x = 0 \\ x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \end{cases}$ (тобы уравнение имело ровно 3 различных корня нулю, чтобы $x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0$ имело ровно 2 корня, отличные от нуля)

$x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0$ (**)

$\frac{D}{4} = a^2 - a^2 + 1 = 1 \Rightarrow x_{1,2} = -a \pm 1$

$x_1 \neq x_2$, т.к. $-a + 1 \neq -a - 1 \Rightarrow 1 \neq -1$ - не верно

\rightarrow уравнение (**) имеет 2 различных корня при $\forall a$ из ОДЗ

\rightarrow уравнение (1) имеет 3 различных корня при $\forall a$ из ОДЗ, то есть $a \in [-2; 2]$

Ответ: $a \in [-2; 2]$

Комментарий.

Получены корни уравнения $x = 0$, $x = 1 - a$, $x = -1 - a$ и задача сведена к исследованию полученных корней при условии $x^2 + ax + 1 \geq 0$ (есть только указание).

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 18.4.1

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 - y - |x + 5y + 5| = 52, \\ y - 2 = a(x - 5) \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

Ответ: $-8 \leq a \leq \frac{7}{4}$.


$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 + y - |x + 5y + 5| = 52 \\ y + 2 = a(x - 5) \end{cases}$$

Рассмотрим 2 случая при $x + 5y + 5 \geq 0$ и при $x + 5y + 5 < 0$

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 + y - x - 5y - 5 = 52 \\ x + 5y + 5 \geq 0 \\ x^2 + 5x + y^2 + y + x + 5y + 5 = 52 \\ x + 5y + 5 < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x+2)^2 + (y-2)^2 = 65 & \text{65 - графиком ф-ии является окр. с центром } (-2; 2) \text{ и } r = \sqrt{65} \\ y \geq -\frac{x}{5} - 1 \\ (x+5)^2 + (y+3)^2 = 65 & \text{65 - графиком ф-ии является окр. с центром } (-3; -3) \text{ и } r = \sqrt{65} \\ y \leq -\frac{x}{5} - 1 \end{cases}$$

Построим \checkmark *эскизы графиков.*



Рассмотрим $y + 2 = a(x - 5)$.

$y = a(x - 5) - 2$. - графиком ф-ии является множество прямых, проходящих через точку $(5; -2)$. Тогда, для касания окр. $(-3; -3; \sqrt{65})$

" a " должно быть равно -8 , а для касания окр. $(-2; 2; \sqrt{65})$, " a " должно быть равно $\frac{7}{4}$.

при $a \in [-8; \frac{7}{4}]$ сис-ма имеет 2 корня.

при $a \in (-\infty; -8) \cup (\frac{7}{4}; +\infty)$ сис-ма имеет 3 корня.

Ответ: $a \in [-8; \frac{7}{4}]$.

Комментарий.

Решение и ответ верные, хотя нет обоснования, почему для касания a « a должно быть равно -8 » или «... $7/4$ ».

Оценка эксперта: 4 балла.

Пример 18.4.2

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 - y - |x + 5y + 5| = 52, \\ y - 2 = a(x - 5) \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

Ответ: $-8 \leq a \leq \frac{7}{4}$.

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 - y - |x + 5y + 5| = 52 & (1) \\ y - 2 = a(x - 5) & (2) \end{cases}$$

$$(1) \begin{cases} x + 5y + 5 \geq 0 \\ \begin{cases} x^2 + 5x + y^2 + y - x - 5y - 5 = 52 \\ y < \frac{-x-5}{5} \end{cases} \\ x^2 + 5x + y^2 + y + x + 5y + 5 = 52 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq \frac{-x-5}{5} \\ \begin{cases} x^2 + 4x + y^2 - 4y = 57 \\ y < \frac{-x-5}{5} \end{cases} \\ x^2 + 6x + y^2 + 6y = 47 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y \geq \frac{-x-5}{5} & (1.1) \\ (x+2)^2 + (y-2)^2 = 65 - \text{ур-е окр-ти с центром в т. } Q(-2; 2) \text{ и } R_1 = \sqrt{65} \\ y < \frac{-x-5}{5} & (1.2) \\ (x+3)^2 + (y+3)^2 = 65 - \text{ур-е окр-ти с центром в т. } P(-3; -3) \text{ и } R_2 = R_1 = \sqrt{65} \end{cases}$$

$$(1.1) \begin{cases} y \geq \frac{-x-5}{5} \\ (x+2)^2 + (y+2)^2 = 65 \end{cases}$$

т перес с прямой $y = \frac{-x-5}{5}$

$$(x+2)^2 + \left(\frac{-x-5}{5} - 2\right)^2 = 65$$

$$(x+2)^2 + \left(\frac{-(x+5)-10}{5}\right)^2 = 65$$

$$(x+2)^2 + \frac{(x+5+10)^2}{25} = 65$$

$$(x+2)^2 + \frac{(x+15)^2}{25} = 65$$

$$x^2 + 4x + 4 + \frac{x^2 + 30x + 225}{25} = 65$$

$$25x^2 + 100x + 100 + x^2 + 30x + 225 - 65 \cdot 25 = 0$$

$$26x^2 + 130x - 1300 = 0$$

$$2x^2 + 10x - 100 = 0$$

$$x^2 + 5x - 50 = 0$$

$$D = 25 + 200 = 225$$

$$x_1 = \frac{-5 + 15}{2} = 5, \quad y_1 = \frac{-5-5}{5} = -2$$

$$x_2 = \frac{-5-15}{2} = -10, \quad y_2 = \frac{10-5}{5} = 1$$

$$1. 2.) \quad \begin{cases} y < -\frac{x-5}{5} \\ (x+3)^2 + (y+3)^2 = 65 \end{cases}$$

и через центр $y = -\frac{x-5}{5}$

$$(x+3)^2 + \left(\frac{x+5}{5}\right)^2 = 65$$

$$25x^2 + 6 \cdot 25x + 9 \cdot 25 + (x+5)^2 - 65 \cdot 25 = 0$$

$$26x^2 + 150x + 225 - 20x + 100 - 1625 = 0$$


$$26x^2 + 130x - 1300 = 0$$

$$x^2 + 5x - 50 = 0$$

$$x_3 = x_1 = 5, \quad y_3 = y_1 = -2$$

$$x_4 = x_2 = -10, \quad y_4 = y_2 = 1$$

(2) $y = a(x-5) - 2$ - уравнение прямой, проходящей через $A(5; -2)$ и параллельной касательной



при $a = 0$ - 2 реш. 8

найдем a , при к-м $y = a(x-5) - 2$ касается окруж. и с ω . в т Q

$$(x+3)^2 + (a(x-5) - 2 - 3)^2 = 65$$

$$x^2 + 4x + 4 + (a(x-5) - 4)^2 = 65$$

$$x^2 + 4x + 4 + a^2(x-5)^2 - 8a(x-5) + 16 - 65 = 0$$

$$x^2 + 4x + a^2(x^2 - 10x + 25) - 8ax + 40a - 45 = 0$$

$$x^2 + a^2 x^2 + x(4 - 10a^2 - 8a) + 25a^2 + 40a - 45 = 0$$

$$\frac{D}{4} = (2 - 5a^2 - 4a)^2 - (a^2 + 1)(25a^2 + 40a - 45) =$$

$$(5a^2 + 4a - 2)^2 - (a^2 + 1)(25a^2 + 40a - 45) = 0 \text{ и находим наибольшее}$$

$$25a^4 + 40a^3 + 16a^2 - 20a^2 - 16a + 4 - 25a^4 - 40a^3 + 45a^2 - 25a^2 - 40a + 45 = 16a^2 - 40a + 45 - 16a + 4 =$$

$$16a^2 - 56a + 49 = 0 \text{ (т.к. ур-е должно иметь е-е реш-е)}$$

$$16a^2 - 56a + 49 = 0$$

$$\frac{D}{4} = 28^2 - 16 \cdot 49 = 0$$

$$(4a - 7)^2 = 0$$

при $a = \frac{7}{4}$ - 3 р-я

при $a > \frac{7}{4}$ - 3 р-я, при $a \in (0; \frac{7}{4})$ - 2 р-я

найдем a , при к-х $y = a(x-5) - 2$ кас. окружн с Γ в т р

$$x^2 + 6x + (a(x-5) - 2)^2 + 6(a(x-5) - 2) - 47 = 0$$

$$x^2 + 6x + a^2(x-5)^2 - 4a(x-5) + 4 + 6a(x-5) - 12 - 47 = 0$$

$$x^2 + 6x + a^2(x^2 - 10x + 25) - 4ax + 20a + 6ax - 30a - 55 = 0$$

$$x^2(1 + a^2) + 6x - 10a^2x + 25a^2 + 2ax - 10a - 55 = 0$$

$$x^2(a^2 + 1) + x(6 - 10a^2 + 2a) + 25a^2 - 10a - 55 = 0$$

$$\frac{D}{4} = (3 + a - 5a^2)^2 - (a^2 + 1)(25a^2 - 10a - 55) =$$

$$= 9 + 6(4 - 5a^2) + (a - 5a^2)^2 - 25a^4 + 10a^3 + 55a^2 -$$

$$- 25a^2 + 10a + 55 = \cancel{6a^2 - 30a^2} 25a^4 - 10a^3 + a^2 + 6a - 50a^2 +$$

$$+ 9 - \cancel{25a^4} + \cancel{10a^3} + \cancel{55a^2} - 25a^2 + 10a + 55 = a^2 + 16a + 64$$

$$a^2 + 16a + 64 = 0 \text{ (т.к. ур-е должно иметь е-е реш-е)}$$

$$(a + 8)^2 = 0$$

при $a = -8$ - 3 р-я

при $a < -8$ - 3 р-я, при $a \in (-8; 0)$ - 2 р-я

Ответ: 2 р-я при $a \in (-8; 0) \cup (0; \frac{7}{4})$ и 0 р-я, т.е. при $a \in (-8; \frac{7}{4})$

Комментарий.

Ход решения ясен, изложен более чем подробно. Ошибок нет, кроме недочёта: концы промежутка не включены в ответ.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 18.5.1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение


$$\frac{|3x| - 2x - 2 - a}{x^2 - 2x - a} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

Ответ: $-2 < a < -1$; $-1 < a < 0$; $0 < a < 3$; $3 < a < 8$; $a > 8$.

$$\frac{|3x| - 2x - 2 - a}{x^2 - 2x - a} = 0$$

имеет ровно 2 различных корня $a = ?$



1) $a = |3x| - 2x - 2 \Rightarrow$
 $a = \begin{cases} x - 2, & x \geq 0 \\ -5x - 2, & x < 0 \end{cases}$
 2) $a = x^2 - 2x$

при $x < 0$:

$$a = -5x - 2 = x^2 - 2x$$

$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$x_1 = -1$$

$$x_2 = -2$$

, x_1 и x_2 точки пересечения двух графиков
 при $a(x_1)$ и $a(x_2)$ уравнение будет

иметь только одно решение.

при $x \geq 0$

$$x - 2 = x^2 - 2x \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow x_3 = 1, x_4 = 2; \text{ При}$$

$a(x_3)$ и $a(x_4)$ будет только одно решение \Leftrightarrow ;

$\Rightarrow a(x_1) = 3, a(x_2) = 8, a(x_3) = -1, a(x_4) = 0$, в точке

$a = -2$ уравнение также будет иметь только одно решение, при $a < -2$ решений не будет $\Rightarrow a > -2, a \neq -1, a \neq 0, a \neq 3, a \neq 8 \Rightarrow$

$$\Rightarrow a \in (-2; -1) \cup (-1; 0) \cup (0; 3) \cup (3; 8) \cup (8; +\infty).$$

Ответ: $a \in (-2; -1) \cup (-1; 0) \cup (0; 3) \cup (3; 8) \cup (8; +\infty)$.

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 4 балла.

Пример 18.5.2

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{|3x| - 2x - 2 - a}{x^2 - 2x - a} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

Ответ: $-2 < a < -1$; $-1 < a < 0$; $0 < a < 3$; $3 < a < 8$; $a > 8$.

$\frac{|3x| - 2x - 2 - a}{x^2 - 2x - a} = 0$. Если знаменатель не равен нулю, то на него можно сократить.

$$|3x| - 2x - 2 - a = 0$$

возведем уравнение в квадрат.

$$(|3x|)^2 = (2x + 2 + a)^2$$


$$5x^2 + x(-8 - 4a) - 4a^2 - a^2 - 4 = 0$$

$$D = (-8 - 4a)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-a^2 - 4a - 4) = a^2 + 4a + 4.$$

Чтобы уравнение имело 2 решения D должен быть > 0

$$a^2 + 4a + 4 > 0$$

$$(a + 2)^2 > 0$$



$$\Rightarrow a \in (-\infty; -2); (2; +\infty).$$

теперь разберёмся с ОДЗ,

$x^2 - 2x - a \neq 0$. \Rightarrow Как не подходят варианты, когда $x^2 - 2x - a = 0$ (если $x^2 - 2x - a = 0$ уравнение имеет менее одного корня)

$$D = 4 + 4a.$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4a}}{2} = 1 \pm \sqrt{1 + a}.$$

Если $a \in (-\infty; -2)$, то $x^2 - 2x - a \neq 0$

Если $a \in (2; +\infty)$, то $x^2 - 2x - a = 0 \Rightarrow$

$a \in (2; +\infty)$ не подходит.

Ответ: $a \in (-\infty; -2)$.

Комментарий.

Неверное решение уравнения, содержащего переменную под знаком модуля. Неверная логика исследования количества корней.

Оценка эксперта: 0 баллов.

7. Критерии проверки и оценка решений заданий 19

Задание 19 проверяет достижение следующих целей изучения математики на профильном уровне: «развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности».

При этом, для решения этой задачи не требуется никаких знаний, выходящих за рамки школьного курса.

Условие задания 19 разбито на пункты – ряд подзадач (частных случаев), последовательно решая которые, можно в итоге полностью выполнить задание. Такое разбиение, в первую очередь, облегчает участнику экзамена планирование работы над данной задачей, а также позволяет более чётко и прозрачно провести оценивание выполнения задания.

Задача 19 (демонстрационный вариант ЕГЭ 2025 г.)

Из пары натуральных чисел $(a; b)$, где $a > b$, за один ход получают пару $(a + b; a - b)$.

а) Можно ли за несколько таких ходов получить из пары $(100; 1)$ пару, большее число в которой равно 400?

б) Можно ли за несколько таких ходов получить из пары $(100; 1)$ пару $(806; 788)$?

в) Какое наименьшее a может быть в паре $(a; b)$, из которой за несколько ходов можно получить пару $(806; 788)$?

Решение. а) Из пары $(100; 1)$ за один ход получается пара $(101; 99)$, за два хода получается пара $(200; 2)$, за три хода получается пара $(202; 198)$, а за четыре хода получается пара $(400; 4)$.

б) Заметим, что за один ход из пары $(a; b)$ получается пара $(a + b; a - b)$, а за два хода получается пара $(2a; 2b)$. Следовательно, из пары $(100; 1)$ можно получить только пары $(2^k \cdot 100; 2^k)$ и $(2^k \cdot 101; 2^k \cdot 99)$, где k — неотрицательное целое число.

Число 806 не равно $2^k \cdot 100$ и $2^k \cdot 101$, а значит, пару $(806; 788)$ невозможно получить за несколько ходов из пары $(100; 1)$.

в) Заметим, что пару $(c; d)$ за один ход можно получить только из пары $\left(\frac{c+d}{2}; \frac{c-d}{2}\right)$ при условии, что числа c и d одной чётности.

Таким образом, пара $(806; 788)$ получается из пары $(797; 9)$, которая получается из пары $(403; 394)$. Пару $(403; 394)$ невозможно получить за один ход ни из какой пары, поскольку числа 403 и 394 имеют разную чётность. Следовательно, наименьшее число a в паре $(a; b)$, из которой за несколько ходов можно получить пару $(806; 788)$, равно 403.

Ответ: а) да; б) нет; в) 403.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах <i>a</i> , <i>б</i> и <i>в</i>	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>в</i> и обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> или <i>б</i>	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах <i>a</i> и <i>б</i> ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>в</i>	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> или <i>б</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задание 19.1

В порту имеются только заполненные контейнеры, масса каждого из которых равна 20 тонн или 60 тонн. В некоторых из этих контейнеров находится сахарный песок. Количество контейнеров с сахарным песком составляет 75 % от общего количества контейнеров.

а) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 80 % от общей массы всех контейнеров?

б) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 40 % от общей массы всех контейнеров?

в) Какую наибольшую долю (в процентах) может составить масса контейнеров с сахарным песком от общей массы всех контейнеров?

Решение.

а) Если в порту всего два контейнера массой 20 тонн и шесть контейнеров массой 60 тонн, причём один контейнер массой 20 тонн и пять контейнеров массой 60 тонн заполнены сахарным песком, то количество контейнеров с сахарным песком составляет 75 % от общего количества контейнеров. Масса контейнеров с сахарным песком равна 320 тонн, а масса всех контейнеров равна 400 тонн, а значит, масса контейнеров с сахарным песком составляет 80 % от общей массы всех контейнеров.

б) Предположим, что в порту было m контейнеров массой 20 тонн и n контейнеров массой 60 тонн, среди которых с сахарным песком было a контейнеров массой 20 тонн и b контейнеров массой 60 тонн. Если масса контейнеров с сахарным песком составляет 40 % от общей массы контейнеров, то должна выполняться система уравнений:

$$\begin{cases} a + b = 0,75(m + n), & \begin{cases} 4a + 4b = 3m + 3n, \\ 4a + 4b = 3m + 3n, \end{cases} \\ 20a + 60b = 0,4(20m + 60n); & \begin{cases} 20a + 60b = 8m + 24n; \\ -12a + 28b = -16m. \end{cases} \end{cases}$$

Из равенства $-12a + 28b = -16m$ получаем $m + 3(m - a) + 7b = 0$.

Поскольку $b \geq 0$ и $m \geq a \geq 0$, это равенство может выполняться только при $m = b = a = 0$. Из системы уравнений следует, что $n = 0$. Получили: $m = b = a = n = 0$, что невозможно. Следовательно, масса контейнеров с сахарным песком не может составить 40 % от общей массы контейнеров.

в) Масса контейнеров с сахарным песком будет составлять наибольшую долю от массы всех контейнеров в случае, когда масса каждого контейнера с сахарным песком равна 60 тонн, а масса каждого контейнера без сахарного песка равна 20 тонн. Если обозначить количество контейнеров с сахарным песком через $3c$, то их масса равна $180c$ тонн, количество контейнеров без сахарного песка равно c , а их масса равна $20c$ тонн. Таким образом, общая масса всех контейнеров равна $200c$ тонн, а значит, масса контейнеров с сахарным песком составляет 90 % от этой массы.

Ответ: а) да; б) нет; в) 90.

Задание 19.2

В классе больше 10, но не больше 26 учащихся, а доля девочек не превышает 21 %.

- а) Может ли в этом классе быть 5 девочек?
б) Может ли доля девочек составить 30 %, если в этот класс придёт новая девочка?
в) В этот класс пришла новая девочка. Доля девочек в классе составила целое число процентов. Какое наибольшее число процентов может составить доля девочек в классе?

Решение.

а) Если в классе 25 учащихся, среди которых 5 девочек, то их доля составляет 20 %, что не превышает 21 %.

б) Если доля девочек в классе составила 30 %, то количество учащихся в нём делится на 10. Следовательно, после появления новой девочки в классе стало 20 учащихся, среди которых 6 девочек. Значит, до появления новой девочки в классе было 19 учащихся, среди которых было 5 девочек. В этом случае доля девочек превышает 21 %. Следовательно, доля девочек не может составить 30 %.

в) Пусть в классе было b учащихся, среди которых a девочек. Тогда, по условию, выполнены неравенства $10 < b \leq 26$ и $\frac{a}{b} \leq 0,21$. Следовательно,

$$\frac{a+1}{b+1} < \frac{a+1}{b} = \frac{a}{b} + \frac{1}{b} < \frac{a}{b} + 0,1 \leq 0,31,$$

а значит, после появления новой девочки в классе доля девочек будет меньше 31 %. В пункте б) было доказано, что эта доля не может составить 30 %.

После появления новой девочки в классе доля девочек в процентах составляет $\frac{100(a+1)}{b+1}$

. Предположим, что это число целое. Если оно не делится на 4 и не делится на 5, то число $b+1$ должно делиться на 50. Это невозможно, поскольку $b+1 \leq 27$. Будем последовательно рассматривать числа, меньшие 30, делящиеся на 4 или на 5.

Если $\frac{100(a+1)}{b+1} = 28$, то $25(a+1) = 7(b+1)$. Учитывая, что $b+1 \leq 27$, получаем:

$b = 24$, $a = 6$. В этом случае $\frac{a}{b} = 0,25 > 0,21$.

Если $\frac{100(a+1)}{b+1} = 25$, то $4(a+1) = b+1$. Для чисел $a = 2$ и $b = 11$ это равенство

верно, $10 < b \leq 26$ и $\frac{a}{b} = \frac{2}{11} < 0,2 \leq 0,21$.

Таким образом, после появления новой девочки в классе наибольшая целая доля девочек в процентах составляет 25.

Ответ: а) да; б) нет; в) 25.

Задание 19.3

В последовательности $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$, состоящей из целых чисел, $a_1 = 1, a_n = 235$

. Сумма любых двух соседних членов последовательности равна 3, 5 или 25.

- а) Приведите пример такой последовательности.
- б) Может ли такая последовательность состоять из 1000 членов?
- в) Из какого наименьшего числа членов может состоять такая последовательность?

Решение.

а) Например, последовательность $1, 2, 3, 0, 5, -2, 7, -4, \dots, 233, -230, 235$

удовлетворяет условию задачи (чередуются суммы чисел 3 и 5).

б) Поскольку 3, 5 и 25 – нечётные числа, любые два соседних члена последовательности имеют разную чётность. На нечётных местах должны стоять нечётные числа, а на чётных – чётные. Число 235 нечётное, поэтому оно не может стоять на чётном месте. Значит, последовательность не может состоять из 1000 членов.

в) Рассмотрим три члена последовательности: a_k, a_{k+1}, a_{k+2} ($1 \leq k \leq n-2$).

Поскольку $a_k + a_{k+1} \geq 3, a_{k+1} + a_{k+2} \leq 25$, получаем: $a_{k+2} \leq a_k + 22$.

В предыдущем пункте было показано, что последовательность должна состоять из нечётного числа членов. Пусть $n = 2m + 1$, тогда

$$a_n = a_{2m+1} \leq a_{2m-1} + 22 \leq a_{2m-3} + 22 \cdot 2 \leq \dots \leq a_1 + 22 \cdot m; \quad 235 \leq 1 + 22m,$$

откуда $m \geq 11$. Значит, последовательность состоит не менее чем из 23 чисел.

Приведём пример последовательности, удовлетворяющей условию задачи, состоящей из 23 членов: $1, 2, 23, -20, 45, -42, 67, -64, 89, -86, 111, -108, 133, -130, 155, -150, 175, -170, 195, -190, 215, -210, 235$.

Ответ: а) например, $1, 2, 3, 0, 5, -2, 7, -4, \dots, 233, -230, 235$; б) нет; в) 23.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах <i>a</i> , <i>б</i> и <i>в</i>	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>в</i> и обоснованно получен верный ответ в пунктах <i>a</i> или <i>б</i>	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах <i>a</i> и <i>б</i> ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>в</i>	2
Обоснованно получен верный ответ в пунктах <i>a</i> или <i>б</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задание 19.4

На доске написано 30 натуральных чисел (числа могут повторяться), каждое из которых либо зелёного, либо красного цвета. Каждое зелёное число кратно 3, а каждое красное число кратно 7. При этом все зелёные числа различны и все красные различны (какое-то зелёное число может равняться какому-то красному числу).

- а) Может ли сумма написанных чисел быть меньше $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$, если все числа на доске кратны 3?
б) Может ли ровно одно число на доске быть красным, если сумма написанных чисел равна 1067?
в) Какое наименьшее количество красных чисел может быть на доске, если сумма написанных чисел равна 1067?

Решение.

а) Если на доске записано 29 зелёных чисел: $3, 6, \dots, 87$ – и одно красное число 21, то их сумма меньше 1395.

б) Пусть на доске ровно одно красное число. Тогда зелёных чисел 29, а их сумма не меньше, чем сумма 29 наименьших чисел, делящихся на 3:

$$3 + 6 + \dots + 87 = \frac{90 \cdot 29}{2} = 1305.$$

Это противоречит тому, что сумма написанных чисел равна 1067.

в) Пусть на доске написано n красных чисел и $30 - n$ зелёных чисел. Тогда сумма красных чисел не меньше

$$7 + 14 + \dots + 7n = \frac{7n^2 + 7n}{2},$$

а сумма зелёных чисел не меньше

$$3 + 6 + \dots + 3(30 - n) = \frac{3(31 - n)(30 - n)}{2} = \frac{3n^2 - 183n + 2790}{2}.$$

Таким образом, $1067 \geq 5n^2 - 88n + 1395$; $5n^2 - 88n + 328 \leq 0$, откуда, учитывая, что n – целое, получаем $n \geq 6$.

Приведём пример 6 красных чисел и 24 зелёных чисел, сумма которых равна 1067: 7, 14, 21, 28, 35, 56, 3, 6, ..., 66, 69, 78.

Ответ: а) да; б) нет; в) 6.

Задание 19.5

На столе лежит 40 карточек, часть из которых красного цвета, а остальные синего (есть хотя бы по одной карточке каждого цвета). На каждой карточке написано натуральное число. Все числа, написанные на синих карточках, различны. Любое число на красной карточке меньше любого числа на синей карточке. Среднее арифметическое всех чисел на карточках равно 14. Если утроить числа на синих карточках, то среднее арифметическое всех чисел станет равно 39.

- а) Может ли на столе быть ровно 10 синих карточек?
- б) Может ли на столе быть ровно 10 красных карточек?
- в) Какое наибольшее количество синих карточек может быть на столе?

Решение.

а) Если на тридцати красных карточках написано число 2, а на синих карточках написаны числа 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 437, то условия задачи выполнены.

б) Пусть сумма чисел, написанных на красных карточках, равна k , а сумма чисел, написанных на синих карточках, равна s . Тогда

$$k + s = 560; k + 3s = 1560,$$

откуда $k = 60$, $s = 500$.

Предположим, что красных карточек 10 штук. Если все числа на красных карточках не превосходят 5, то их сумма k не превосходит $5 \cdot 10 = 50$. Но $k = 60$, значит, есть хотя бы одна карточка, на которой написано число, не меньшее 6. Так как любое число на синей карточке больше любого числа на красной карточке, то все числа на синих карточках не меньше 7, а их сумма не меньше $7 + 8 + \dots + 36 = 645$. Но $s = 500$, значит, не может быть ровно 10 красных карточек.

в) Предположим, что синих карточек n штук, а наибольшее число, написанное на красной карточке, равно u . Тогда $(40 - n)u \geq 60$. С другой стороны, так как любое число на синей карточке больше любого числа на красной карточке, все числа на синих карточках не меньше $u + 1$, а их сумма не меньше

$$(u + 1) + (u + 2) + \dots + (u + n) = nu + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Но $s = 500$, значит,

$$nu + \frac{n(n+1)}{2} \leq 500; u \leq \frac{500}{n} - \frac{n+1}{2}.$$

Таким образом, получаем:

$$\frac{60}{40-n} \leq u \leq \frac{500}{n} - \frac{n+1}{2}.$$

Заметим, что это неравенство не выполняется при $n \geq 27$, поскольку при $n \geq 27$

$$\frac{60}{40-n} \geq \frac{60}{13} > 4 \text{ и } \frac{500}{n} - \frac{n+1}{2} \leq \frac{122}{27} < 5.$$

Но неравенство $4 < u < 5$ не имеет целых решений, значит, синих карточек не может быть больше 26.

Покажем, что может быть 26 синих карточек. Если на десяти красных карточках написано число 4, на четырёх красных карточках написано число 5, а на синих карточках написаны числа 6, 7, ..., 29, 30, 50, то условия задачи выполнены.

Ответ: а) да; б) нет; в) 26.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах <i>a</i> , <i>б</i> и <i>в</i>	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>в</i> и обоснованно получен верный ответ в пунктах <i>a</i> или <i>б</i>	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах <i>a</i> и <i>б</i> ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>в</i>	2
Обоснованно получен верный ответ в пунктах <i>a</i> или <i>б</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4


Примеры оценивания решений задания 19

Пример 19.1.1

В порту имеются только заполненные контейнеры, масса каждого из которых равна 20 тонн или 60 тонн. В некоторых из этих контейнеров находится сахарный песок. Количество контейнеров с сахарным песком составляет 75 % от общего количества контейнеров.

- а) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 80 % от общей массы всех контейнеров?
 б) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 40 % от общей массы всех контейнеров?
 в) Какую наибольшую долю (в процентах) может составить масса контейнеров с сахарным песком от общей массы всех контейнеров?

Ответ: а) да; б) нет; в) 90.




$$\frac{160}{200} = 80\% \quad \frac{6}{8} = 75\%$$

б) Нет, не может. На каждые три контейнера с сахарным песком должен приходиться один обычный контейнер и доля оставалась 75%.

То есть все контейнеры можно разбить на 4-ки (3 с сахарным песком и 1 обычный). Соотношение масс внутри 4-ки будет таким же, как и среди всех контейнеров т.е. все контейнеры с песком между собой одинаковы и все обычные контейнеры между собой одинаковы. Даже если все контейнеры с сахарным песком будут weigh по 20 тонн, а все обычные - по 60 тонн, масса контейнеров с сахарным песком составит 50% от общей массы, т.к. $20 + 20 + 20 = 60$. То есть 50% - минимальная возможная доля массы контейнеров с сахарным песком. 40% быть не может.

19) б) Наибольшая доля массы контейнеров с сахарным песком от общей массы всех контейнеров составит тогда, когда все ¹ контейнеры ~~с~~ с песком ~~будут~~ будут максимально тяжёлыми, а все остальные контейнеры - максимально лёгкими. Сколько бы у нас ни было контейнеров всего, мы их всегда можем разбить на 4-ки (3 контейнера с песком и 1 безпесный). Поэтому ~~какое~~ соотношение массы среди всех контейнеров будет таким же как в одной 4-ке, т.к. для достижения наибольшей доли массы контейнеров с песком все контейнеры одинаковые (см. а)). Максимальная масса - 60 тонн, минимальная - 20 тонн:



Ответ: а) может б) не может в) 90%

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в пунктах а, б и в.

Оценка эксперта: 4 балла.

Пример 19.1.2

В порту имеются только заполненные контейнеры, масса каждого из которых равна 20 тонн или 60 тонн. В некоторых из этих контейнеров находится сахарный песок. Количество контейнеров с сахарным песком составляет 75 % от общего количества контейнеров.

а) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 80 % от общей массы всех контейнеров?

б) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 40 % от общей массы всех контейнеров?

в) Какую наибольшую долю (в процентах) может составить масса контейнеров с сахарным песком от общей массы всех контейнеров?

Ответ: а) да; б) нет; в) 90.

$$\begin{aligned} \text{а)} \quad & \text{Пусть всего } x \text{ контейнеров} \rightarrow \text{с сахаром } 0,75x; \\ & \text{без сахара } \rightarrow 0,25x. \\ & \text{Максимальная масса без сахара} = 0,25x \cdot 60 = 15x. \\ & \text{Максимальная масса контейнеров с сахаром} = 0,75x \cdot 20 = 15x. \\ & \downarrow \\ & z = \frac{15x}{15x+15x} = \frac{1}{2} = 50\% \rightarrow \text{это минимально возможное значение.} \\ & \text{50\% > 40\%} \rightarrow \text{значит да.} \\ & \text{Ответ: а) да; б) нет.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б)} \quad & \text{Пусть контейнеров } x; \text{ с сахаром } 0,75x; \text{ без } 0,25x \\ & \downarrow \\ & \text{Максимальная масса контейнеров с сахаром} = 0,75x \cdot 60 = 45x \\ & \text{Максимальная масса контейнеров без сахара} = 0,25x \cdot 20 = 5x \\ & \downarrow \\ & z = \frac{45x}{45x+5x} = \frac{90}{100} = 0,9 = 90\% \rightarrow \text{максимальное значение} \\ & z = 90\%. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в)} \quad & \text{максимально } z = 90\%; \text{ минимально } z = 50\%; \\ & z = 80\% \text{ больше } 50\% \text{ и меньше } 90\% \\ & \downarrow \\ & \text{нельзя.} \\ & \text{Ответ: а) да; б) нет; в) 90\%.} \end{aligned}$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте в и обоснованно получен верный ответ в пункте б, пункт а не выполнен, так как попадание в нужный интервал не гарантирует, что это реализуется.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 19.1.3

В порту имеются только заполненные контейнеры, масса каждого из которых равна 20 тонн или 60 тонн. В некоторых из этих контейнеров находится сахарный песок. Количество контейнеров с сахарным песком составляет 75 % от общего количества контейнеров.

а) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 80 % от общей массы всех контейнеров?

б) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 40 % от общей массы всех контейнеров?

в) Какую наибольшую долю (в процентах) может составить масса контейнеров с сахарным песком от общей массы всех контейнеров?

Ответ: а) да; б) нет; в) 90.

Задание 19

а) да, можно.
 Например, в мешков 20, 20, 60, 60, 60, 60, 60, 60
 Их суммарная масса: $60 \cdot 6 + 40 = 400$
 Бывали 6 мешков (это 75% от общей суммы)
 с 60 тоннами и один с 20 тоннами
 \rightarrow масса песка $5 \cdot 60 + 20 = 320$
 $\frac{320}{400} = \frac{32}{40} = \frac{8}{10} = 0,8 \Rightarrow 80\%$. Все верно.

б) Нет, не можем.
 Найдем минимальный процент сахара
 для этого все мешки с сахаром по 20 тонн, все остальные
 по 60 тонн $= \frac{0,75 \cdot 20}{0,75 \cdot 20 + 0,25 \cdot 60} = \frac{15}{15 + 15} = 50\%$
 Получаемся, что возможный процент сахара — это 50%
 \rightarrow нельзя получить 40%

в) Найдем максимальный процент сахара
 для этого все мешки с сахаром должны
 быть по 60 тонн, а остальные по 20
 т — число мешков с сахаром
 60 т — все сахара
 n — остальные мешки
 20 т — все остальные мешков.
 Так как $m = 0,75 (m+n)$, $\Rightarrow 0,25m = 0,75n$
 $\Rightarrow m = 3n$
 процент $s = \frac{60m}{20m + 60n} = \frac{60 \cdot 3n}{20 \cdot 3n + 60n} =$
 $= \frac{60}{20/3 + 60} = \frac{6}{2/3 + 6} = \frac{6 \cdot 3}{2 + 18} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10} = 90\% \Rightarrow 90\%$

Ответ: а) да, можно б) нет, не можем
 в) 90%

Комментарий.

В заданиях пунктов а и в обоснованно получены верные ответы, в решении б допущена ошибка.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 19.1.4

В порту имеются только заполненные контейнеры, масса каждого из которых равна 20 тонн или 60 тонн. В некоторых из этих контейнеров находится сахарный песок. Количество контейнеров с сахарным песком составляет 75 % от общего количества контейнеров.

а) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 80 % от общей массы всех контейнеров?

б) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 40 % от общей массы всех контейнеров?

в) Какую наибольшую долю (в процентах) может составить масса контейнеров с сахарным песком от общей массы всех контейнеров?

Ответ: а) да; б) нет; в) 90.

19

а) Пусть есть a конт по 20т; b по 60;
 c из a заи песком; d из b заи песком. ясно, что $a \geq c$; $b \geq d$
 тогда по усл $(c+d) = 0.75(a+b) \Rightarrow 4c+4d = 3a+3b$

а) $(c \cdot 20 + d \cdot 60) = 0.8(a \cdot 20 + b \cdot 60)$

$$20c + 60d = 16a + 48b \quad | :4$$

$$\begin{cases} 5c + 15d = 4a + 12b \\ 4c + 4d = 3a + 3b \end{cases}$$

$$4c + 4d = 3a + 3b$$

Пример: $a=14; c=10; b=2; d=2$. тогда

$$5 \cdot 10 + 15 \cdot 2 = 4 \cdot 14 + 12 \cdot 2$$

$$4 \cdot 10 + 4 \cdot 2 = 3 \cdot 14 + 3 \cdot 2 \quad \checkmark \quad \text{Ответ: да, можно}$$

б) $(c+d) \geq 0.4(a+b)$ $(20c+60d) = 0.4(20a+60b)$

$$20c + 60d = 8a + 24b \quad | :4$$

$$\begin{cases} 5c + 15d = 2a + 6b & \textcircled{2} \\ 4c + 4d = 3a + 3b & \textcircled{1} \end{cases}$$

$$4c + 4d = 3a + 3b \quad | \cdot 2 \quad \textcircled{1}$$

$$\begin{matrix} a-g & b \neq 1 \\ c=6 & d=3 \end{matrix} \quad \begin{matrix} d=4 \text{ или } 7 \\ 7d=18 \rightarrow 6 \end{matrix}$$

Умножу $\textcircled{1}$ на $\textcircled{2}$ и вычту $\textcircled{2}$:

$$3c - 7d = 4a \rightarrow 3c = 4a + 7d$$

3-2d, это по усл

$$a \geq c \Rightarrow 4a + 7d \geq 4c + 7d$$

это не может равняться 3c
 противоречие \Rightarrow ответ: нет

Комментарий.

В заданиях пунктов а и б обоснованно получены верные ответы, задание пункта в не решено. Решение пункта в отсутствует.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 19.1.5

В порту имеются только заполненные контейнеры, масса каждого из которых равна 20 тонн или 60 тонн. В некоторых из этих контейнеров находится сахарный песок. Количество контейнеров с сахарным песком составляет 75 % от общего количества контейнеров.

а) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 80 % от общей массы всех контейнеров?

б) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 40 % от общей массы всех контейнеров?

в) Какую наибольшую долю (в процентах) может составить масса контейнеров с сахарным песком от общей массы всех контейнеров?

Ответ: а) да; б) нет; в) 90.

№19 а) Пусть x конт. по 20т
 y конт. по 60т

z конт. с песком по 20т
 k конт. с песком по 60т

$$\begin{cases} z+k = 0,75(x+y) \\ 20z+60k = 0,8(20x+60y) \end{cases}$$

$$\begin{cases} z+k = 0,75x+0,75y \\ 20z+60k = 16x+48y \end{cases}$$

$$\underline{z = 10 \quad k = 2 \quad x = 14 \quad y = 2}$$

$$\begin{aligned} z+k &= 12 & 0,75(x+y) &= 0,75 \cdot 16 = 12 \\ z+k &= 0,75(x+y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 20z+60k &= 0,8(20x+60y) \\ 20 \cdot 10 + 60 \cdot 2 &= 0,8(20 \cdot 14 + 60 \cdot 2) \\ 320 &= 0,8 \cdot 400 = 320 \end{aligned}$$

Ответ: да, может.

б) Пусть x конт. по 20т
 y конт. по 60т

$$\begin{cases} z+k = 0,75x+0,75y & | \cdot 60 \\ 20z+60k = 8x+24y \\ - \{ 60z+20k = 43x+43y \\ 20z+60k = 8x+24y \\ 40z = 35x+19y \end{cases}$$

т.к. $40z = 35x + 19y$; $z = 0,875x + 0,475y$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а, решение пункта б не завершено. Решение пункта в отсутствует.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 19.2.1

В классе больше 10, но не больше 26 учащихся, а доля девочек не превышает 21 %.

а) Может ли в этом классе быть 5 девочек?

б) Может ли доля девочек составить 30 %, если в этот класс придёт новая девочка?

в) В этот класс пришла новая девочка. Доля девочек в классе составила целое число процентов. Какое наибольшее число процентов может составить доля девочек в классе?

Ответ: а) да; б) нет; в) 25.

N 19.

Пусть мальчиков - x ; девочек - y ; $x, y \in \mathbb{N}$; $10 < x+y \leq 26$.

а) Да, например $x=21$; $y=5$. Всего 26: $10 < 26 \leq 26$.

При этом: $\frac{5}{26} \nlessdot \frac{21}{100} \Leftrightarrow \frac{500}{2600} \nlessdot \frac{546}{2600} \Leftrightarrow 500 < 546 \rightarrow$
 $\frac{5}{26} < \frac{21}{100}$

б) По условию: $\frac{y}{x+y} \leq 0,21 \rightarrow y \leq 0,21x + 0,21y \rightarrow 0,21x \geq 0,79y$

~~$x \geq \frac{28y}{21} \rightarrow x \geq$~~ $x \geq \frac{0,79y}{0,21}$

Если в класс придет новая девочка, то их будет $(y+1)$.

По усл.: $\frac{y+1}{x+y+1} = 0,3 \Leftrightarrow y+1 = 0,3x + 0,3y + 0,3$
 $0,7y - 0,3x + 0,7 = 0 \quad | \cdot 10$
 $7y - 3x + 7 = 0$

Подставим x в $x \geq \frac{0,79y}{0,21}$:

$\frac{7y+7}{3} \geq \frac{79y}{21} \quad | \cdot 21 \Rightarrow 7(7y+7) \geq 79y$
 $49y+49 \geq 79y$
 $30y \leq 49 \quad y \leq \frac{49}{30}$

Т.к. $y \in \mathbb{Z}$, то единственное возможное $y=1$.

Тогда $x = \frac{7 \cdot 1 + 7}{3} = \frac{14}{3} \notin \mathbb{N}$.

Нет, такое невозможно.

Комментарий.

В заданиях пунктов а и б обоснованно получены верные ответы, задание пункта в не решено.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 19.2.2

В классе больше 10, но не больше 26 учащихся, а доля девочек не превышает 21 %.

а) Может ли в этом классе быть 5 девочек?

б) Может ли доля девочек составить 30 %, если в этот класс придёт новая девочка?

в) В этот класс пришла новая девочка. Доля девочек в классе составила целое число процентов. Какое наибольшее число процентов может составить доля девочек в классе?

Ответ: а) да; б) нет; в) 25.

а) Да, например 5 девочек и 26 всего. ^{n=19.}
 Доля девочек: $\frac{5}{26} \cdot 100\% = 19\frac{6}{26}\%$

б) Пусть девочек x , n - всего.
 Тогда $\frac{x}{n} \leq 0,21$, $\frac{x+1}{n+1} \leq 0,3$
 $\frac{0,3n - 0,21}{n} \leq 0,21$ т.к. x и n - целые
 $\frac{0,3n - 0,21}{n} \leq 0,21$
 $0,3n - 0,21 \leq 0,21n$
 $0,09n \leq 0,42$
 $n \leq 4,66$
 Но т.к. $11 \leq n \leq 26$, то $12 \leq n+1 \leq 27$
 Единств. возможный вариант $x=5, n=19$.
 Но тогда изначально доля девочек была $\frac{5}{19} \cdot 100\% = 26\frac{6}{19}\%$, что противоречит условию. Невозможно.

в) Пусть x - девочек, y - мальчиков. Новая доля девочек: $\frac{x+1}{x+y+1}$
 Видно, что чем меньше y , тем больше доля.

Комментарий.

В заданиях пунктов а и б обоснованно получены верные ответы, задание пункта в не решено.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 19.2.3

В классе больше 10, но не больше 26 учащихся, а доля девочек не превышает 21 %.

а) Может ли в этом классе быть 5 девочек?

б) Может ли доля девочек составить 30 %, если в этот класс придёт новая девочка?

в) В этот класс пришла новая девочка. Доля девочек в классе составила целое число процентов. Какое наибольшее число процентов может составить доля девочек в классе?

Ответ: а) да; б) нет; в) 25.

N 19

$$10 < \text{учеников} \leq 26 \quad \text{девочек} \leq 21\%$$

- а) если девочек 5 шт, то предположим, что это 20% от общего количества учеников; составим пропорцию
- $$\begin{array}{l} \text{процент, \%} \\ 5 - 20\% \\ x - 100\% \end{array} \quad x = \frac{5 \cdot 100}{20} = 25 \text{ учеников}$$
- условия выполняются, значит, такое может быть

Ответ: да, может

- б) предположим, что девочек было 5 шт, а когда пришла новая, их стало 6, которые составляют 30% от общего кол-ва учеников; составим пропорцию
- $$\begin{array}{l} \text{процент, \%} \\ 6 - 30\% \\ x - 100\% \end{array} \quad x = \frac{6 \cdot 100}{30} = 20 \text{ учеников}$$

в таком случае условия выполняются, значит, такое может быть

Ответ: да, может

- в) если в класс пришла новая девочка, то общее количество учеников теперь не должно превышать 27 человек. составим пропорцию

$$\begin{array}{l} \text{Х девочек} - \text{max. процент \%} \\ \text{У учеников} - 100\% \end{array}$$

$$\text{max. \%} = \frac{\text{Х девочек} \cdot 100}{\text{У}}$$

Х девочек · 100 должно точно делиться на У по условию

предположим, что девочек в классе 9, а всего 12 человек, тогда:

$$\% = \frac{9 \cdot 100}{12} = 75\%$$

если девочек 12, а всего 15 учеников, тогда:

$$\% = \frac{12 \cdot 100}{15} = 80\%$$

если девочек 16, а всего учащихся 20, то

$$\% = \frac{16 \cdot 100}{20} = 80\%$$

если девочек 9, а всего учащихся 15, то

$$\% = \frac{9 \cdot 100}{15} = 60\%$$

при дальнейшем выборе % девочек уменьшается, значит
максимальный процент равен 80%

Ответ: а) да
б) да
в) 80 %

Комментарий.

Задание пункта а выполнено верно, в заданиях пунктов б и в получены неверные ответы.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 19.3.1

В последовательности $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$, состоящей из целых чисел, $a_1 = 1, a_n = 235$

. Сумма любых двух соседних членов последовательности равна 3, 5 или 25.

а) Приведите пример такой последовательности.

б) Может ли такая последовательность состоять из 1000 членов?

в) Из какого наименьшего числа членов может состоять такая последовательность?

Ответ: а) например, 1, 2, 3, 0, 5, -2, 7, -4, ..., 233, -230, 235; б) нет; в) 23.

б) Нет. т.к. в этой посл. $a_i + a_{i+1} = \begin{cases} 3 \\ 5 \\ 25 \end{cases} \Rightarrow$
 \Rightarrow т.к. a_1 - неч., то все четные члены - чет.,
а нечетные - неч. $\Rightarrow a_n = 235$ - неч. член т.е.
 n не 1000. \Rightarrow невозможно. не может.

а) 1; 2; -1; 6; 7; 2

а) 1; -26; 51; -46; 71; -66; 91; -86; 111; -106; 131;
-126; 151; -146; 171; -166; 191; -188; 213; -210; 235

Комментарий.

В пункте а допущена ошибка: сумма первых двух чисел равна -25. При ответе на вопрос пункта б участник экзамена верно показал, что случай $n = 1000$ невозможен. Решение пункта в отсутствует.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 19.3.2

В последовательности $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$, состоящей из целых чисел, $a_1 = 1, a_n = 235$

. Сумма любых двух соседних членов последовательности равна 3, 5 или 25.

а) Приведите пример такой последовательности.

б) Может ли такая последовательность состоять из 1000 членов?

в) Из какого наименьшего числа членов может состоять такая последовательность?

Ответ: а) например, 1, 2, 3, 0, 5, -2, 7, -4, ..., 233, -230, 235; б) нет; в) 23.

А) Пример такой последовательности:

*1, 2, 3, 0, 5, -2, 7, -4, 9, -6, 11, -8, 13, -10, 15, -12, 17, -14,
19, -16, 21, -18, 23, -20, 25, -22, 27, -24, 29, -26, 31, -28,
33, -30, 35, -32, 37, -34, 39, -36, 41, -38, 43, -40, 45, -42, 47, -44,
49, -46, 51, -48, 53, -50, 55, -52, 57, -54, 59, -56, 61, -58, 63, -60,
65, -62, 67, -64, 69, -66, 71, -68, 73, -70, 75, -72, 77, -74, 79, -76,
81, -78, 83, -80, 85, -82, 87, -84, 89, -86, 91, -88, 93, -90, 95, -92,
97, -94, 99, -96, 101, -98, 103, -100, 105, -102, 107, -104, 109, -106,
111, -108, 113, -110, 115, -112, 117, -114, 119, -116, 121, -118,
123, -120, 125, -122, 127, -124, 129, -126, 131, -128, 133, -130,
135, -132, 137, -134, 139, -136, 141, -138, 143, -140, 145, -142,
147, -144, 149, -146, 151, -148, 153, -150, 155, -152, 157, -154,
159, -156, 161, -158, 163, -160, 165, -162, 167, -164, 169, -166,
171, -168, 173, -170, 175, -172, 177, -174, 179, -176, 181, -178,
183, -180, 185, -182, 187, -184, 189, -186, 191, -188, 193, -190,
195, -192, 197, -194, 199, -196, 201, -198, 203, -200, 205, -202,
207, -204, 209, -206, 211, -208, 213, -210, 215, -212, 217, -214,
219, -216, 221, -218, 223, -220, 225, -222, 227, -224, 229, -226,
231, -228, 233, -230, 235.*

*б) Да, например, последовательность, членами которой являются
чередующиеся числа 0 и 3.*

0, 3, 0, 3, 0, 3...

*Сумма любых двух соседних членов в последовательности
равна 3, что соответствует условию.*

*В последовательности, состоящей из 1000 членов, будет
пятьсот 0 и пятьсот 3. Все нечётные члены последовательности
будут нулями, все чётные - тройками.*

Комментарий.

В пункте а верно приведён пример. Решение пункта б неверно. Решение пункта в отсутствует.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 19.4.1

На доске написано 30 натуральных чисел (числа могут повторяться), каждое из которых либо зелёного, либо красного цвета. Каждое зелёное число кратно 3, а каждое красное число кратно 7. При этом все зелёные числа различны и все красные различны (какое-то зелёное число может равняться какому-то красному числу).

- а) Может ли сумма написанных чисел быть меньше $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$, если все числа на доске кратны 3?
 б) Может ли ровно одно число на доске быть красным, если сумма написанных чисел равна 1067?
 в) Какое наименьшее количество красных чисел может быть на доске, если сумма написанных чисел равна 1067?

Ответ: а) да; б) нет; в) 6.

а) Да, пример:

$3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, \dots, 87$; 21
 зелёные ; красное

Сумма чисел $= 1326 < 1395$, так как записаны не все.

б) Найдем минимально возможную сумму с одним красным числом.

Т.к. сумма $\rightarrow \min \Rightarrow$ красное число $= 7$,
 зелёные $- 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots, 87$.

$$\sum_{i=1}^{30} 3i = 1305 + 7 = 1312 > 1067 \Rightarrow \text{Не может}$$

Ответ: нет.

в) Пусть $f(n)$ - функция, значение которой равно минимально возможной сумме при данном n . Где n - кол-во красных чисел.

$$\begin{aligned} f(n) &= 7 \cdot \left(\frac{n \cdot (n+1)}{2} \right) + 3 \cdot \left(\frac{(30-n)(31-n)}{2} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(7n^2 + 7n + 3n^2 + 3 \cdot 61n + 3 \cdot 30 \cdot 31 \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(10n^2 - 176n + 2790 \right) = 5n^2 - 88n + 1395. \end{aligned}$$

найдем минимальное $n \in (\mathbb{N} \setminus \{1\}) \cap \mathbb{Z}^+$, такое что $f(n) \leq 1067$.

$$5n^2 - 88n + 1395 \leq 1067$$

$$5n^2 - 88n + 328 \leq 0$$

$$D = 44^2 - 328 \cdot 5 = 1936 - 1640 = 296.$$
$$n \in \left[\frac{44 - \sqrt{296}}{5}, \frac{44 + \sqrt{296}}{5} \right] \Rightarrow n = 6.$$

$$f(6) = 7 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} + 3 \cdot \frac{24 \cdot 25}{2} = 3(49 + 12 \cdot 25) = 3 \cdot 349 = 1047.$$

$f(5) = 1380 >_{1067} \Rightarrow$ для 5-кеверта.

Ответ: 6- наименьшее кол-во крайних пример:

7, 14, 21, 28, 35, 56.

3, 6, 9, 12, ..., 69, 78, ~~87~~

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы во всех пунктах.

Оценка эксперта: 4 балла.

Пример 19.4.2

На доске написано 30 натуральных чисел (числа могут повторяться), каждое из которых либо зелёного, либо красного цвета. Каждое зелёное число кратно 3, а каждое красное число кратно 7. При этом все зелёные числа различны и все красные различны (какое-то зелёное число может равняться какому-то красному числу).

- а) Может ли сумма написанных чисел быть меньше $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$, если все числа на доске кратны 3?
 б) Может ли ровно одно число на доске быть красным, если сумма написанных чисел равна 1067?
 в) Какое наименьшее количество красных чисел может быть на доске, если сумма написанных чисел равна 1067?

Ответ: а) да; б) нет; в) 6.

а) $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$ - 30 чисел. Преположим что все они зелёные. Да, может, т.к. мы можем заменить число 90 на число 21, при этом-то же число цветом (красным), а всегда общее число чисел будет на 1069 - 2.т.г.

б) Возьмём наименьшую сумму чисел написанных только зелёными. Это $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$. Нам нужно добавить одно красное число. Для того, чтобы минимизировать сумму мы добавим самое большое зелёное - 90 и добавим минимально возможное красное - 7. Итоговая сумма $1395 - 90 + 7 = 1312 > 1067 \Rightarrow$ не возможно.

в) Числа кратные 3 не дают остатка при делении на 7 в порядке: 3 6 2 5 1 4 0
 Число 1067 даёт остаток 3 при делении на 7 \Rightarrow
 Это зелёные числа дают максимум сумму 7225 1067 1395
 Они не могут показать ни $3 + 6 + \dots + 90 = 1395$ $74067 \Rightarrow$
 1312
 \Rightarrow они дают максимум на 63.
 $3 + \dots + 68 = 63 \cdot 11 = 759$ 26 , $1067 - 721$ $1067 - 759 = 308$ 80 $308 \overline{) 721}$
 72 8 17
 0 8 17

Комментарий.

Приведено верное решение пункта а. Приведено верное решение пункта б. Решение в пункте в не завершено.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 19.4.3

На доске написано 30 натуральных чисел (числа могут повторяться), каждое из которых либо зелёного, либо красного цвета. Каждое зелёное число кратно 3, а каждое красное число кратно 7. При этом все зелёные числа различны и все красные различны (какое-то зелёное число может равняться какому-то красному числу).

а) Может ли сумма написанных чисел быть меньше $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$, если все числа на доске кратны 3?

б) Может ли ровно одно число на доске быть красным, если сумма написанных чисел равна 1067?

в) Какое наименьшее количество красных чисел может быть на доске, если сумма написанных чисел равна 1067?

Ответ: а) да; б) нет; в) 6.

а) индекс обозначает цвет, который имеет число

а) Можно, если как одно и то же число может быть задано разными цветами.

пример: $3_{г}, 6_{г}, \dots, 87_{г}, 21_{к}$

б) Нет.

Если только одно число красное, то в ^{наборе} ~~выборе~~ наименьшей сумме $(3_{г}, 6_{г}, \dots, 87_{г}, 7_{к})$ сумма равна 1312, что больше, чем 1067

в) 6.

В ^{наборе} ~~выборе~~ наименьшей сумме красных чисел и наименьшей сумме $(3_{г}, 6_{г}, \dots, 76_{г}, 7_{к}, 14_{к}, \dots, 35_{к})$ сумма равна 1077, $1077 > 1067$

Если сумма будет равна 1067, если в предыдущем выборе наборе заменим $66_{г}$ на $56_{к}$.

Комментарий.

Обоснованно получен ответ в пунктах а и б. В решении пункта в есть логическая ошибка: не доказано, что красных чисел не может быть меньше 5. Взяв 5 красных чисел, нужно взять 25 зелёных чисел, а не 26. Кроме того, сумма чисел найдена неверно.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 19.4.4

а) Да, может. Например, вместо зеленого числа 24 можно поставить красное число 21 (сказано, что красное число может равняться зеленому). Тогда сумма примет вид $3+6+\dots+21+21+27+\dots+90=1392 < 1395$.

Ответ: да, может.

б) Число 1067 имеет остаток 2 при делении на 3. Следовательно, красное число тоже должно иметь остаток 2 при делении на 3 (т.к. все зеленые числа имеют остаток 0). Наибольшее такое число - 14. Как известно из пункта а), сумма 30 наименьших зеленых чисел равно 1395. Если мы заметим наибольшее из них (90) на 14, то сумма будет равна $1395-90+14=1319 > 1067$. Следовательно, такого дня не может.

Ответ: нет, не может.

в) $1395-1067=328 \Rightarrow$ в сумме $3+6+\dots+90$ необходимо так заменить несколько зеленых чисел на красные, чтобы суммарная разница между ними составила 328.

Во-первых, заметим, что за 5 замен это сделать невозможно, поскольку даже если заменить самые большие зеленые числа (90, 87, 84, 81, 78) на самые маленькие красные (7, 14, 21, 28, 35), то суммарная разница составит $305 < 328$.

Во-вторых, заметим, что если вдобавок заметить 72 на 49 ($72-49=23$), то суммарная разница составит как раз 328 ($305+23=328$) \Rightarrow искомое наибольшее количество красных чисел - 6.

Ответ: 6.

Комментарий.

Обоснованно получен ответ в пунктах а и б. В пункте в неверное обоснование, поскольку не доказано, что набор с минимальным количеством красных чисел получается заменой максимальных чисел из набора 3, 6, ..., 90 на минимально возможные различные красные числа. Кроме того, разница между пятью самыми большими зелёными числами и пятью самыми маленькими красными числами составляет 315.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 19.5.1

На столе лежит 40 карточек, часть из которых красного цвета, а остальные синего (есть хотя бы по одной карточке каждого цвета). На каждой карточке написано натуральное число. Все числа, написанные на синих карточках, различны. Любое число на красной карточке меньше любого числа на синей карточке. Среднее арифметическое всех чисел на карточках равно 14. Если утроить числа на синих карточках, то среднее арифметическое всех чисел станет равно 39.

- Может ли на столе быть ровно 10 синих карточек?
- Может ли на столе быть ровно 10 красных карточек?
- Какое наибольшее количество синих карточек может быть на столе?

Ответ: а) да; б) нет; в) 26.

а) $\text{среднее арифм.} = \frac{\text{сумма}}{\text{кол-во}}$

$\Rightarrow \text{сумма} = \text{с.А} \cdot \text{кол-во}$

Пусть сумма синих L , а красных M , тогда $L + M = 14 \cdot 40$ - это в 1м случае.
Во втором $3L + M = 39 \cdot 40$

$$\begin{cases} L + M = 14 \cdot 40 \Rightarrow M = 14 \cdot 40 - L & (1) \\ 3L + M = 39 \cdot 40 & (2) \end{cases}$$

$1 \rightarrow 2 \quad 3L + 14 \cdot 40 - L = 39 \cdot 40$

$$2L = 40 \cdot 25$$
$$L = 20 \cdot 25 = 500 - \text{сумма}$$

Все синие = 500 \Rightarrow 500 надо получить 10 различными числами. Это можно сделать, например:

46; 54; 30; 70; 20; 80; 10; 90; 60; 40

б). $L = 500$; $M = 14 \cdot 40 - L \Rightarrow M = 520 - 500 = 20$.

Красных карточек 10. \Rightarrow числа с.А = 20.

среднее арифметическое должно быть 2.

Наквими числами могут быть.

$2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2 \Rightarrow$ Да.

Комментарий.

В решении пункта а есть только описание чисел, написанных на синих карточках. Указание чисел, написанных на красных карточках, отсутствует. В решении пункта б допущена вычислительная ошибка. Решение пункта в отсутствует.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 19.5.2

На столе лежит 40 карточек, часть из которых красного цвета, а остальные синего (есть хотя бы по одной карточке каждого цвета). На каждой карточке написано натуральное число. Все числа, написанные на синих карточках, различны. Любое число на красной карточке меньше любого числа на синей карточке. Среднее арифметическое всех чисел на карточках равно 14. Если утроить числа на синих карточках, то среднее арифметическое всех чисел станет равно 39.

- Может ли на столе быть ровно 10 синих карточек?
- Может ли на столе быть ровно 10 красных карточек?
- Какое наибольшее количество синих карточек может быть на столе?

Ответ: а) да; б) нет; в) 26.

x - сумма чисел на красных карточках

y - сумма чисел на синих карточках

$$\begin{cases} x+y=14 \cdot 40=560 \\ x+3y=39 \cdot 40=1560 \end{cases} \Rightarrow 2y=1000 \Rightarrow y=500,$$

$x=60 \Rightarrow$ сумма ~~чисел~~ неповторяющихся

синих чисел = 500, а красных 60

а) Да, может. Пример: на 30 красных карточках написано число 2, а на 10 синих числа 100, 150, 3, 7, 5, 4, 9, 21, 175, 21. Каждое число на синей карточке больше любого на красной и неповторяется.

б) Нет. Если на столе ровно 10 красных карточек, то самое ~~то~~ маленькое из возможных максимальное число, написанное на карточке будет равно 6, тогда на синих карточках не должно быть числа меньше 7, синих карточек должно быть 30, а сумма на них равна.

ся 500, самый маленький возможный шаг между числами $d=1$, тогда, если $a_1=7$, то сумма всех чисел $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$, где $n=30$, так как синих карточек всего 30, $a_n = 29d + a_1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow S_n = \frac{7 + 29 \cdot 1 + 7}{2} \cdot 30 = (14 + 29) \cdot 15 = 43 \cdot 15 = 645$, это

больше 500, S_n - минимальная сумма, которая может получиться, т.к. $S_n > 500$ при данных условиях на столе не может быть ровно 10 красных карточек.

в) Ответ: 11, т.к. в других случаях общая сумма чисел на синих карточках превышает 500

Комментарий.

В решении пункта а приведён пример чисел на синих карточках, в котором есть повторяющееся число 21, да и сумма этих чисел равна 495, а не 500. Обоснованно получен ответ в пункте б. Решение пункта в фактически отсутствует.

Оценка эксперта: 1 балл.

Правила заполнения протоколов проверки развернутых ответов участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий по математике в 2025 году

Результаты проверки выполнения заданий с развернутым ответом эксперты региональных предметных комиссий оформляют протоколами в соответствии с установленной формой «Протокол проверки развернутых ответов» (далее – протокол), который входит в состав рабочего комплекта эксперта (форма протокола и набор не более 10 обезличенных копий экзаменационных работ, коды которых уже проставлены в соответствующих полях протокола). Протокол оформляется (при печати) на конкретного эксперта, при этом в регистрационной части протокола указывается в том числе:

- информация о коде региона, в котором проводится проверка;
- коде и названии учебного предмета;
- коде, фамилии и инициалах эксперта, которому назначены на проверку экзаменационные работы с кодами, указанными в основной части протокола;
- номере протокола.

Проверка экзаменационных работ проводится на основе использования поэлементного анализа ответов экзаменуемых в соответствии с критериями оценивания, которые предоставляются для каждого задания, включенного в КИМ ЕГЭ. В критериях оценивания предоставляются содержание верного ответа и указания по оцениванию.


По итогам оценивания экзаменационных работ эксперт, проверяющий работы, вносит в соответствующие поля протокола баллы, выставленные им по каждой позиции оценивания, предусмотренной критериями оценивания развернутых ответов. Также эксперт вносит в протокол информацию о выбранном номере альтернативного задания (для учебных предметов, в КИМ по которым включены задания с возможностью выбора).

Протокол является машиночитаемой формой, которая после заполнения проходит автоматизированную обработку в РЦОИ, в процессе которой форма сканируется, а информация, внесенная в протокол, автоматизированно распознается и вносится в РИС (региональная информационная система ГИА). Для исключения неверного считывания информации о результатах оценивания экзаменационных работ, необходимо соблюдение правил заполнения протокола. Протокол заполняется черной гелевой ручкой. Запрещено использование для заполнения протокола ручек с цветной пастой или карандашей (даже в случае их использования при проверке экзаменационных работ). Запрещается внесение какой-либо информации и/или пометок вне полей протокола, предназначенных для заполнения экспертом

Результаты оценивания каждой экзаменационной работы по математике переносятся в протокол проверки развернутых ответов следующим образом:

- баллы за выполнение задания **13** переносятся в колонку **13** протокола;
- баллы за выполнение задания **14** переносятся в колонку **14** протокола;
- баллы за выполнение задания **15** переносятся в колонку **15** протокола;
- баллы за выполнение задания **16** переносятся в колонку **16** протокола;
- баллы за выполнение задания **17** переносятся в колонку **17** протокола;
- баллы за выполнение задания **18** переносятся в колонку **18** протокола;
- баллы за выполнение задания **19** переносятся в колонку **19** протокола.

Протокол проверки развернутых ответов



Регион 99
Код предмета 2
ФИО эксперта
Примечание

Название предмета Математика профильная (дата экзамена)

Номер протокола 4000001
Код эксперта 000002

Образец заполнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 X

№	Код бланка	Позиции оценивания																	
		13	14	15	16	17	18	19											
1	2920800339590	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Дата проверки - -

Подпись эксперта

Рисунок 1. Протокол проверки развёрнутых ответов 2025 г. Образец

При выставлении баллов за выполнение задания в протокол проверки развёрнутых ответов следует иметь в виду, что если ответ отсутствует (нет никаких записей, свидетельствующих о том, что экзаменуемый приступал к выполнению задания), то в протокол проставляется символ «X», а не «0». Если участник экзамена не приступал к выполнению задания, выполнение которого оценивается несколькими критериями, то символ «X» выставляется по всем критериям, относящимся к этому заданию.

Любые исправления в протоколах запрещены, также запрещено использование замазок и затирок в целях исправления. В случае необходимости внесения исправления, эксперт сообщает об этом председателю ПК, который запрашивает в РЦОИ повторную распечатку протокола с номером испорченного. Ведется учет испорченных протоколов, уничтожение которых рекомендуется активировать после завершения соответствующего периода проведения ГИА.

Извлечения из Методических рекомендаций Рособнадзора по формированию и организации работы предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования должна быть растяжка по странице

Во время работы экспертам запрещается:

- иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
- копировать и выносить из помещений, в которых работает ПК, экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ;
- разглашать информацию, содержащуюся в указанных материалах.

Также запрещается:

- без уважительной причины покидать аудиторию;
- переговариваться с другими экспертами ПК, если речь не идёт о консультировании с председателем ПК или с экспертом ПК, назначенным по решению председателя ПК консультантом.

Если у эксперта возникают вопросы или проблемы, он должен обратиться к председателю ПК или лицу, назначенному председателем ПК консультантом.